Mr. Linstead, Mr. Smith, F.D., Lit. Section, Dr. Landman, Miss Block.

Please note that a copy of the Chinese edition of "Hare's Practical Therapeutics" has reached us. For the time being it is in Mr. Linstead's office and is available for reference if required.

Upon Mr. Linstead's return from his holidays he will deal with a few points connected with publication and after this the book will be sent to the library in the Literary Section.

M.O.R.

2 September, 1911.

J.B.

Mr. Linstead, Mr. [illegible], Mr. Needham, Miss Blair.

Please note that a copy of the Chinese edition of "[illegible] Practical Thermodynamics" has reached us. For the time being it is in Mr. Linstead's office and is available for reference if required.

Upon Mr. Linstead's return from his holidays he will deal with a few points connected with publication and after this the book will be sent to the library in the literary section.

W.J.R.

2 September, 1941.

r.s.

A

療學英文目錄 貳

B

療學 英文目錄 陸

D

M

N

O

P

T

U

療學英文目錄 貳拾陸

附錄　初顯時、勤服草烏頭之小分劑、有效、且宜浸足於熱芥水內、並服熱檸檬水、夜晚服鴉片表散、有效、服鋏氯盐、或能抵禦、常患之者、如服砒藥數月、乃能豫防、吸薄荷冰之氣、或齅氯酒之氣俱效。

附錄　初患時、以鉦养散或抹膏敷之均可、如未敷之先、以銾黑洗藥洗之、功效尤顯、濕癩症以鉍加沕下礬散、或鉦碳强礬、敷之大效、魚石蒲抹膏係有用之品、濕癩久症柳酸抹膏乃效、乾癩久症松蒲抹膏有效、如虛弱血虧之孩童患之、服鐵氯糖漿有效、患此症者、無論乾濕新久、俱宜留意於飲食。

齦症 GUMS, DISEASES OF

癀症 HYSTERIA

二十四至二十七畫

癭症 BRONCHOCELE

十九畫

二十畫

二十一畫

物瀉出、且能令腸生鹼液、如係盟瀉、鉍藥與炥醇大效、樟腦、哥羅芳、香硫强礬等藥、俱效、如係酒瀉、必先用蓖麻油、後用鉍藥類、多有時服蓖麻油後、不必用他藥、如係釀瀉、先服蓖麻油後服炥醇、柳酸、洋蘇冰、衲他連、木炭、怪阿寇碳强洽等藥、有效、如係暑瀉、初瀉時、宜服大黃香糖漿、以衣必格一厘之四分之一至四分之二、日服三次、有效、將莫非服或射於皮下大效、服衲他連、皇强酸等藥、有效。

棚病 (瀘棚長大) GLANDS, DISEASED

癪症 GOUT

瘖 LICHEN

蟯虫 WORMS, THREAD

附錄　宜先將肛內用温水洗淨、後以瓜沙或柳酸之消水、射於肛內、有效。

附錄　宜留意於病者之飲食、如於腹上用芥末貼膏有效、當初瀉時、以蓖麻油、鴉片酒、鈉氯碳强礬兼服、能將腸内釀壞之

附錄　宜愼飲食、如飲食過度、或食難化之物、症必易犯、服鋏氮塩日增分劑、最妙、服鈉氮塩較鋏氮塩少有惹胃之力、服樟腦氮弱塩、或鏀氮酸亦效、惟鏀氮酸惹力較大、而易阻胃經、如係癟瘤所致、服錸類藥、或鈲氯塩有效、如係蟯虫所致、以瓜沙消水射於肛內有效、有時甘油氰弱礬、醫小癇有效、如孩童患此症、以莎拉蕣流膏十五量滴、日服三次、後則漸增其分劑、有效。

十八畫

瞼炎 BLEPHARITIS

附錄　如兼睟炎、宜以硼强酸十厘、加水一量兩之消水、洗之、並宜以哥拉五分、加水百分、或鈉鏀碳强礬八厘、加水一量兩、製成消水洗之、以袪其效、以鋅硫强礬一分、加水百分、製成消水敷之、或以黃錸强養一厘、與煤油蠟一錢、製成抹膏敷之、均效。

瞼邊癧 STYES

癧 BOILS

嬰吐瀉症 CHOLERA, INFANTUM

附錄　以蓖麻油與樟腦鴉片酒兼服、能瀉腸內不正之液、且有平育道之功、亦宜用洗腸之法、所必須留意者、乃其飲食、如有肛急之患、以黃蠟與洋橄欖油相合、或以鴉片酒十量滴、加㵎水一量兩、射於肛內俱效、如以香糊藥敷於腹上乃宜、倘嘔吐不止、服砒藥類之微分劑、或伯蘭地數滴有效。

瞭疱炎 KEROTITIS, PHLYCTENULAR

- 幾阿林　四六三
- 錸氯弱盐　二一八

膽石痈 (肝石痈) COLIC, HEPATIC

- 鴉　片　五六
- 哥羅芳　五〇

瘴 ABSCESS

- 烸　醇　二七三
- 氫氯强洽消水　四六〇

附錄　瘴初起時、如服草烏頭、或綠藜蘆之足分劑、或服鎶硫粉、或敷顛茄抹膏、或敷氯酒、或貼以蘸鉛醋礬消水之饅首、或以烸醇五至十量滴射於患處、均有抵之之能、倘不能抵、宜敷糊藥、使速生膿、及已生膿、宜以刀割開、敷滅稑之藥、如係瘰瘴、宜服魚肝油與硄下礬類及鐵與貴林等藥。

瘄 CHANCROID

- 柳　酸　二九三
- 阿司炭尼利　三〇六
- 鉍安息礬　一七四

癇症 EPILEPSY

- 阿大那典　一三九
- 阿司炭尼利　三〇五
- 錏氣盐　一〇七
- 安替派林　三〇二
- 燐氰弱礬　一一〇

附錄　最要者、不可居於室內、宜於清雅之處、設立帳房居之、飲食宜多、更宜用有力之食物。

頭痛 HEADACHE

		芬阿錫吞	三〇八	阿司炭尼利	三〇五
顛茄	八五	布哥拉	七五	加非印	一三六
印度麻	七九	樟腦	二五	辣椒	三一四
洋升麻	三三	薄荷冰	二八三	氯	二一六
蓖麻油	三四〇	鋏氣塩	一〇四	外惹內效之法	五〇八
黑白芥	四一五				

附錄　如係目衣受惹所致、印度麻、黃茉莉士的年、芬阿錫吞等藥、有效、如係腦部受惹所致、以加非印、鉀氰塩、安替派林、兼服有效、如兼嘔吐、寇拉士的年、馬前子、鉍氫碳强礬、鎂碳强礬、鎂樽礬消水等藥、有效。

頭癬 TINEA CAPITIS

灰消水	四四〇	錳錸氯塩	二一四

糖尿症 DIABETES MELLITUS

		加溴酸	一六〇	安替派林	三〇二
砒	二〇三	甘油	四二九	寇第印	六六
撒卡林	四三一	埃多	二三五	灰消水	四四〇
鴉片	五八	鋰碳强礬	三六九	脃梅	四五一
皮下灌塩水法	五一三				

附錄　如兼大便乾結、未服貴林之先、五六句鐘、宜每刻鐘服録氯弱盐一厘之六分之一至四分之一、至二厘為止、或服獨脚蓮柄一厘十分之一至八分之一、亦可、如餐後立即發冷、宜服鉦硫强礬、或衣必格為吐藥、貴林不但能醫此症、且能豫防、砒藥類有補血之能、故患此症後宜服之。

附錄　如此症係傷風所致、每句鐘、宜服録氯弱盐一厘六分之一、至三次為度、有醫者謂服黃氣可見大效。

十六畫

積血 CONGESTION

積液 EFFUSIONS

遺精 EMISSIONS

附錄　臨寢時服鋏溴塩、或鈉溴塩二十至四十厘有效、服哥拉二十厘、或亥歐辛一厘之百分之一、或樟腦溴弱塩五厘、亦可、如病者虛弱、兼服士的年砒藥類之足分劑、乃宜、如於臨寢用熱水沐浴有效、有時以布蘸冷水搓其陽囊與會陰有效。

遺尿 INCONTINENCE OF URINE

瘴症 MALARIAL FEVER

時用熱法、或火吸罐法有效、醫痺症之藥、或能醫此症、多有醫者因用他法無效、即用扯系法醫之。

附錄　如以錏氯强盐一分、置於輭火棉酒千分內、敷於螫處、有效、以緋醇一分、加水五十至百分之消水、敷之亦效。

附錄　如因中士的年毒而致、甫發時、吸哥羅芳、或能抵之、忌用伊打、因其惹力過大、效過甚緩故也、如此患因他故而致、兼大便乾燥、以巴豆油一量滴、洋橄欖油一至二量滴、相合置於舌上、有速見大便之效、用引注血法亦效、如婦人分娩時、值有此患、必速用法使嬰孩出胎方可、

十五畫

附錄　甫患時、宜服草烏頭酒、以銀氰强礬消水、敷於陽囊、或能抵之、以氯酒敷於陽囊、亦效、若將鐵硫强礬消水、或怪阿寇抹膏、敷之、有止痛之功、倘若腫甚、以刀刺破陽囊、使液流出、有止痛之功、宜令病者躺臥、但必墊高其盆骨、方爲有益。

鼻衄 EPISTAXIS

附錄　服草烏頭、或藜蘆、或效、如以熱水浸足、用冰塊冰鼻、有效、以糰（即團粉）與白礬末各半、或以炭匿酸末、吸於鼻內、有效、有醫者云、用衣必格至八惡心、有效、倘用以上諸法、均不見效、將鼻孔前後用棉塞住、能止血流。

鼻臭 OZÆNA

鼻洇炎 RHINITIS

嘔吐之頭痛 SICK HEADACHE

嘔吐（惡心） VOMITING

十四畫

睥疱炎 PHLYCTENULAR OPHTHALMIA　　幾阿林　四六三

銾氯弱盐　二一八

楊梅濕瘰 (瘡濕瘰) CONDYLOMATA　　銾氯弱盐　二一八

楊梅遺毒瞭炎 (瘡遺毒瞭炎) KERATITIS, INTERSTITIAL　　阿色透　二三六

代漚尼　四〇三

附錄　服醫瘡症之藥方為合宜、如睛簾顯發炎之狀、宜以阿刀便敷於目內。

楊梅 (瘡) SYPHILIS　　猶柔分　二三六　　銾氯强盐　二一五

銾柳礬　二二二　　銾白土　二二〇　　銾氯弱盐　二二二

銾氯弱盐　二一七　　黃氯　二三四　　埃多　二三五

魚肝油　二三八　　銾抹膏　二三〇　　鋏氯盐　二三〇

電引藥法　五三四　　阿托益　二一〇

附錄　近有德國醫士、特為此症、新製一類砒藥、(即俗稱六百零六之藥)射於皮下、多有醫者用之、謂有神效、但只射一次而已、有時射後仍宜用銾類或氯類藥方能痊癒、未用之先、必須酌病者宜用否、因有目力虛弱者、一用此類砒藥、竟致其目大受損傷。

節腫 JOINTS, ENLARGED　　松節油擦藥　三八〇　　銨鋏菓抹膏　一四三

節炎 JOINTS, INFLAMED　　柳酸　二九一　　醇酒　二二〇

附錄　宜以硼强酸十厘、如水一量兩洗之、如顯成久炎之勢、可以白礬晶敷於瞼睟、或以甘油炭匿酸、或錏硫强礬消水敷之均可、如有膿液、可以銀氰强礬二至五厘、水一量兩、製成消水洗之、用後必以鈉氯盐消水洗之方可、如其畏光、宜帶墨鏡。

睟久炎 CONJUNCTIVITIS, CHRONIC

高銅硫强礬　一八一

附錄　以錏醋礬一至二厘、或錏硫强礬一至三厘、加水一量兩、洗之、以炭匿酸十厘、與甘油一量兩、合而敷之、均效、如曲光部有恙、宜帶合宜之鏡。

睟瘢炎 CONJUNCTIVITIS, GRANULAR

銀氰强礬　一八四

黃錸强錗抹膏　二三二

腎上棚[晶]　二四七

附錄　初顯時、宜以珂刀便四厘水一量兩之消水、滴於目內、後以硼强酸十厘、加水一量兩、洗之、如有膿液、可將錸氯强盐一分水八千分之消水洗之、或以銀氰强礬、或銀脭礬、製成消水、洗之亦可、如用銀氰强礬消水、用後必以鈉氯盐消水洗之乃宜、如用具壓滅睟上之瘢、常效著、係久症、銅硫强礬晶、或甘油炭匿酸、俱可用為敷藥、

睟膿炎 CONJUNCTIVITIS, PURULENT

蘇作多　二三七

銀脭礬　一八五

附錄　宜將淡銀丹敷於睟上、或以銀氰强礬十厘、加水一量兩、製成消水、先將膿洗出、後敷於瞼睟、再以鈉氯盐消水洗之以解藥力、有醫者於初生之嬰孩、以銀氰强礬二厘、加水一量兩、製成消水、滴數滴於目內、以防此患。

睟癧炎 CONJUNCTIVITIS, STRUMOUS

魚肝油　二三八

錸氯弱盐　二一八

附錄 以錸氣塩與加非印兼服、常有大效、故宜先用、切勿常用、莫非因其令人成癮也。

腦力猝衰 SHOCK

附錄 有此患者、熱度常係過減、故宜用煖身之法煖之。

腦中尿毒 URÆMIA

附錄 錸氣塩有免癱瘓之力、加非印有激腎經之功、如血壓過大、服甘油氰弱礬、能增小便、如心顯停止之狀、以士的年與毛地黃兼服、能激心經、倘病甚危險、用放蓋血法有效。

睟炎 CONJUNCTIVITIS, SIMPLE

附錄　每日服哈瑪米利消水一量錢、有效、如係瘖內積血所致、在腰際用火吸罐法、有效、如瘖微流血不止、服以利準油三至五量滴、最爲妙劑。

附錄　如胃好惹物、宜用吐劑、並服蓖麻油、或鎂硫强礬之瀉藥、由腸內瀉出不正之物、以莫非射於皮下、止其疼痛、腹上宜糊芥末糊藥、飲食宜用化腥梅之牛乳牛肉湯等。

經閉 AMENORRHEA

附錄　如兼大便乾結、阿羅之效、較大於鎂硫强礬、如因虛弱之故、洋斑蝥有效、如以鋏錳上礬、於行經前半月、日服三次有效、高錳弱蒡尤妙、如將芫荽油三至十量滴置於藥殼內、於行經前七日、日服三次乃宜、如因傷風之故、蘭草煮藥有效、於行經前數日、用熱水沐浴有效、如加芥末於水內、其效尤大。

經痛 DYSMENORRHEA

附錄　如兼系痛、服安替派林、或阿司炭尼利、有效、如宮覺痙痛、服黃茉莉、或顛茄、或鴉片等藥、並將顛茄製成陰彈、塞至宮頸有效、以印度麻與黃茉莉兼服有效、如兼悸症、以樟腦與阿司炭尼利兼服有效、服鋏氪塩亦效、如兼大便乾結、服鎂硫强礬、或阿羅乃宜、如兼血虧、服鐵藥與士的年補之乃宜、患經痛者、如用熱水坐浴、用後覆松節油熱袱、並服鴉片表散有效。

經絕 MENOPAUSE

經旺與痭 MENORRHAGIA AND METRORRHAGIA

十三畫

附錄　服鉀氯盐、每效飲食以牛乳爲宜。

附錄　如因瘖頸破裂之故、以氰强酸、或銀氰强礬、敷患處、有效、如瘖內存留胎膜、或瘖內發炎、以致泗膜過長、用刮匙刮其

十二畫

痔症 HEMORRHOIDS

附錄 以加淅酸二十厘、鴉片膏一厘、顛茄葉膏二厘、搽古律脂酌用、相合、製成肛彈十枚、每晚射一枚於肛內、大效、若以寇卡印十二厘、鴉片膏三十厘、黃氰一錢、輭煤油蠟一兩、相合、製成抹膏、敷於肛內、亦效、如以腎上腡精氯鹽一分、加水千分、製成消水、以布蘸之、覆於患處、有效、有醫者云、以氰强酸之濃者、用玻璃箸蘸點一二處、有醫治之功。

偏頭痛 MIGRAINE

附錄 以印度麻膏一厘之四分之一至四分之二、與黃茉莉十至二十量滴兼服、每二句鐘如劑服之、有效。

盜汗 NIGHT-SWEATS

附錄　初起時、服草烏頭、或兼服燧氰弱礬、有效、服鴉片表散亦可、以足浸於熱水盆內、並服熱檸檬水、有效、吸熱水氣、或松節油氣、有效、吸松楠之氣亦可、有時服衣必格、或阿甫莫非、爲吐劑、有效、如係成人、以巴豆油與洋橄欖油等分、敷胸有效、或敷氣酒亦可、如以芥末製成貼藥、糊胸有效、以布蘸松節油覆胸亦效、如係嬰孩、以琥珀油與洋橄欖油等分搓其胸背、有效、或用樟腦油搓之亦效、如症至中程、孩童服錏碳强礬、大效、或與錏氯盐兼服亦可、按錏氯盐有激氣脘泗膜之力、而鋏氯盐激力尤大、如服錏氯盐無效、可用此盐、但痰盛者忌服、阿魏辛伊加亦有激效、如痰粘滯難吐、服鋏檸礬與衣必格有效、如生痰過盛、顛茄寇苐印加泐酸等藥有效、如有乾嗽、鋏藍洽有效。

氣脘久炎 BRONCHITIS, CHRONIC

胱新炎 CYSTITIS,ACUTE

附錄　初患時、宜服鎂硫強礬、如至生膿、宜以撒斐日服三次、服印度麻、其止痛之能、較鴉片爲大、用熱水坐浴有效、如兼用溫水、或加鴉片、或以鴉片加橈水、射於肛內、能減胱急之患、若以鴉片顛茄黃蠟合製肛彈、用之亦效、如顯作燒、以草烏頭之足分劑、與蒁氰弱酒、並鋏橀礬、兼服有效、如係傷風所致、或單服顛茄、或兼服草烏頭、俱可、如係婦女、以幾阿林一至二分、加水百分、洗胱有效。

胱久炎 CYSTITIS, CHRONIC

附錄　服阿布田三至五厘、或烏伐流膏半至一量錢、有效、如尿過含鹼、服鋞安息礬、或烏羅透品、或硼強酸、能使含有酸性、如含酸過度、服鋞洮消水、或鋏梅消水、能使變爲鹼性、以幾阿林一至二分、加水百分、射於胱內有效、或以汞氯強盐一分、加水萬分、射之亦可、以鴉片一厘之四分之一至四分之二、製成肛彈、用之有效、如尿內含膿、以銀氰強礬一厘、加水四量兩、射於胱內、有效、但宜漸增藥力。

胱底椆遺液 PROSTATORRHŒA

氣脂炎 BRONCHITIS

附錄　初患時、如顯痧瘂、以鈉氰塩與哥拉兼服有效、如隱而不出、令其人生汗、則能表發、如患嗓炎、以鋊氯强礬、製成消水、用棉蘸敷有效、如皮膚作癢、以洋橄欖油、或他油類一量兩、加炜醇一厘、以手搓之、有止癢之功、有醫者謂每句鐘服鈉柳礬二厘、大效、如腎有失功用之顯狀、宜服激腎藥、若症甫見愈、服鐵與士的年等補藥方爲合宜。

附錄　初顯時、以敵痄盟二至五千度、射於二髆骨間之皮內、最爲妙品、將鋊氯弱塩、用升法使之成氣、吸之、或顯大效、鹽氯强洽爲最能祛假皮之敷藥、以噴霧具噴之、或以棉蘸敷、均可、敷鐵氯强塩酒亦可、忌服鉀氯强礬、因其有損於腎也、如必用之宜製成消水、以棉蘸敷。

十畫

附錄　早餐之先、以鎂硫强礬一劑、加水至僅能消化、服之有效、飲食中惟牛乳最宜、如係腎久症所致、服銾氳菓礬與荷蘭酒有效、如因心經有症而兼腎經被累所致、宜每日以毛地黃酒五至十五量滴與洋斑蝥酒一量滴、兼服有效、加非印、阿大那甚阿大麻等藥亦效、若係肝變硬所致、服銾氯盐有效、患此症者、如腹內⿸疒水多、宜用空針放之。

附錄　如胃內酸液過多、且作疼痛、鉍氯塩有效、如因胃弱而致此患、砒藥類爲妙、若兼瀉腹尤效、如因胃釀而致此患、安息裀透有效、用鉍柳下礬亦可、倘此二藥不能醫治、宜用洗胃之法、如腸內食滯、服氰强酸與苦補藥有效、有此患者無論因何而致、飲食之間、宜多留意。

附錄　以印度麻與他嗽藥兼用、大效、如係乾嗽顛茄、莫非、哥羅芳、寇苐印、赫囉印、代溫尼、黃莱莉、鬧羊花等藥有效、咳嗽過甚、檀香油有效。

咳血 HÆMOPTYSIS

附錄　哥拉鋏氮盐、能平腦部、服哈瑪米利、有效、以衣必格之微分劑勤服、大效、服甘油氰弱礬一厘之百分之一至五十分之一、有效、如以莫非射於皮內、不但止咳、且平腦部。

流血 HEMORRHAGE

附錄　先以紗布蘸滅臶消水、或以滅臶散撒於布上、覆患處後、以布條纏之、較用斂藥爲妙、如以筋膠敷患處、且射於皮內、有助血凝結之能、如大脉流血、用縛法乃宜。

流血痔症 HEMORRHOIDS, BLEEDING

腺、以免血積於其內、如仍生乳、宜用抽乳具抽出、倘顯生膿、宜速割放。

乳頭裂 NIPPLES, FISSURED

蔻卡印 九〇　魚石脂 二四四

炎症 INFLAMMATION

顛茄 八四　草烏頭 一五〇

印度麻 七九　銨鋏菓礬 一四三　鴉片 五八

黑白芥 四一五　藜蘆 一四六　松節油 三七七

洄膜諸病 MUCOUS MEMBRANE, DISEASES OF

砒 二〇二

附錄　如氣脘之洄膜受惹、服非洛漿、或胡麻子製之成漿、服之有平之之能。

花顛 NYMPHOMANIA

鋏氯盐 一〇四

花柳瘡（癀與瘰瘡） VENEREAL SORES

柳酸 二九三

肥胖 OBESITY

枯牌棚 二四五　鋏錳上礬 四五九

附錄　或云飲食中多用醋、有效、但於人有損、故不宜用、以冷水沐浴、有效、宜節飲食、而多食菓品、不宜多用生脂之食物、如肥胖過甚、艱於行履、宜只食去皮之牛乳、倩人揉揑其身、並宜服鎂硫強礬。

臥瘡 BED-SORES

阿羅 三四六　鹼貼膏 四三二

銀氰強礬 一八四

附錄　以白礬樟腦浮酒、與卵青和勻、敷於紅處、或每日將所壓之處、洗而揉揑之、後敷甘油、或以伯蘭地、加鈉氯盐搓其壓

附錄　以鉛醋下礬消水、與鴉片酒相合、敷患處有效、以傷處浸於極熱之水內、乃係最妙之法、但水之熱幾至燙人之度、則無效、如傷處久不復原、用乾熱法、有效。

身錢癬 TINEA CIRCINATA

氯　二一五　松節油　三八〇

鈉硼烘礬　四六五

疳 COLIC

阿魏　二四　哥拉　七二

黑白芥　四一五　鬧羊花　六七　瑪替開拉　三三一

附錄　成人患此症、服伊打雜浮酒、有效、孩童患之、以哥拉之小分劑、與鋏氯盐兼服、有效、孩童生牙時患之、瑪替開拉、有免之之能、用薄荷醫之亦可。

八畫

肺氣腫症 EMPHYSEMA OF LUNGS

加拉巴豆　一〇一

魚肝油　二三八　鋏氯盐　二三〇　熆氯盐　一九三

龍骨草　三九四　空氣醫法　五三九　氯　二一四

肺變硬癆症 FIBROID PHTHISIS

肺疳 GANGRENE OF LUNG

⿰火非醇　二七二

肺統膜積液 PLEURITIC EFFUSION

鎂硫强礬　三五〇

呃逆 HICCOUGH

琥珀油　四一九　伊打雜浮酒　三一
顛茄　八二　樟腦　二六　哥拉　七二
麝香　二

附錄　吸炭氣弱礬少許、每效、有時以辣椒酒二至十滴、多加水服之有效、夫用藥醫此症、必先知致此症之故、如因腸胃存有惹物、宜用瀉或吐藥祛之、之後可用平腦藥類、甘松酒、哥羅芳浮酒、樟腦浮酒、伊打雜浮酒、服之每能平胃與腦部、如人患腸熱而兼有此症、以麝香十厘、射於肛內、乃為上品、倘不得用麝香、可服琥珀油五至十量滴、如因食滯所致、服馬前子酒與轤氯酸、有效、如病至險程、以鈉氮盐與鴉片酒、射於肛內、或效。

呃嚏 SNEEZING

氣　一二一六

系幹作痛 NERVE, HYPERSENSATIVE

安替沠林　三〇二

卵腺系痛 NEURALGIA, OVARIAN

錏氯盐　三九二

禿頭 ALOPECIA

乍波蘭的　三八八

附錄　以齊墩便半至一錢、加羊毛脂一兩、研勻敷之、亦可以錴氯強盐二厘、醇酒一量錢、松節油七量錢、和勻敷之、如將欲脫之髮提出、以羊斑蝥消水敷患處、有效、倘用之過多、髮根必生微疱。

似霍症 CHOLERA MORBUS

撒婁　二九七　衣必格　三二八
樟腦　一二五

附錄 如尿含酸晶、服安息香酸、或鋏醋礬、有效、宜多飲以水。

附錄 每句鐘宜服樟腦丸一次、每次一丸、按每丸含樟腦三厘、服四至六丸為止、服麥奴印度麻亦效、以腎上棚精氯盐一分、加水五千分、製成消水、射於胱內有效、如尿血至甚、可將白礬二至三厘、加水一量兩、射之、但射後血必成餅、易於生膿、故未至甚者忌用、以莫非阿刀便相合、射於皮下有效、如於腰際用火杯乾法有效。

附錄 臨睡時、宜服硫與香散、使大便變成溏瀉、如不能服硫、可服蓖麻油、如於大便之先五分鐘、以黃氯一至五厘、製成肛彈射之、有止痛之效、如將姅醇一滴、敷於裂處、或能醫治。

附錄 服士的年每效、以炭匿酸五至十厘、加水一量兩、化勻、洗之亦效。

血過多 PLETHORA

渣笠 三五四

血中毒 TOXÆMIA

蓖麻油 三四〇　引注血法 五四二

血多白脒症 LEUCOCYTHÆMIA

砒 二〇二　氯 四六一

肌跳症 CHOREA

砒 二〇二　哥拉 七二
洋升麻 三三二　甘油氰弱礬 一一一　低鐵氯塩 一八九
銀氰强礬 一八二　樟腦氯弱塩 二八

肌痺(肌痛) MYALGIA,

丁香油 三一八　鴉片 五八
撒婁 二九六　巴根地柄 四一七　白黑芥 四一五
阿司炭尼利 三〇五

附錄　如因傷風所致、以鉀綠塩二十厘、與甘草流膏一量兩、兼服、或以洋升麻流膏二十至六十量滴、單服、俱效、外敷氯酒、或用擦藥、俱效、用揉捏法大效、如有患痺之根、服鉀氯塩、或柳礬類有效。

耳痛 EARACHE

附錄　宜服年心之劑、並宜覆熱水袋於患處、且宜灌熱塩消水於耳內、必須極熱、方見大效、可以顛茄酒鴉片酒相合、滴數滴於耳內、如耳鼓顯有凸狀、宜以刀割放其膿、

六畫

附錄　鴉片雖有令人安睡之能、如不因疼痛之故、忌用、莫非亦然、因疼痛而失寐者、以莫非哥拉之小分劑、兼用有效、但不必常用鴉片類、若用黑披那布哥拉藥類、亦能止痛、若單用哥拉、不能止痛、如病者顱腦血虧、用冷水沐浴爲宜、若因悸所致、用熱水沐浴乃宜。

孕婦大便乾結 CONSTIPATION OF PREGNANCY

辛那　三四八

附錄　如以辛那與羊鼠李兼服、有效。

孕吐 VOMITING OF PREGNANCY

砒　二〇四　草烏頭　一五〇

鈰草礬　一七五　寇卡印　九三　氯　二二六

衣必格　三二七　薄荷冰　二八二　鋏氯盐　一〇六

附錄　服草烏頭、能平腦部、如以鋏氯盐製成沸藥、(見百五篇)服之有效、製成消水、射入肛內、亦可、近多有服氯酒而見大效者。

生涎過多 (涎盛) PTYALISM

顛茄　八四　加滷酸　一六〇

生汗不止 (汗旺盜汗) SWEATING

硫强酸　一九六　炭匿酸　一五九　溵錯礞强礬　四三八

硄　一九九　鉦蓼　一七六　乍波蘭的　三八八

袱毛消水　四五八　鉛貼膏　一七二

用蒙藥而嘔吐 VOMITING AFTER AN ANÆSTHETIC

阿司炭尼利　三〇五

附錄　如係乾皮症、服砒類藥爲宜、並宜洗以鋏黑洗藥、後敷硫抹膏、或他類抹膏、如係濕皮症、敷鉦霧或鉍加沏礬等藥爲宜、寄生皮症、齊瑣便爲上品、其人若顯瀝狀、魚肝油爲妙藥、如兼作癢、氫藍酸有效、若係久症、魚石澁有效、按皮症以熱泉水沐浴最宜。

失和動之胃痛 GASTRALGIA OF ATAXIA

阿司炭尼利　三〇五

失和動症（脊腦後杜硬）LOCOMOTOR ATAXIA

芬阿錫呑　三〇八	安替派林　三〇二	鋏氯塩　二二九
哥拉阿米　七四	厄司阿金　三〇九	銀氰强礬　一八二

失寐（失眠）INSOMNIA

索弗拿　七六	鴉片　五七	甘松　二二
哥拉瑣　七五	台歐那　七七	鋏氨塩　一〇四
冷水袋　四九四	哥拉阿米　七四	單被蘸冷水裹法　四九六
哥拉　七一	入冷水法　四九四	熱濕布裹法　五九
多莫拉　四七四	哥拉呑　六九	布哥拉　七五
黑披那　四七三	度鉋司印　四七四	亥歐辛　六八
思寐那　四七五	莫非　五七	怕拉第亥　七八
	倍羅拏　四七三	

皮癢 PRURITUS

附錄　如敷寇卡印消水、暫時顯效、用土國浴法、亦效。

皮裂 CHAPPING

附錄　冬令時以甘油玫瑰水等分、和勻、數日搓手一次、可免此患。

皮症 SKIN DISEASES

白榭樹　一六三　鉦氯塩　四二一　鉦硫强礬　一七六

熱法　五一六

附錄　症初顯時、如於臨寢用熱水沐浴一至二句鐘、有效、且宜忌惹尿脘洇膜之食物、如以錸氯强塩一分、加水二萬至四萬分射入尿脘有效、以鈢錳上礬一分、加水六千分、射入尿脘亦可、如覺小便辣痛、溺時以大盌盛熱水浸陽莖於其內、溺之、其痛必減。

白濁久症 GONORRHŒA, CHRONIC

洋斑蝥　四一四

檀香油　三七七　松節油　三七八　以利準油　三七六

烏伐　三七四　鉦醋礬　一八〇　錸氯强塩　二一六

附錄　宜以銀氰强礬一分、加水千分、或銀腥礬一分、加水三千至五百分、或鈢錳上礬一分、加水二千至五百分、每日灌溉溺脘、如溺脘收窄、宜先用撐具後用以上之灌溉藥。

白帶 LEUCORRHŒA

鐵錏硫强礬　一八八　顛茄　八四

炭匿酸　一五九　錸白礬　一六六　金印草　四一一

白榭樹　一六三　赤蘇木　一六三　銀氰强礬　一八四

坐浴熱法　五一六

附錄　如以洋斑蝥火棉酒、敷於腰之兩側、生皰有效、倘白帶味臭、可以鈢錳上礬半錢、加水一量磅、射入陰道。

附錄　宜射錏沘於腿盂、以激心經、並呼吸司所、以鉗提舌、每分鐘十五次、乃爲妙法。

五畫

勿一次導盡、如以生皰藥敷於前心、常效、若病者健壯、初患時、可以蛭置於前心吸之、並可服藜蘆之足分劑。

中耳炎 OTORRHOEA

中耳眩暈 VERTIGO, AURAL

中漆毒 VARNISH POISONING

中鉛疳 COLIC, LEAD

中貫林毒 CINCHONISM

附錄　患此症者、如顯心跳、服草烏頭、或藜蘆、每有大效、服顛茄亦效、其心跳如因食滯之故、宜服助消化藥類、若因血虧而致、宜服鐵藥類、如患心胸過長、服草烏頭、或藜蘆、每有大效、用顛茄貼膏亦效、心撞不勻者、宜服顛茄、心經虛弱者、宜服鐵础苦補藥類、血壓過大者、宜服甘油氰弱礬、心變為脂者、宜服鹽盪類以抵之、不能安睡者、可服鴉片、用安息療法、有時大效、馬前子有激心之能、可因症酌用、無論何類心症、如用草烏頭、服後宜常躺臥。

心跳 PALPITATION, CARDIAC

附錄　詳見心症

心虛弱 HEART WEAKNESS

附錄　詳見心症

心鬆大 HEART, DILATATION

附錄　每二句鐘如服衣必格三厘、有效、有時服銀氰强礬丸、或以此礬製成消水、射於肛內、後以黃蠟作成肛彈塞之、有效、如育道洒膜久炎、每四句鐘服錏氯鹽五厘、大效、如患盟瀉久症、服鉍錏檸礬有效、無論患何類久瀉、總宜加意於飲食。

小產 ABORTION

附錄　如顯小產之狀、宜服鴉片或莫非、以平其子宮、如孕婦曾患瘧症、病根未去、宜服貴林、若無此病根、忌服、小產之婦、如兼大便乾結、宜服洋鼠李或甘草雜散、若無效、可服大黃或蓖麻油、切勿服大有惹力之瀉劑、胎膜下後、如顯作燒、可射幾阿林消水於子宮內、如以氯酒敷於子宮內、不但能止流血、且能滅穢、小產以後、如以麥奴貴林之小分劑、服十至十五日有效、但宜躺臥、不可操勞。

四畫

心痛急症 ANGINA PECTORIS

附錄　如病者全身絡脘鬆輭、服伯蘭地、較服炦氰弱礬類為尤妙、有時服安替派林二十厘有效、果使病者無關心之事、且服砒藥、數月顯效、服大花仙人掌或效、如其人心經虛弱、宜服毛地黃、有悸症而將患此症者、以伊打一量錢、加冰水服之、有抵之之能、如經用炦氰弱礬無效者、可以莫非一厘之四分之一至二分之一、射於皮內、能止其痛、如此症因過食而致、宜用胃抽器抽之、每餐後如服砒一厘之百分之一、能免復犯此症、患過此症者、必留意飲食、講求衛生、並服補藥、方能見效。

心症 HEART DISEASE

病症目錄

以前目錄、不過為考查某藥某法、有何功效、醫何病症而設、以後目錄、乃為考查某患某症、宜投何藥、並用何法而設、故於疾病之緊要者、列藥之外、附錄治法、醫家臨症、庶不致窘於無法耳。

三 畫

口白瘍 STOMATITIS

氰強酸	四八六甲	鉀綠強礬	三六六
烶醇	二七二	柳酸	二八九
寇卡印	九〇	鈉硼烘礬	四六五
蘇作多	二三七	洋蘇冰	二八四

附錄　如病者不能安睡、宜以鉀氮塩或鈉氮塩之中分劑、日服三次、並可敷玫瑰蜜、如瘍不收口、可敷以銀丹、倘兼肝失功用、宜服皇強酸、以輕氮強洽噴或敷之亦可、若兼大便乾結、宜服大黃或鎂硫強礬、孩童宜服錏氰弱浮酒、且未食乳之先、宜將乳頭洗淨。

口出臭氣 FETID BREATH

樟腦酒	二一六	鋐綠弱塩	二一八

口頰疳 CANCRUM ORIS

砒弱酸	三〇四	鈉硼烘礬	四六五

大腦積血 (顱腦積血)CEREBRAL CONGESTION

黑白芥	四一五

十九畫

二十畫

二十一畫

十六畫

十五畫

十四畫

十三畫

十二畫

十一畫

十畫

九畫

八畫

六畫

五畫

藥味醫法目錄

二畫

三畫

四畫

凝乳（JUNKET）此乳之製法、以牛乳一量磅、(500.0) 置於瓶內、加胃凝酶少許、（藥行中有胃凝酶之藥輪可隨意購用）以熱水溫之、至如人身之熱度爲止、置於冷處、俟其凝結、食時加香料、或肉蔻、或凡匿拉少許、如病者胃甚虛弱、此乳不易消化、可飲其餘而未凝之乳汁、如欲食尤有育力之乳、製時可以雞卵一枚、攪勻、加於乳內、則育力自增矣。

化脭酶粥（DIGESTED GRUEL）此粥之製法、以油麥或大麥或小麥或藕粉、熬之成粥、約半量磅、置於盌內、加冷牛乳半量磅、(250.0) 再加化脭酶輪一枚、置於溫水內二十分鐘之久、再置於冰上、而後用之。

洋杏仁湯（ALMOND MILK）此湯之製法、以洋杏仁一或二兩、(30.0-60.0) 去皮、置於臼內、搗爛、隨搗隨加滾水一量磅、(500.0) 傾於鍋內、置於火上沸之、越一刻鐘、以布過淋、再加滾水少許、使足一量磅 (500.0) 之數、不能飲牛乳之嬰孩、飲此大有養育之功、加白糖飲之亦可。

假乳（ARTIFICIAL MILK）此亦為患糖尿症者所備、製法、以大瓶盛水一量磅、(500.0) 加乳皮半至一量兩半、(15.0-45.0) 搖勻、過十二至二十四句鐘、乳皮之脂、必浮於水面、以小勺輕輕撇出、置於盃內、加水少許、及卵青一枚、以箸或勺攪之、攪畢、其形似乳、再加鹽與撒卡林少許、嘗之味亦似乳、但其中所含者、脂類甚多、乳糖較少、初次製者、或未盡美善、數次後自合宜矣。

香酒（MULLED WINE）此酒之製法、以丁香、洋桂皮、肉蔻、與肉蔻花、各少許、加水數量兩、置於火上沸之、貯於瓶內、飲庫厘酒、或他類葡酒時、內加所備之香料、其多寡隨人意 再加白糖少許、如用苦酒必多加白糖方可 仍置於火上、使之滾沸、方可飲之。

水浸烤麵包（WATERED TOAST）此包之製法、以麵包切成薄片、置於火上、烤至棕色、勻抹乳脂、再撒鹽少許、或欲撒胡椒末亦可、浸以滾水、使硬殼變軟、而後食之。

爲將杏仁之甜質取出後將搗爛之杏仁、置於器皿內、加乳脂三兩、(90.0) 雞卵二枚、攪勻、再加卵黃三枚、與鹽少許、攪動片時、又以卵青三枚攪而加之、置於鐵模內、以微火烤熟食之。

麩麵包 (BRAN BREAD)

此亦爲患糖尿症者所備、製法、以麥麩二升、置於滾水內煮之、越一刻鐘、將麩傾出過羅、如此二次、再於羅內加冷水滌之、至過羅之水無色爲止、不然、麩內必含糖質、恐與病者有損、過畢、以布包之、用力壓出麩內所含之水、薄攤於器皿內、上覆以鍋、置於極微之火上、終夜必乾、(不用此法恐難磨成細麵) 以磨磨之、過極細之羅、過時必以刷催逼、不能過者、再磨再過、如此雖不能盡成細粉、亦所餘無幾矣、後用麩麵三或四兩、(90.0-120.0) 雞卵三枚、乳脂一兩半或二兩、(45.0-60.0) 牛乳半量磅、(250.0) 先將雞卵攪勻、與乳少許、置於盌內調和、以所餘之乳與乳脂相合、另置一盌內溫之、後將二盌合而爲一、以麩麵加於其內、再加肉蔻或薑少許、攪令均勻、置於敷油之小鐵模內、烤於旺火上半句鐘之久、熟時麵包應厚四寸三、餐俱可食之、或與肉、或與牛乳餅、或與酥、同食亦可、但天氣潮濕之時、此麵包易攝水氣、須常置於火傍、烤至極乾、則不至發霉矣。

微火煮之、耗至一量磅之三分之二(333.0)爲止、後過以羅、方可飲之。

成人大麥湯 (Barley-Water for Adults.)

此湯之製法、以洋大麥一磅之四分之一、(125.0)加水二量磅、(1000.0)以微火煮之、耗至一量磅(500.0)爲止、過羅、加牛乳二量磅、(1000.0)加伯蘭地與灰消水各六量兩、(180.0)再加白糖少許、若加肉荳蔻檸檬皮亦可、此水大有養育之能、若涼飲之、其味美而異常。

油麥麵湯 (OATMEAL-WATER)

此湯之製法、以油麥麵一大勺、加水一量磅(500.0)熬之、至一量磅之三分之二(333.0)爲止、傾出過淋、飲時宜加卵青一二枚、以增養育之功。

米湯 (RICE-WATER)

此湯之製法、以大米二兩、(60.0)加水四量磅、(2000.0)煮至一句鐘爲止、方可飲之。

乳汁酒 (WINE-WHEY)

此酒之製法、以最佳之牛乳一量磅、(500.0)置於火上煮之、至將沸時、加厘厘酒四量兩、(120.0)不宜搖動、略一見滾、立即撤下、俟凝酥沉澱之後、傾出其汁而飲之。

洋杏仁粉包 (ALMOND BREAD)

此粉包特爲患糖尿症者所備、製法、以洋甜杏仁四兩、(120.0)浸以滾水、去皮、置於瓷臼內、搗爛、以布袋盛之、置於滾水內、過一刻鐘、加醋少許、

又法、以無脂無骨之牛肉二磅、(1000.0) 臠碎、置於瓶內、加冷水六量兩、(180.0) 置於熱水盆內、燉於火上、越四句鐘、方可用之。

肉精 (BEEF ESSENCE) 此肉之製法、以無脂之牛肉一磅、(500.0) 臠碎、置於瓶內、加雨水八量兩、(240.0) 再加鹽氣酸五六滴、鹽五十至六十厘、(3.3-4.0) 搖勻、置於涼處越三句鐘、傾於馬尾羅內、以勺署軋之、當肉汁未出盡之時、宜漸加水二量兩、(60.0) 如此所得之汁色紅、味似肉湯、病者最宜涼飲、每次可飲八量兩、(240.0) 如欲熱飲、不可置於火上、只可置於有蓋之器具內、以熱水溫之方可、若病者忌食酸類、可以烝水代雨水製之。

又法、以嫩而無脂之牛肉一磅、(500.0) 臠碎、加鹽少許、置於有蓋之瓷器內、將蓋縫糊嚴、置於火上、以鍋覆之、越三四句鐘取出、以粗羅過之、每次用二三小勺、(8.0-12.0) 足矣。

又法、以無脂之牛肉一磅、(500.0) 臠碎、置於有蓋之器具內、加冷水半量磅、(250.0) 煨於微火之傍、必至四五句鐘之後、始移至火上、令其緩緩滾沸、再越二句鐘、除去淤沫、乃可用之。

孩童大麥湯 (BARLEY-WATER) 此湯之製法、以洋大麥二大勺、加水一量磅、(500.0) 以

第一餐、早七句鐘、以美蘭所製之食物一大勺、加熱水二量兩、(60.0) 熱牛乳六量兩、(180.0) 化而食之、或以麵團一或二小勺、(4.0-8.0) 置於盌內、加熱水少許、隨加隨攪、使之勻和、再緩緩加牛乳六量兩、(180.0) 隨加隨攪、調勻食之亦可。

第二餐、十句半鐘、以牛乳八量兩、(240.0) 加灰消水二量兩、(60.0) 飲之。

第三餐、午後二句鐘、與第二餐同。

第四餐、五句半鐘、與第一餐同。

第五餐、十句半鐘、與第二餐同。

麵團 (The Preparation of Flour-Ball) 此團之製法、將最高麥粉一斤、用布包緊、置於滾水內、自晨至晚、煮至一日、取出晾於案上、次晨剝去外層之濕麵、銼成細末、用一或二小勺、(4.0-8.0) 置於盌內、加涼鮮之牛乳半量兩、(16.0) 研之成醬、再加熱牛肉八量兩、(240.0) 必須漸次加之、隨加隨攪方可。

肉湯 (BEEF TEA) 此湯之製法、以去脂之牛肉一磅、(500.0) 臠碎、置於瓷器內、加溫水一量磅、(500.0) 越一句鐘、傾於布上包緊、用力壓出所有之汁、與水置於鍋內、煨於微火上、頻頻攪動、一沸立即撤下、再加鹽與胡椒末、調和飲之、但飲時必以勺攪勻方可。

二正歲之孩童 Diet for a Child Two Years Old. 所宜食者如左。

第一餐、早七句半鐘、食微煮之卵黃一枚、並麵包一薄片。(但麵包必用隔一日者)

第二餐、十一句鐘、飲牛乳一盃、食抹乳脂之麵包一薄片。

第三餐、午後一句半鐘、宜飲肉湯、將牛羊肉或烤過或鬱碎、去筋、食之、或食洋芋、(俗名山藥豆)或大米飯、或飲牛乳、俱可。(所用之多寡亦酌此孩之食量定之)

第四餐、六句鐘、與第二餐同。

所飲之水如前。

一正歲之孩童 Diet for a Child One Year Old. (一日宜用五餐) 所宜食者如左。

第一餐、早七句鐘、以牛乳八量兩、(240.0) 加煮熟麵團、(做法見下) 二小勺、(8.0) 食之。

第二餐、十句半鐘、以牛乳八量兩、(240.0) 加灰消水二量兩、(60.0) 調勻飲之。

第三餐、午後二句鐘、以牛乳八量兩、(240.0) 加攪勻之卵黃一枚、調勻飲之。

第四餐、五句半鐘、與第一餐同。

第五餐、十一句鐘、與第二餐同。

半至一正歲之孩童 Diet for a Child from Six to Twelve Months Old. 所宜食者如左。

搖勻、再加酵 (Yeast) 半量兩、(16.0) 如力大者可少加之 將瓶口塞嚴、用繩結堅、因釀時氣力甚大必絆結其塞方免崩出之虞置於九十九至百度之熱水內、越八至十句鐘之久、提出、置於冷處或冰上、用時必緩拔其塞、否則瓶內之乳、難免突然噴出、最妙之法、莫過於取三變酒之合頁管、可隨意用之、無論成人孩童患重症後、當甫瘉之時、飲此大有養育之功、如味不甚酸、雖四五歲之孩童、亦易飲之。

養育孩童之食物表 (DIET LIST FOR CHILDREN)

此係養育孩童之醫院所定者、七正歲之孩童、患腸胃洇膜炎症、Diet in Gastrointestinal Catarrh for a Child of Seven Years. 所宜食者如左。

第一餐、早七句半鐘、宜飲牛乳、所飲之多寡宜酌本人之食量定之 每一玻璃盃牛乳、加灰消水四小勻、(16.0) 調勻飲之、並食微煮之卵黃二枚、將麵包切成薄片、烤焦食之、或食陳麵包亦可。

第二餐、十二句鐘、宜將羊排骨取出所有之脂、煎而食之、或烤牛羊肉一片食之亦可、隔二三日可飲牛肉湯、食陳麵包、或以麵包如前烤焦、食之亦可。

第三餐、晚七句鐘、宜飲加灰消水之牛乳、並食陳麵包、或將麵包如前食之。所飲之水、必須過淋或沸之方可、凡穘類之食物、宜少用之。

(150.0) 鬱而碎之、置於盌內、加鬱碎之胰腺一兩半、(45.0) 溫水三量兩、(90.0) 搖勻至成稠漿爲止、但此製只敷一次之用、如不用胰腺、以藥行所售之化腥糊輪代之亦可、猶有四類育物、製法如下、一 將胰腺 (150.0-200.0) 置於臼內、加溫水搗研之、此水之熱、必至百度、乃爲合宜、後以布淋之、置於瓶內、加鬱碎無脂之牛肉、(400.0-500.0) 並卵黃一枚、俟二句鐘之久、方可用之、此製足敷一日之用、但必須兩次射之、且射時其熱度必等於身體之熱度、方爲合宜、二 以肉湯一量磅、(500.0) 置於瓶內、加無脂之牛肉絲八兩、(240.0) 再加倍辛一錢、(4.0) 淡氫氯酸半量錢、(2.0) 置於熱至九十九度之煖處、頻頻搖動、越四句鐘之久、方可用之、但熱度不可太過、恐化功停止也、三 將牛乳二量兩、(60.0) 濃肉湯二量兩、(60.0) 卵黃一枚、胰腺消水一量錢、(4.0) 共貯於瓶內、置於熱至百度之煖處、越一句鐘之久、方可用之、若病者過於虛弱、可加伯蘭地半至一量兩、(16.0-32.0) 而後射之、四 將雞卵一枚攪和、與牛乳六量兩 (180.0) 共置於瓶內、後加凝結之濃肉湯二三小勻、(8.0-12.0) 再加胰糊少許、每五六句鐘射一次、若病者虛弱、每次射時、可加伯蘭地半量兩。(16.0)

酥酪 (KOUMYSS) 此酪之製法、以牛乳一量磅、(500.0) 置於酒瓶內、加白糖二小勻、(8.0)

湯、共置於大口瓶內、再加脭膏二十釐、（1.3）鈉氫碳强礬十五釐、（1.0）搖勻、置於溫煖之處、其熱以百零十至十五度爲合宜、每半句鐘搖瓶一次、至三句鐘之久、復傾於鍋內、置於火上、（此次火宜烈）速令滾沸、後用卵靑淸之、（淸之之法先將鍋撤下置於冷處數分鐘將卵靑稍攪之加於其內以勺攪合復置火上湯一見沸其中所有之碎肉必與卵靑粘合卽將鍋撤下越片時卵靑與碎肉必皆沉澱或將湯傾出或以布過淋俱可）再加鹽與胡椒末（其多寡宜隨病者之意）用之、如病者胃經不甚虛弱、不可用卵靑淸之、卽其中少有碎肉、因受脭梅之化力、亦易被㖃也。

化脭梅蠔湯（PEPTONIZED OYSTERS）此湯之製法、以無殼之蠔半茶盃、鑾而碎之、置於盆內、加以去殼時所得之水、但殼內之水多寡不等、多則可取其半、寡則宜盡用之、再加脭梅五釐、（0.35）鈉氫碳强礬二十釐、（1.3）將盆置於溫水內、此水之熱以百度爲合宜、越十至二十分鐘、再將盆置於烈火上、一沸卽速撤下、不但免其過火、且能止脭梅之化力、再加鹽與胡椒末用之。

射肛育物（PEPTONIZED ENEMATA）此育物之製法、與製化脭梅牛乳同、但未加脭梅之先、將雞卵一枚攪勻、加於瓶內、後以製化脭梅牛乳之法製之、如外加穀烝酒、或葡酒半至一量兩、（15.0-30.0）育力更增矣、但用時必須溫之方可、然專用育類射於肛內、則肛易被其惹、若專用一類之育物、被惹尤甚、故另有製育物之法如下、將無脂之牛肉五兩、

因其中之油並未提出也、但必用鮮牛乳、且於其中不可加減稚之藥、（如秡毛等類泰西售乳者多於其內加減稚藥以防變壞）以乳酸素輪中含有乳酸稚也。

化脭酶牛乳 (PEPTONIZED MILK)

此乳之製法、用一盛二量磅之潔淨玻璃瓶、以脭酶十二厘、(0.72) 和鈉氫碳強礬四十八厘、(3.18) 置於其內、再加冷水八量兩、(240.0) 搖勻、再加涼鮮牛乳一量磅、(500.0) 以勺調勻、將瓶置於熱水盆內、水之熱度、以手能忍受為合宜、如欲牛乳盡化、宜溫至二十分鐘之久、但尋常五分鐘足矣、如時過久、必致乳多成酶化能滲脭、其味變苦、當化功中程之時、宜將瓶提出熱水、置於冰塊上、以止脭酶消化、且乳不致變壞、如冰不便、宜將盆移於火上沸之、此亦止脭酶消化之一法也、但水一沸、速即撤下、塞住瓶口、置於冷處方為合法、（藥行中所常售者已製成藥輪每輪能抵此乳一量磅可隨意購之無煩自製）胃經虛弱者、如不能消化食物、飲此乳可免食滯之虞、如只欲助病者消化之功、備乳之法與上同、但不宜將乳瓶置於熱水盆內、只置於冰塊上、用時略溫飲之可矣。

化脭酶牛肉 (PEPTONIZED BEEF)

此肉之製法、以無脂之牛肉四兩、(120.0) 臠而碎之、置於鍋內、加水半量磅、(250.0) 煨於火上、（此火不宜過烈）以大勺攪合之、煮至數分鐘、將湯傾於盆內、所餘之碎肉、用大勺搗研成醢、即以此醢加冷水半量磅、(250.0) 與傾出之肉

之、或加灰消水少許、俱可免凝結之患、如胃甚虛弱、不能消化牛乳、可加脛梅、俟數分鐘飲之、(詳見下文) 如用肉湯、宜先以芹菜、或蘿蔔、或他類有味之菜、加於肉湯鍋內煮之、令菜味入於湯內方可。

乳油渣 (BUTTERMILK) 此渣之製法、以米粉二大勺、漸加新牛乳渣二量磅、(1000.0) 宜隨加隨和、以免成塊、後置於火上、(火不宜猛烈) 燉至十五至二十分鐘、即見滾沸、及時撤下、加白糖一至二兩、(30.0-60.0) 灌入瓶內、嚴密封之、置於冰塊上、此乳即分二層、上層爲乳水、下層爲凝成小塊之酥醒、服時必先搖動其瓶、令乳水與酥醒合勻方妙、按此乳之油、既已提盡、育身之力較小、故用米粉加白糖以增其力、且以米粉作之、則乳不致結而成塊、孩童體重每三磅服此乳三至六量兩、(90.0-180.0) 如孩童育道有恙、大便含酥、宜於前一二日服牛乳汁或米湯、後漸服此乳方可、成人亦可服之、以其味甚厚、不必多服、頗能育身、且易於消化、但此乳新而佳者、不能常得、故宜用法備之、即以乳酸素輪壓碎、置於瓶內、加鮮牛乳二量磅、(1000.0) 搖撼之、蓋嚴、置於熱至七十或八十度之居室內、居室愈暖、則成功愈速、越十二至三十四句鐘、此乳即成、後再將瓶置於冰箱內、此時即分二層、如欲服之、必搖令均勻方可、如此備法、則育身之功、較乳油渣甚大、

加胃化脛酶、與氫氣酸、以助其消化之功、以糖粻氫碳二類、能增人之精神力量、且能保全身膶、故亦宜用之、然以此二類相較、糖粻其最要者也、每有醫者、專用脛類養育病者謬矣、如將白米大麥小麥油麥等煮爛、用布淋之、以食病者、較專用脛類爲妙、如恐消化不易、宜加脏酶以助之、健壯之人、每日宜食糖粻類四百格、(瓦)(400.0)、氫碳類百五十格、(150.0)、脛類百五十格、(150.0)、凡人所食之物、大約俱含此三類、但多寡不等耳、至於人之身內、本多含水、故又宜多飲水以助之、豫備飲食、最要者有數類、列表如左、

一　必須易消化之物。

二　不可過於淡薄、因病者虛弱、少食之不足育身、多食之難免勞力也。

三　必須易咽之物。

四　必須色味兼美、尤宜精緻。


如病者日飲牛乳、日久難免生厭、宜設法改其本味、或加加非、或加白糖、或加茶、若加塩少許亦可、若將爲嬰孩所備之食物、西國多將易化之物配合專備嬰孩所食加於乳內、則能增其育力、倘牛乳入胃、凝結甚速、不易消化、或以大麥湯、製法詳見於後或以油麥麵湯、或以白米湯一半加

第三十四章　論備病者飲食之法


人之所食者、可分三類、一 脭類、多由動物而得、其中所含之氰質、最爲緊要、凡無脂之肉、皆係此類、惟卵青爲最純、由麥所得之穀膠、俗名麵筋 亦係此類、豆類亦有含脭者、名爲植脭、人食此類、有成身胴並補胴之功、腦力肌力及身內熱度、皆得其輔助、二 糖犢類、內含碳氫氧三質、其中之氫二氧、適足成水、最合宜者、即犢、犢膠、蔗糖、葡糖、乳糖等、人食此類、散於週身、即分化成水、與碳氧強洽、能增人之身力與熱度、但不似脭類入人身胴甚易、必俟變成脂類、方能入之、有保身胴之功、人當用力或寒冷之時、若不用此類食物以補助之、其肌力並熱度、必由身胴而來、難免有耗胴之虞、三 氫碳類、此類亦含氰質、但所含無幾、不足與氫盡化爲水、最常用者、即脂與乳脂等、人食此類、亦有助力與熱之功、其所異於糖犢者、因成脂甚易、此脂存於身內、當用力或寒冷之時、即變成熱與力、身內之胴所以能保全也、故糖犢與氫碳、在多用力之人、必須多用、否則少用之、此三類食物、醫者於病人不可專用其一、而俟其見效、必察病勢相濟互用、乃爲合宜、如患熱症者、身內之胴消耗、必多宜多用脭類以育之、即肉湯雞卵筋膠等流質之物、蓋患此類症者、胃液缺少、消化之功用必不足、故宜多食流質之物、且於其中宜

血流至該處、以至停積、若用此法、減其全身之血壓、則該處所積之血、因而散佈遍身矣、患中瘋者、昔常以此法醫之、近有醫者、查明此非妙法。

第一百零七圖




第一百零八圖



此二圖係引注之具、皮下灌盐消水、亦可用之。

第一百零九圖



此二圖係二類空針、短者射皮用之、長者插衁用之。

順衁割一小口、切不宜稍著衁之下面、以小剪剪之亦可、若割口之血凝結不流、宜用已滅穢之布、將其凝結者、謹慎擦祛、及放血已足、解去布捲、以滅穢之布、覆於割口、另用一布捲裹之、此係醫病之妙法、惟血壓過大者、方可用之、如健壯者患肺炎[1]、胸統膜炎[2]、腦衣炎[3]、腹統膜炎[4]等症、若放衁血、則血壓必減、而積血處之血、則自減矣、積血之患、始而緣於該處之血脘、較全身之血脘鬆輭、故

1 Pneumonia
2 Pleurisy
3 Meningitis
4 Peritonitis

揷入、但此管必先蘸於鹽消水內、以免盂血凝結之處、後以未結之綫、結於揷管之處、管之入端、必須畧大、方不至退出、管之外端、連以四寸長之庫秋管、以量滴筒、滿灌消水於庫秋管內、逼盡管內之空氣、後開引注具之管、使消水流出少許、不使空氣稍留其中、再以引注具之管、與入盂之管相連、撤去犬齒鑷、上提引注具、約高病者之臂二尺、令消水緩緩入於盂內、每二量磅 (1000.0) 消水、必需時半句鐘、消水甫入盂內、脉即見爲有力、呼吸亦漸復原、病者如有作燒之勢、亦常能減少、但自二分至三十分鐘之間、必覺寒顫過甚、或脉力速猛、及至過三刻鐘、面必發紅、生汗不止、或呼吸甚促、小便頻數、更有由肛出水者、然皆無妨、越數句鐘、自見實效、至於或痊瘉、或見大效、皆在於病原之輕重何如耳、如流血過多、與血中毒、(即膿菌毒與腎炎腦中毒) 並糖尿症、而致昏迷者、宜用此法醫之、亦可以醫瘓癱之患、此法能醫以上諸症者、除流血過多外、乃在速祛身內之毒也、但糖尿與腎炎久症、其效不久、惟流血或產後熱症、以此法醫之、則永不再犯矣、腎炎腦中毒、或產婦之瘓癱症、倘血壓過大、宜先放血、後用引注法可也。

放盂血法 (VENESECTION) 此法以布捲緊裹病者之臂、(不宜過緊、恐脉脘被壓而流血受阻也) 令盂內血滿、鼓起易見、先以刀割盂上之皮、割口約半寸許、後割盂鞘、及見盂之藍色、再以刀刃向上、

錏氯塩	Ammonii chloridi.	5.0
蒸水	Aquæ destillatæ	1000.0 —M.

又方

鈣氯塩	-Calcii chloridi	0-25
鉀氯塩	Potassii chloridi	0.1
鈉氯塩	Sodii chloridi	9.0
蒸水	Aquæ destillatæ (Sterilized)	1000.0 —M.

此方必先以法滅穢、用時置於火上、熱至百零一度、傾於引注具內、見一百零七圖及一百零八圖將病者之肘節前處、用滅穢之法滅盡其穢、以布捲緊裹其臂、使盂顯露、以刀割開盂上之皮、用鉗上提盂鞘、緩緩剖之、令盂不連於鞘者約長半寸、用小而轉之犬齒鑷、夾住割口以上之盂、以免其血上行、用絲縛綫結住割口以下之盂、另用一絲縛綫、穿過盂下、不可結之、如此則鑷與綫中間之盂、血必滿足而鼓起、以小剪剪一微口、將小玻璃管

卸之亦然、卸後宜令躺臥半至一句鐘之久、方可移動、前數年常以此法醫脊腦後柱實症、近日鮮有用之者。


引注血法

(TRANSFUSION) 此法之用意、乃因人流血過度、醫者割他人之盃、以小管引血灌入病者血脂內、亦有先去血內之絲膛、然後灌入者、此二法近少用之、因此血一入彼身、血內之紅脒、即已盡死、故病者腎經之功、非極其加增、不能袪此死脒也、且引注之後、血於脂內、每易凝結、非但無益、反有漂團塞絡之損、並人身之血、彼此不同、用他人之血、引注病者身內、多不相宜也、曾有引注牛乳者、然亦不得謂爲妙法、蓋用後尿內含胎、亦必有漂團塞絡之患、故不宜用、近日醫者、每用盐消水射於臂或腿盃內、不但能醫流血過多[1]之患、即血中毒症[2]、亦能醫之、若射於皮內、較射於盃內尤妥、但其效遲緩、若病勢垂危、血運無力、必射於盃內、方能救之、如兼有痳腫之患、亦宜射於盃內、製盐消水之法不一、有醫者用烝水百分、鈉氯盐一分之十分之七、製成、即每二量磅(1000.0)烝水、加鈉氯盐一錢半、(6.0)有二艮方如左。

鈉硫强礬 ℞-Sodii sulphas. 10.0

1 Hemorrhage
2 Toxæmia

第一百零六圖



此圖表明居山如何使肺經舒展、其實綫乃未居高山之胸膛、其虛綫乃已居高山之胸膛、

九 身體無力運動者。

十 年邁或嬰孩而患此症者。

十一 兼有尿胞之患者。

或云此症兼有瀉腹或食滯之患、不宜居之、然有此二症、每有居之而見效者、如兼有盜汗之患、居於高山大效、患此症而已成肺巢者、如巢不甚大、亦可居之、有人雖無肺癆症、而身體過於虛弱、時值冬令、如居溫暖之處、數月大有裨益、如值嚴冬之際、在寒冷之處、易犯癖痺二症、若於溫暖之處、居之數月、可免此患。

懸法 (SUSPENSION) 此法乃以一滑車懸於屋頂、中貫一繩、一端繫皮帶三條、一帶用以托首、一帶套於右腋、一帶套於左腋、令所托之分量、相差無幾、且首上所用之皮帶、必使合宜、勿令病者覺痛、於是執繩之一端、上提病者之身、離椅約高二寸、初用時、三日懸一次、每次半分鐘足矣、數次後、可日日懸之、且每次可懸十分鐘、但懸時切宜緩緩、

高山、得乾燥潔淨之空氣而見大效者、亦有居平原、得潮潤溫暖之空氣而見效者、故患此症、宜居何處、醫者每不能預定、惟試有益於病者、擇而居之、如多吐痰之癆症、居於高山有效、因空氣乾燥也、若兼有心經虛弱者、不宜居之、如氣管發乾、浮海有效、或居空氣潮潤溫暖之處亦可、若有吐血之患、欲居高山、宜緩緩登之、或隔一日、或隔數日、始再上升、必須二或三十日、至其巔頂方可、如求速至、恐空氣淡薄、肺經未曾習慣、吐血反增也、如肺經缺舒展之功用、居高山有效、患肺癆症有不宜居高山者如左。

一 氣管多受損傷者、

二 兼有氣腫之患者。

三 心經虛弱者。

四 屢作燒熱者。

五 驚懼不安或失寐者。

六 如係婦女、欲居高山、必須謹慎、此類婦女、不服水土者、較男子尤多。

七 肺經大受虧損、或症至晚程者。

八 患肺炎癆症者。

被阻、或積血、兼有易犯癲或痺症、其故大約因常好美食、身體虛胖所致、飲此水大效、熱道之人、肝經囊館等被阻、或屢犯大便乾燥、致有育道發炎者、用此水有效、緣此類水多有含鈉硫强礬者、故有瀉效、空腹服之、瀉效尤顯、如於清晨服之、能瀉腹中之水、並腸內不正之液、且能散肝經之積血、每日宜飲一至四量磅 (500.0-2000.0) 不等、必酌病用之、第三類之水、其效多緣熱力、所含之礬鹽類、多寡不等、能醫久皮並痺癲癱等症、水之熱自九十三至百五十度不等、病者如用此水、宜按熱篇用熱水法用之、否難見效、癱症或重癱症、以此水浴之大效、用法、患癱症者、用熱至九十度之水、日浴一次、每次二十分鐘、浴畢、他人以粗布拭乾、後以汞抹膏搓其右股之內面、第二次搓其左股之內面、如此循環搓之每效、但用抹膏之多寡、必酌病用之、不可過一錢 (4.0) 第四類之水、原含硫鐵二質、亦有輕瀉之功、育道泗膜炎、或氣館泗膜炎、以此醫之每效、亦有用之以醫陰陽尿徑泗膜炎者、但無甚功效耳。

空氣醫病法 (CLIMATE)

此法常以之醫肺癆、氣腫、痔症、或氣館久炎等症、有效、最要者、宜擇少有陰雨之地、使病者居之、且宜多居房外為是、但所擇之處、宜與室家相近、病者方不至有遠行之苦、更宜察該處之飲食房屋、果與病者有益否、患肺癆者、有居

十二句鐘、侍病者念誦書籍或報紙。

午後一句鐘、用午餐宜食牛肉少許、或煎或烤俱可、其他無非肉湯及易消化之物。

三句鐘、用電氣。

四句半鐘、與午前十一句鐘同。

六句半鐘、用晚餐宜食柔輭之物、且宜少食之、或食牛乳酥、或食克搭、此乃牛乳與雞卵所作者俱可。

九句半鐘、飲牛乳一盃、隨即寢睡。

每日如此、病者必無煩厭之心、如用以上之食物、不能消化、必須少減、以此法醫病、足能保養其力、專於呼吸運血消化食物、雖身體虛弱、以不分心他事、則消化之力、有非他人所能測者、然必須如法盡行、否則難於見效。

泉水醫病之法 (MINERAL SPRINGS)

中華醫病之泉甚繁、因道路不通、鮮有知之者、故難指出所在、其醫病之故有四、一因水最純、二含鹼礬類、三水出時含有熱力、四含硫鐵二類質、第一類之純水、能醫易犯尿酸者、因此類病、飲食過度、且少運動、致腎無祛渣之力也、或謂此水、有醫胱石之能、然實無此效、但能預防此患、以人多飲此水、因而多有小便故耳、第二類之水、內含鈉鉀鋏鎂等原質之礬、故有利小便輕瀉之功、肝經

令病者躺臥二十至四十日之久、旁有小室爲侍病者之居所、病者除見醫生與侍病者之外俱當廻避、以免應對、費其腦力、若病勢甚重、即一飲一食亦必侍病者哺之、切不可因躺臥煩悶、起坐片時、如欲觀書閱報、侍病者當代爲念誦、亦不可過一句鐘之久、一切梳洗之事亦必侍病者代爲辦理、然身體必須活動、其法有二、一揉捏其全身、令血運行、二用隔路綫電令全身之肌縮緊、此二法日用一次半至一句鐘足矣、今將每日所宜用者、詳陳如左。

早七句半鐘、宜飲牛乳一盃、至於或冷或熱或加膲[illegible]、則酌病而用之。

八句鐘、侍病者宜以溫水揸其全身、揸後用冷水揸之亦可、如是則皮與絡部俱收被激之效、但揸時宜以絨被裹其身、惟留所揸之一處、揸畢、再用粗布拭乾、隨搓其皮、使之發紅、以被覆之、另揸他處、至搓徧全身而後已。

八句半鐘、用早餐、所食之物、以雞卵或煮或沃或炒俱可、若食麵包、必切片烤焦、或食羊排骨、或食雞肉少許、亦可。

十句鐘、用揉捏之法。

十一句鐘、可飲牛乳一盃、或與伯蘭地同飲、或伯蘭地與雞卵同飲俱可。

蛭吸血法 (LEECHING)

美國所用之蛭、有二類、皆出自歐洲、至於中華之蛭、今尚未詳、無論何處發炎、或積血、以蛭吸出患處之血、必效、吸時蛭自口中流出一種特別之液、能令血不凝結、常有齧破之後、而血流不止者、即係此液之力耳、患腦衣炎[1]者、以蛭置於左右顳與項等處、吸之有效、扭傷[2]而紅腫者、亦效、患陽腺炎[3]者、將蛭置於會陰處、(切不可置於陽囊)吸之、患眸炎[4]、或他類眼症、置於顳或耳後、(切不可置於瞼上)吸之俱效、此法之妙處、不僅在吸血、且有外惹內效之益也、用法、未用此法之先、將該處洗淨、以蛭置於小玻璃盃內、合於患處、以免逸出、如其不吸、以乳加糖或血少許、敷於該處、引之亦可、如吸血已足、仍吸不止、可以鈉氯鹽撒於其身、則必立止、每一蛭能吸血約一量錢(4.0)吸畢、宜洗淨該處、以止血流、如終不止、宜以絨布蘸止血之藥覆之、用布捲纏裹其血必止、吸處所留之瘢痕、雖不甚大、究不可用於面上也。

安息療法 (REST CURE)

每有病者、形似沉重、及詳查各經、皆無確症、其故大概由於過勞耳、如壯婦扶持病者、因日久用力過度、或致成積症、血虧消瘦、搯痛、卵腺痛、腦系痛、月經不調等患、男子或因勞心過甚、以致精力疲乏、形容枯槁、凡此諸病、用此法俱效、蓋此類病者、腦力既已耗盡、醫者宜設法休息其腦、不使稍用其力、宜備一寬闊之室、

1 Meningitis
2 Sprain
3 Orchitis
4 Conjunctivitis

法、但所用之電、切不可使人痛苦。

洗胃之法 (LAVAGE) 此法用之醫胃鬆大[1]、或久炎症[2]、常效、亦有以醫胃疽者、但功效稍遜、如於未食之先、用此法則有洗出洇液之功、必須溫水方可、所用之具、以庫秋管爲佳、其長短宜至四尺半或五尺、以尺半由口入胃、孩童用之、宜長至二尺半、入胃之長短、酌其身而用之、用法、以庫秋管、埃腭彎入腟內、由此緩緩入胃、管上不必敷油、宜令病者下咽、則嗓內之液、已足潤管之用、如欲作嘔、則用棉蘸寇卡印消水、點於嗓內、經用三四次、自無此狀矣、管至胃中、將小漏卮安於管之上端、直提過頂、以溫水灌之、至胃滿足爲止、(見一百零三圖) 後將一桶、置於其前、下垂漏卮、成虹吸流水之勢、流出所洗之汚穢、(見一百零四圖) 所用之庫秋管、如不合宜、亦不能有益於病者、故當酌宜而用之、且管孔不可過小、恐胃內之實質、不易流出也、如只引出流質、實質仍存、再食時、則新舊之食相雜、必致復有釀壞之患、而病勢仍作矣、夫庫秋管入胃之端、旁必有竅、其竅之大小、宜適於用、然此管係尋常洗胃之具、如胃內有不易洗出之物、必用胃抽器方可、胃抽器易傷胃內之洇膜、孩童用之尤險、且其價甚昂、携帶亦不甚易、每有醫者、以未經用過之新導溺管、洗孩童之胃、但用時必以繩繫管之上端、方免下吞之虞。

[1] Gastric dilatation
[2] Chronic gastritis

第一百零四圖



此圖表明水滿胃後、使管端下垂、引出其水之法。

第一百零五圖



此圖表明耳炎新症、以蛭置於耳前或耳後、吸血之法。

第一百零三圖



此圖表明用洗胃管之法

舌根提起、而空氣易於入肺矣、若病者閉口甚緊、則空氣尤易進入。猶有一法、以鑷起病者之舌、每分鐘十至十四次、以此法救人、已數見效、觀第一百零二圖、可曉然此法之大意矣。

射衇之法 (INTRAVENOUS INJECTION.)

此法不可輕用、可用之藥亦不多、必含酸鹼之中性、或畧有鹼性者方可、否則必致血結成衃、患惡瘧症[1]者、必射貴林於衇內、方能有救、詳見貴林篇　但宜射於腿衇內、若射於臂衇內、恐藥力至心甚速、心經有被阻之虞、用此法之礙難不一、詳陳如下、一 病者之衇、或因血少、形不外現、致醫者不易尋覓、二 射藥於衇內、空針易有貫過衇脂之失、三 用後每有衇炎之患、四 用後或衇內血結成衃、致有漂團塞絡之患。

電引藥法 (KATAPHORESIS)

此係直流電法、將電之正極、蘸於所宜用之藥內、置於患處、以電之副極、置於患處之傍、令藥力由電之正極過患處之膕、至於副極、乃爲妙法、腦系痛[2]者、以哥羅芳與醇酒各半、如法用之、必效、或只用哥羅芳亦可、患楊梅骨阜[3]者、如不能服藥、以鋰氯盐五厘、(0.3) 加水百量滴、(6.6) 如法醫之有效、患瘴症[4]者、若不能服藥、以此法用貴林醫之有效、如所患之症、必須用鈙氯盐或寇卡印醫之者、亦可用此


1 Pernicious malaria
2 Neuralgia
3 Syphilitic nodules
4 Malaria

置於噴霧具內噴之。 S.—Use in nebulizer.

引呼吸法 (Artificial Respiration)


此法之用、凡因欠氣而斃者、如溺水煤熏之類 皆可醫之、但此法不一、惟謝氏奚氏二法最妙、謝氏之法、令人伏臥、偏側其首、醫士在其人之股傍、或在身上作乘馬之式、以雙手按其浮肼、手之後掌、直向其腋之後綫、見謝氏之圖 用力夾擠、將胸內之空氣擠出、如氣脘有水或泗液、亦必擠出、放手則胸壁必自復原、空氣因之入肺、如此不已、每分鐘約十四次、俾呼吸之遲速、與常人等、奚氏之法、令人仰臥、醫者雙膝跪其首前、以兩手執其兩腕、貼地上提、至臂與肩平、則胸膛自然展開、見九十七圖 越片時、俾兩手向上、肘節挨地、則胸膛尤爲開展、見九十八圖 以上二法、皆有自然吸氣之功也、後提起雙臂、令二肘節相挨、夾擠其胸、見九十九圖 再後下按二肘、壓於胸前、夾擠之力尤大、見一百圖 以上二法、皆有自然呼氣之功也、此法宜用至一句鐘之久、且每分鐘、必用十六至二十次、俾其呼吸之遲速、與無病人等、雖已氣絕而無望者、仍宜如法醫之、曾有人氣絕已至一句鐘、此法尚能救之、但必須病者之喉、通呼吸之路、否則醫者宜以手指托其兩頷角、使面上仰、至頸與臥板成半直角形爲止、見一百零一圖 如是則會厭與

一百零一圖




此圖表明扶病者之頭使呼吸易於通達之法

第一百零二圖



此圖表明以鑷提舌令會厭離喉口使空氣易入肺內

第九十九圖




此圖係奚氏第三代引呼氣之式

第一百圖




此圖係奚氏第四代引呼氣之式

第九十七圖




此圖係奚氏第一代引吸氣之式。

第九十八圖




第九十五圖




此係小噴霧具

第九十六圖




此圖表明謝氏引呼吸之式

第九十三圖



此圖乃帶於身傍之具其具有三口由第三口吸氣以指蓋第二口氣由第一口而入呼氣時以指蓋第一口氣由第二口而出



第九十四圖 此圖係大噴霧具與壓氣筒、具上之諸瓶、可同時用之、擇其一二瓶用之亦可、

脘久炎症、必用激力尤大之藥、方能見效、良方如左。

郁加列油	℞-Olei eucalypti	一量錢	(4.0)
松瀝油	Olei picis liquidi	二量錢	(8.0)
阿波冷	Alboleni liquid	一量兩	(30.0) —M.

薄荷冰 ℞-Menthol 二十英厘 (1.3)

樟腦 Camphoræ 十英厘 (0.6)

阿波冷 Alboleni liquid 一量兩 (30.0) —M.

置於噴霧具內、日噴數次。 S.—Place in the nebulizer and inhale the vapor several times a day.

若外加哥利吞二至五厘、(0.12-0.3) 甚妙、以哥利吞有痲效、且有平泗膜之功、(詳見薄荷油篇) 新[1]鼻嚏甚重者、具方如左。

沙沙法油 ℞-Olei sassafras 三量滴 (0.2)

檀香油 Olei santali 五量滴 (0.3)


阿波冷 Alboleni (liquid) 一量兩 (30.0) —M.

置於噴霧具內噴之。 S.—Use in vaporizer.

此方內之檀香油無幾、僅有平泗膜之力、如欲其有激力、必加至三十量滴、(2.0) 若[2]氣


1 Acute coryza
2 Chronic bronchitis

第九十一圖



此圖係水作氣之具

第九十二圖



此圖乃一類吸具、用鉦片穿以微孔、具前置以海絨、滴藥於其上吸之。

寸半、將薄荷冰置於其內、以有孔之塞、塞墊以沙布、塞其兩端、口接其塞孔而吸之、新傷風[1]者、吸之有效、若第九十三圖、亦係隨身之吸具、其大端置海絨一塊、滴藥於其上、以小端挨近唇邊、吸之有效、夫噴霧具不一、惟噴之較細者最佳、此等具之用、在乎壓空氣之力、具之大者、另有壓氣筒、如第九十四圖、小者如第九十五圖、如以油類之藥、置於噴霧具內、其效尤妙、鼻嚏[2]或氣管新炎[3]、良方如左。

1 Acute colds
2 Coryza
3 Bronchitis

以此藥一至二量錢、(4.0-8.0) 置於吸具內、沸而吸之、每日四或五次、

S.—Place 1 to 2 drachms in the water in the boiler, inhaling the steam from a freshly made watery mixture several times a day.

但其藥已涼、不可再用、必換新者方可、若於寒冷之時吸之、必俟三四句鐘方可出室。

若氣脘泗膜炎、按九十二或八十八圖之吸具醫之有效、良方如左。

哥羅芳	℞-Chloroformi	半量兩	(16.0)
幾阿蘇	Creosoti	半量兩	(16.0)
薄荷冰	Menthol	十英厘	(0.6)

每三句鐘滴十滴於具內吸之。

S.—10 drops on the inhaler every three hours.

或用方中之一藥、吸之亦可、若痰過粘不易吐出者、以伊替氣盐滴十滴於吸具內、吸之有效、每有人將小吸具、帶於身邊、隨時吸之者、常用者以一玻璃管、口徑四分、長二

第九十圖



此圖乃醫哮吼之氣具

氣、不但有平氣脂洒膜止嗽之能、並有助藥之效、用時宜備一有氣管之具、(見九十與九十一圖)或以水壺置於酒燈上沸之亦可、吸氣時、病者之口宜與氣管相近、方效、氣脂炎[1]與肺癆[2]症、如兼有乾嗽者、良方如左。

松葉油	℞-Ol. pini sylvestris	一量兩	(30.0)
郁加列油	Ol. eucalypti	一量兩	(30.0)
幾阿蘇	Creosoti	半量兩	(15.0) —M.

以此藥一至三錢、(4.0-12.0)置於吸具內、沸而吸之、每日二或三次、

S.—Place 1 to 3 drachms in the water in the boiler and inhale the steam three or four times a day.


如病者咳嗽過甚、宜加哥羅芳浮酒半兩、(15.0)新喉炎[3]之良方如左。

安息香雜酒	℞-Tinct. benzoin. comp.	一量兩	(30.0)
薄荷冰	Menthol.	十英厘	(0.6)
哥羅芳浮酒	Spt. chloroform.	半量兩	(15.0) —M.

1 Bronchitis
2 Tuberculosis
3 Acute laryngitis

之每效、又有一吸氣之具、(見八十八圖) 此具之內、有阻氣之合頁、用之呼吸、非多用胸肌之力不可、故於肺經有益、更有數類藥入若吸其所散之氣、大有助肺經並全身之功、吸法有三、一以氣易散之藥、置於室內、令病者吸之、或用熱與熱潮氣、將藥氣散布、吸之亦可、二以海絨蘸氣易散之藥、置於吸具內、令病者所吸之氣、由海絨經過、三用一能壓空氣之大噴霧具、以氣不易散之藥、置於其內噴之、藥氣散滿於病者室中、吸之有效、但所吸之藥、因病酌用、錏氯鹽氣之用法、詳見錏氯鹽篇、哮吼[1]之患、如以薄荷冰數粒、置於勺內、以燈火煨之、使氣散於病者室中吸之有效、㖈嗽[2]或氣管炎[3]之晚程、如以布蘸幾阿蘇、或松節油、或替利本、或郁加列托、掛於病者室內、令藥氣散佈、吸之有效、若有盤布架、以蘸藥之布、迴摺架上尤妙、(見八十九圖) 亦有時於以上藥中、只用一藥之五至二十量滴、(0.3-1.3) 滴於滾水內、散其氣於病者室中、或用鐵管引入幔帳內、其法尤妙、(見七十七圖) 如以薄荷冰二至五釐、(0.12-0.3) 置於滾水內亦可、夫藥必滴於滾水中者、以滾水之


第八十九圖



此圖係一盤布架、以布摺疊擱藥於布上


1 Spasmodic croup
2 Whooping-cough
3 Bronchitis

第八十七圖



此圖乃使人舒肺之呼氣具

第八十八圖



此圖乃阻吸氣之具、此具有一方箱、內置蘸藥之食水絮、並安以合頁門、用時開其AB二端之蓋以B端啣於口內吸之、氣出A端入方箱、內氣由合頁門而入、故必用力吸之、方可呼氣時自C端而出、C端有一螺螄蓋、能使所呼之氣、多寡合宜。

（見八十七圖）A瓶先貯以水、練者吸氣滿足之後、口啣短玻璃管、順管呼氣、則令A瓶之水、流入B瓶、越數句鐘、再將B瓶之水、呼入A瓶、每日如此、則必見效、此法之妙處、乃在吸氣滿足後、呼之必須用力、不至一呼而盡、故肺經大獲舒展之功、肺經生長不足、並肺炎而復原遲緩者、或胸統膜發炎、而有粘連之患者、此法俱效、若胸統膜積膿、或積液、甫放之後、不宜用之、必俟數日、容肺於其膿液所壓之缺處、自行復原、倘數日後仍不復原、用此法助

如練此法、自無以上之弊、所以此症無由而生也、練法、病者宜背墻直立、以兩髀緊貼墻面、緩緩吸氣、至滿足爲止、心中暗數一二三、數畢、緩緩呼出、初練之時、即宜如此、每日宜早晚二次、每次四五呼吸足矣、越七八日、每次宜漸增呼吸之數、吸氣時、切宜緩抬兩臂、隨抬隨吸、抬至平肩爲止、呼氣時、切宜緩落兩臂、隨落隨呼、落至挨身爲止、越數日宜抬臂過頂、見八十圖抬臂既高、則吸氣尤易。

又有二練法　一吸氣滿足時、用肺經之鼓力、閉口呼出、二空頭仰卧於牀上、以輭枕墊於腰下、緩緩呼吸、以上之練法、不但於肺未長足者有效、即患肺炎、肺統膜炎、胸統膜積膿等症之後、吸氣不能滿足者、果如上練之至數月、吸氣之能力、必較從前迥異、且練此法、不但令病者思食、更能增血內之紅脒紅腥、並全身之力、猶有數類練法、雖似與肺無關、實大有助呼吸之功、練式見第八十一至八十六圖、人果能按圖練之、不但能增呼吸肌之力、並能使人挺身直立、大收舒肺之功、每因病者不練此法、以致聳肩弓背、肺經不舒、甚有壯年殞命者。

另有數類助呼吸之具、雖無甚大用、然能助人呼吸之興、一法、以A B二瓶、置於案上、以二曲玻璃長管、中以庫秋管兩端連之、揷於二瓶內、再以二曲玻璃短管、揷於瓶內、

第八十一圖



第八十三圖




第八十五圖



第八十二圖



第八十四圖



第八十六圖



癆、而其端已伏、如用此法、每能防之、蓋因人之肺尖、少得空氣、又於所得之空氣、不盡呼出、致使新舊之氣、弗能循環更換、故癆症多由此處而起、

曾有以此法醫腦中尿毒[1]者、不但使血內之毒、由腎而袪、並於未袪之先、能增血內之盟、而毒力減少也、(因令毒散佈於加倍之血內故其力減一半)膿菌毒[2]、並糖尿昏迷[3]之患、亦可用此法醫之、惟瘀腫者忌用、如因燙傷甚重、致腦力猝衰[4]者、用之有效、或因燙傷致血中毒者、亦可用此法醫之、割症後如腦力猝衰、用溫鹽水灌入連網內、大效。

吸氣練法 (INHALATIONS.)


此法醫病、乃為最妙者、然醫生多輕視之、論此法可分二類、一只吸空氣、二以藥氣散於空氣中吸之、西國大醫院內、專有吸氣之具、但此具價昂、置備不易、有醫者使人練吸氣之法、雖無此具、亦屢見大效、有數類病症、不用此法醫之、而終難見效者、設人在應生長時、肺未長足、或因所作之工、與肺有損、如按此法練之、俱效、初起之肺癆[5]症、此法每能醫之、若肺經虛弱者、雖未成

第七十九圖

練身圖



第八十圖




1 Uræmia
2 Septicæmia
3 Diabetic coma
4 Shock
5 Tuberculosis of lungs

第七十八圖



此圖表明皮下射盐消水之法

第七十七圖



此圖表明患氣脘炎症者、用二單被相連罩於牀上熏之之法。

價廉者、亦可用之。

皮下灌塩水法 (HYPODERMOCLYSIS)

製此水之法詳見引注法篇

此法之用意、特為增血內之盟、如患霍[1]症或流血[2]過度用之大效、他如血或溺內有毒、此法能滌除之、且有洗滌腎經之功、如因割腹後致患嘔吐、或胃生瘍而嘔吐者、身體不能得水之養育、形容枯槁、宜用此法以增身內之水、用法以滅穢塩水、置於玻璃筒內、筒底一口、一端套以庫秋管、一端安以大空針、刺入皮下之連膶灌之、則入絡部必速、一刻鐘每有利小便之功、但必先將該處及所用之具、滅盡其穢、然用此法、人每疑灌水過多、而不必疑也、夫人皆知將塩水灌於盂內、雖四倍於血、亦不增血壓之力、但灌於連膶、每刻鐘所用之水數、不可不酌人身之輕重以定之、大約每磅用水一量錢(4.0)足矣、假如人身重百五十磅、每刻鐘宜用水百五十量錢、(600.0)倘多用之、恐腎經之功不及、全身之膶有積水之患、水力之大小、俱係玻璃管之高下、若流水緩則力小、宜將筒提高、速則力大、宜落下、常用之法、必高於病者二或三尺、乃為合宜、水一射入連膶、必有作瘇之勢、然而無妨、射畢即消、如輕輕摩挲之、則消腫尤速、流血過度者、用水射之、每有神效、霍症至腦力脫失之時、此法甚妙、用後雖皮色變紫、然復原甚速、脉力漸增、亦不至如從前之氣促矣、


1 Cholera
2 Hemorrhage

方可、心疥腫、致腎經積血者、雖經醫者試用此法、然不得謂之無險、故不宜用、各類肺炎、俱忌用之、惟氣脘洒膜[1]輕炎者、用之有效、若以潮熱氣醫之、亦效、用法以竹四竿、立於牀之四隅、用二單被、以綫連之、罩於竿上、有如幔帳、令病者卧於其內、將單被罩嚴、用滅穢具盛水、以火熱之、如滅穢具不便、用磚架水壺、下燃酒燈、亦可以鐵管、將熱氣引入、病者多吸此氣、必有潤洒膜之功、見七十七圖 近有醫者、用乾熱氣以醫節炎筋炎肌炎[2]等患、每效、但此法必先備器具、最妙者如七十五圖 用一雙層銅筒、一端有口、口上繫以石絨布、內置一板、裹以石絨、安寒暑表於筒上、以驗熱度高下、將病者之腿、由石絨布伸入筒內、置於板上、腿下墊以麻布、以免受熱太過、後以酒燈、置於筒下、燃著、將筒口之石絨布、裹於腿根、以繩縛之、筒內之熱、能至二或三百度、雖用如此之熱、亦不致有被燙之險、因腿生汗甚多、並血運甚速故也、且不但病腿生汗、即全身亦必因之而生汗、宜日用一次、每次一句鐘足矣、或隔日一次亦可、但必須謹慎、勿使皮膚稍著銅筒、致受損傷、如因痺症、或受傷、以致骨節久炎[3]、此法大效、若因癲症則少效、曾有易犯之癲症、以致骨節久炎者、用此法醫之、用後其癲立即發作、較常尤甚、蓋因尿酸積於骨節、一經此法、則散布遍身也、此法最妙之具、價值甚昂、購置匪易、如第七十六圖、乃係

1 Bronchitis
2 Inflammation of joints and muscles
3 Chronic inflammation of joints

嚴、俾生汗之司所、受激、於濕被之冷力、越片時熱度必增、冷被變熱、而汗自生矣、癔類熱症、如含而未出、此法大有發表之功、孩童肌跳重症[1]若能抵冷水之力、以此法醫之最妙、無論土國俄國、或冷熱濕被之法、用畢、除癔類症外、均宜用冷淋具、或入冷水池

第七十五圖



此圖係乾熱氣具

第七十六圖



此係價廉之乾熱氣具

1 Severe chorea

一具、將人並椅以被圍緊、越片時燈之熱度、必能令人生汗、但用時必須謹慎、恐酒燈失火、燃著所圍之被、致受燒傷、最妙之法、置燈於被外、用一鐵筒、以此端之口、合於燈上、彼端貫入被底、熱氣進滿、亦能令人生汗、如將鐵筒以布裹之、不令熱氣四散、尤妙、若此法不便、可以磚或石數塊、用火燒之、置於椅下亦可、若病者虛弱無力、不能端坐、以酒燈置於牀旁亦可、見七十二圖 患腦力脫失者、此法亦妙。

熱濕布生汗法("Hot Pack") 此法先以庫秋布鋪於牀上、以乾絨被複之、再以一絨被、蘸於滾水內、擰乾、見七十三圖 複之、急令病者赤身臥於其上、速以所複之濕絨被、嚴裹其身、旁置熱水袋、以乾絨被及庫秋布、挨次裹之、不令熱氣外散、但頭上宜置以冰水袋、以免顱腦積血之虞、見七十四圖 腎炎[1]肌抽搐[2]或失寐[3]與痙[4]等症、用此法俱效、用時、每刻鐘必使病者口啣寒暑表試之、如熱至百零一度、即宜揭去所裹之被、用布拭乾方妥、用此法時、病者在濕被內、大約一句鐘、方可揭開、如未生汗、宜飲冷水一盃以助之、若係成人、宜於冷水內、加伯蘭地少許、孩童則加燄氰弱浮酒少許、倘仍不見汗、但覺熱度漸增、宜立時止而不用。

冷濕布生汗法("Cold Pack") 此法以單被蘸冷水擰乾、赤身裹之、再用一或二絨被裹

1 Nephritis
2 Muscle spasm
3 Insomnia
4 Tetanus

第七十三圖



此係絨被蘸滾水內以木搾乾之法

第七十四圖



此係以絨被蘸滾水裹病者之身後以乾被蓋之之法

用此法最妙、如因易犯之痺症或癲症、以致腦系痛者[1]、用此法亦大有效、初傷風時[2]、致鼻有膿涕、或他處泗膜發炎、如用此法每能醫之、卽傷風數日、亦效、惟肺經積血、或發炎、或氣脂久炎兼氣腫、或心鬆大而弱、俱不宜用、新喉炎症[3]、自覺喉中若無泗膜、或因傷風致患經閉[4]、此法有效、易患傷風者、其故有二、一因泗膜過弱、微一受惹、卽患傷風、宜服砒弱酸之小分劑、卽一厘之百分之一至五十分之一、(0.0006-0.0012) 日服三次、至一二月、爲止大效、二因皮或泗膜內之𧖴鬆大而無力、其中之血、緣受冷之故、積於臟腑、致患傷風、如每二三日、用此法一次、其𧖴必如常有力、則無以上之患矣。

俄國之浴法 (Russian Bath) 此法與土國不同、土國所用者、乃係乾熱、此係濕熱、濕熱不及乾熱生汗之速、病者易於受損、卽止汗之法、亦遜於土國、惟病者不能身往浴堂、在家中用此法最宜耳、用法、解衣坐於椅上、椅底置一水桶、將人並椅、用被裹嚴、後以鐵或石燒熱、置於桶內、令熱氣上騰、使病者生汗、凡土國浴法所能醫治之病、此法亦能醫之、但少有用之者、如患癔類熱症、含而未出、此法有助發表之功、夫通都大邑、皆有藻堂、固可隨時沐浴、若鄉里之間、藻堂不便、宜自備浴室、以爲浴身之用、其所備之浴具、形狀與錄篇內第四十九圖同、茲將用法詳陳如左、病者解衣坐於椅上、下置酒燈

1 Neuralgia depending upon rheumatic or gouty taint
2 Acute colds
3 Acute pharyngitis
4 Suppression of menstruation from cold

至此室、先有搓身之人、將其全身搓徧、後用淋具浴之、由熱而溫、由溫而冷、及用冷水時、不過一淋而已、如不用冷淋具、則宜跳入冷水池中、一入卽出、不可濡滯、出時有人用布拭乾其全身、入一偃息室、其室之熱度、與尋常居室同、在此室內、寢睡一句鐘、方可旋歸、按此沐浴之理、先入數熱室、無非令人生汗、後用冷水、無非令人止汗、若不用冷水沐浴、恐受風寒、致有臟腑積血之患、倘病者不能抵禦其冷、則不必用土國之浴法矣、腎炎[1]症、以此法浴之、最爲合宜、蓋此法能激發汗腺、以祛血內之毒也、誠能勤用此法、汗腺之功必加增、血毒之祛必加倍、不但補腎經之缺、且免癱瘓之虞、此法之宜勤與否、必先視其病勢、如腎經多失功用、二日一次、少失功用、六七日一次足矣、初用此法時、不宜卽入最熱之室、恐其不能受此熱力也、或僅入第一室、卽入淋浴室、迨經歷數次、漸能忍受其熱、方可遞入末室、且必與醫者同入、方保無虞、不但患此類病者、必須如此謹慎、卽患心症者、亦當若是、如浴時不能生汗、此乃凶兆、恐其中暑、或中尿毒、或顱腦積血也、醫者當切記之、久痺症[2]、以此法浴之亦效、若新痺症、不宜常用此法、因身內之熱度過高、且心經多有帶累之患也、久痺症無甚作燒之勢、且心經不甚虛弱者、若用此法於其過長之骨節、與受損之肌肉、皆有大效、人若勞碌過度全身發板[3]、

1 Nephritis
2 Chronic rheumatism
3 Muscular stiffness following prolonged physical effort

於熱水內、必見速效、白濁[1]症、臨寢時坐熱水中浴之、可免莖舉硬痛之患、否則必須服藥、或在痛時吸烖氣弱磐有效、嗓口抽症[2]、以絨布數層、蘸熱水覆於頸上、以油布裹之、不令失散其熱、必見大效、各類目痛、如以絮浸於熱水內覆之、每效、但必屢換方可、用此法者、不當倣用糊藥之法、只一二句鐘足矣、有醫者、用吊水袋滴熱水於臉上、但袋上之流水管、距目不宜過遠、其效與上同、如因𥨪頸與𥨪頂抽搐、致患經痛[3]、坐熱水中浴之、或用熱水射入陰道、俱效、如因𥨪積血致患白帶[4]、或𥨪墜、此法亦效、歪頸[5]患、有時將熱襪覆於骯髃肌之上、有效、有醫者云、如某處發炎、以布浸熱水覆之、其痛可減、若已生膿、反增其痛矣、如人皮膚或腎經失其功用、可用乾熱或濕熱之法、(其法見下) 助此二經、以祛血中之廢料、此二熱法、係俄國與土國之浴法也。

土國之浴法 (Turkish Bath) 此法有一浴所、中分數室、(至少者二室、多則不過五室) 其熱遞增、第一室熱至百度、末室至百五十度、此數室皆有熱而無水、但令人生汗而已、其法先入第一室、俟身生汗、再入第二室、依次至極熱之末室為止、每入一室、必停片時、入第一室時、如不生汗、宜飲冷水以助之、仍不生汗、即當出室、或因受熱無力而氣短、亦當出室、如無此二弊、遞至極熱之末室、方可入淋浴室、此室上懸淋具、具內之水、有熱溫涼之別、一

1 Gonorrhœa
2 Spasmodic croup
3 Dysmenorrhœa
4 Uterine congestion and leucorrhœa
5 Torticollis


鐘、再如法射之、但不可終日不輟也、按理論之、初次最易見效、但因初用時、多不合法、故每至二三次始效、無膽識之醫者、每不敢用水過多、且每次射時、必俟水盡流出、方敢再射、如此不但無益、反增其患、多射水於腸內、與呼吸絡二部、無甚關涉、但所射之水、熱度過高、難免有損耳、割症後病者身體衰弱、宜用水數兩、射於肛內、不但免其口渴、且免尿閉之患。

用飲食管之法（GAVAGE）此法有養育之功、如人因患病不能飲食、或因瘋癲不肯飲食、宜用此法、每以未經用過之軟導尿管、置於鼻或口內、透入膣中、管上口安以小漏巵、將牛乳或湯類、灌入胃經、庶免病者饑餓而死。見第七十一圖

熱法（HEAT）此法醫病、與冷法同、但冷熱二法、當以病者自擇爲是、踝節扭患[1]、最妙之法、以熱水浸足數句鐘之久、水之熱度、至僅能忍受爲止、如此不但減其疼痛、且能令患處速於復原、用法、將足浸於熱水盆內、俟能忍受、漸加滾水、因水之熱度愈高、則效愈顯、浸畢、用絨布蘸鉛醋礬消水與鴉片酒裹之、或以魚石湍抹膏搓患處、越數句鐘、再如法浸之、如此數次、必效、紋肌及無紋肌、如有抽搐之患、以熱法醫之乃妙、腰痺症[2]、或他處之肌發板、先以紙數層覆患處、以烙鐵往復熨之、每效、莖舉硬痛[3]、若將陽莖浸

1 Sprained ankle
2 Lumbago
3 Chordee

第七十二圖



此圖表明病者不能坐起用潮熱氣熏之之法。

第七十一圖



此圖表明由鼻孔用飲食管之法

堅厚者、否則恐成匾形、膿與洄液不易流出耳、所用之水、仍宜用塩消水、（因淨水有惹力故用此水）加炭匿酸或硼强酸少許、因此二藥俱係有益而無毒、用水之多寡、宜以洗淨洄液與膿為度。

醫大小腸不通之法　此法乃以入水管、緩緩射水、驗其有效否、如無效必延外科剖腹醫之、腸褪與腸塞二患用此法有效、若過十二句鐘無效、必延外科醫之、若腸扭結者少效、用法與醫痢症同、但不用出水管耳、腸褪之患常在闌門扇、或曲胴、故水易至患處、初射時宜將吊水袋懸起數寸、使水滴滴而入、待腸內水滿、再將袋提高、但不可過三尺、水之熱百零一至三度、最為合宜、若不及此度、病者身內之熱必減、過則必增、孩童腸褪之患、其水袋之高、不宜過二尺、無論成人與孩童、初用時若提高水袋、必惹腸肌發板、將所射之水逼出、非但無益、而病勢反增矣、醫此等症、各類擠水筒俱不宜用、因射時不能定力之大小也、近有醫者、用擠水筒以醫此類症、竟致腸裂、立時殞命者、有三人焉、蓋吊水袋之力緩且平、擠水筒之力促且激、故用擠水筒不如用吊水袋之相宜也、醫此類症、必須用水甚多、若腸不能存、大概因初射時、水力過猛、若先滴滴而入、後則使水力漸增、越三刻鐘、倘不見效、宜令水流出、或以他法醫之、或過二三句

非[illegible] Gum. acaciæ 三十分
鴉片酒 Tincturæ opii 二分

此醫嘗云、用此法洗腸、足可射水過闌門扇、然射健壯者之肛內、必用極大之力、方能過之、其人必致受傷、但旣係病者、闌門扇必虛弱無力、令水過之、亦不必甚用力也、方中所以用炭匿酸者、因其最爲有益耳、誠以此酸一分、加水百分、熱至九十八度、將腸內之染穢、置於其內、過一句鐘、穢必被阻而不長、若用此酸半分、加水百分、越六句鐘亦大顯其阻穢之效、有著名醫者、亦謂炭匿酸之消水、有敵腸內穢毒之能、其效不一、一能縮腸內鬆輭之血管、二 能阻穢之生長、三 能免穢毒被㖩、四 能使腸液有酸效、五 能激腦系部、六 能免身熱過減、並免尿閉、及腦力脫失等患、若射水於胴內、以醫痢症[1]、雖非近今之法、而近來醫生多有用此法者、若用鹽消水、（與人血內所含之鹽同）不但使藥力達於患處、且一過發炎之泗膜、必有平之之效、如此不特腸內之泗液或膿被祛、即腸內之穢毒、因所射之水甚多、力亦必微矣、醫成人之痢症、必用出入二水管、入水管與吊水袋相連、用時必深入於肛內方可、出水管只入肛門而已、其大小與入水管相同、必用

1 Dysentery

水、當漫過所便溺者、且便具不宜留於屋內、便畢、當即傾之、切不可傾於近井之處、恐有未滅之穢、散布水中、亦不可傾於地上、恐晒乾爲風所飄散也、必埋於土中爲最妙、患染症之甚者、如以錸氯强盐一分、加水萬分、或以𤇀醇一分、加洋橄欖油百分化之、以擦其身、或效、紅熱症如用此類藥擦之、頗有去癢之效。

洗腸之法 (ENTEROCLYSIS) 此法近數年來用之醫病、甚有功效、但其用不一、一 洗出胴內之汚液、二 以藥置於水內、洗時令藥潤於腸之迺膜、三 若病者冷甚、宜以熱水射於胴內、以增身內之熱度、四 如病者作燒過甚、宜以冷水射於胴內、以減身內之熱度、五 似癨症用此法甚妙、用法、以炭匿酸一至五錢、(4.0-20.0) 與鴉片葡酒一量兩半、(45.0) 加水四量磅、(1920.0) 調勻射於肛內、有醫者用𤇀醇、或錸氯强盐、或柳酸、加水射之、然俱不甚妙、因𤇀醇與錸氯强盐、毒力過大、柳酸不易消化、故用之少效、有名醫之良方如左。

洋苦菊花冲藥	℞-Infusi anthemis floræ	二千分
炭匿酸	Acidi tannici	十　分


動之、但室內不宜置有水之盆、恐藥氣為水所攝也、室內每千立方尺、必用袱毛消水五量兩、(150.0) 置熏具於室外、其管必由門隙穿過、見第七十圖 熏至十句鐘之久、方可啓戸、如屋透氣、過二三句鐘、再熏一二次乃可、若以此消水一分、置於大器皿內、以錻錳上礬半分加之、如用消水三十二量兩可加此礬十六兩 加時不必用火、藥自沸而成氣、熏之亦可、又有一法、將所能移之物、移於院中晒之、後以滾水與鹼刷之、並刷室內木板、此水用畢、宜隨即煮之、以滅其穢、後以錸氯强塩一分水五百分、或千分之消水刷之、不宜擦乾、因此消水、存之愈久、滅穢之力愈大也、再灑以袱毛消水、越二十四句鐘、方保無虞、但莫妙於將袱毛消水、用大噴霧具、由外噴於內室、無論何症、病室宜常通空氣、病痛後宜洞開窗牖十數日方妙、醫者查明、最妙滅穢之藥、袱毛消水為上品、其次卽錸氯强塩一分水二百五十或五百分之消水、然能力最大者、惟錯氯粉、但改變布色、故少有用之者、此粉價值甚廉、然行中所售、多係失氯而無效者、故購時宜查明之、如以此粉一碗、和於一盆滾水內、以刷地板、頗有滅穢之功、若置於中厠、大有滅穢敗臭之效、錸氯强塩消水、如遇脂質、其力必至受阻、故宜以他藥置於其內、以免受阻之虞、見防穢法 患染症者、大小便具中、當常存錸氯强塩一分水五百分之消水、庶其內之穢、不至散布、所用之消

第六十九圖



此圖表明肺瘃腫、肺初炎、氣管炎等症之處、用火吸罐之法。

第七十圖



此圖表明熏袪毛消水之式。

滅穢之法（DISINFECTION）

此法有三、一用火燒病者之衣被等物、絕穢生長之處、二以熱度過常之水氣、熏被染之物、或用滾水煮之、三用滅穢藥類滅之、此三法惟第二最妙、然於居室甚爲不便、醫者常將受染之衣被等物、置於滾水內煮之、至二句鐘之久、常有以受染之物、由病室移至他室、俟暇煮之、如此不但令存留之屋受毒、即所經過之室、亦大受其傳染、其害良非淺也、若以滾水一筩、或鋏氯强鹽消水一筩、（此消水較滾水尤妙、即藥一分水千分所成）在病室內將衣被等物、浸於其內、後移至鍋旁、以滾水煮之、至二句鐘方可、更宜將鍋覆嚴、以增熱度、且免毒氣四散、煮時宜屢加水、恐有鍋乾衣灼之虞、此時屋內不宜作食物、並不宜存食物、恐受毒染、食之有害、如不能用煮法、必將受染之物、浸於鋏氯强鹽一分水五百分之消水內、或浸於焳醇一分水二十分之消水內、亦可、但以消水浸之、不及以滾水煮之耳、患染病者、或痊癒、或死亡、室內之病毒、當設法除之、不使散布、此爲緊要之理、最妙之法、莫過煮絨毛消水、放其氣於室內、此氣與氯氣迥異、不能改變布色、未放氣之先、室內所有透氣之隙、當用紙糊嚴、被褥地毯等物、宜懸掛繩上、令藥氣易於熏入、若有書籍、宜散開篇頁、置於案上、藥氣則易入其中矣、四壁宜以水噴之、因水能攝藥氣以滅毒也、如地板有痰、宜以水潤之、倘其乾硬、宜以器具活

製松節油熱袱之法（Turpentine Stupe.） 詳見松節油篇、其用法乃以熱袱敷患處、為時不宜過長、恐其生皰也、與貼辣椒貼膏同、故宜酌量用之、如用此類藥、致皮過於受傷、可以純蠟膏或軟煤蠟、或洋橄欖油敷傷處、每百分中加烐醇一分尤妙、因烐醇不但有滅穢之力、兼有痳效耳。

用洋斑蝥之法（Cantharis） 此藥所生之小皰、不必放皰內之水、待皰破時、以食水絮覆之、如生大皰、先以滅穢之針刺破、以放其水、後以食水絮覆之、如此不但新皮速生、且有保護患處之益、用此藥敷於患處、必至八句鐘、方能生皰、病者必至痛苦難忍、越五六句鐘、祛之另敷糊藥、則其痛減少、而功效無異。

火吸罐法（CUPPING）

此法取其外惹內效之益、用法有二、一 不吸出病者之血、乃以一玻璃罐、底有小孔、孔內有合頁塞、用時將罐合於患處、以抽氣筒抽出罐內空氣、後以合頁塞閉住、待其自落為止、如肺腎二經積血[1]、用數罐合於患處、吸之有效、惟胸統膜與腹統膜之新炎、忌用此法、恐統膜被傷也、二 吸出病者之血、用法與上同、但必先將患處之皮、割破數處、使血隨吸而出、不但有外惹內效之功、亦有放血之效、虛弱者忌用、緣其血衰故也。

1 Congestion of lungs or kidneys

法用氯酒亦可、患此症者、最宜躺臥、如患處作燒過甚、宜以冷水袋覆之、兼用托囊帶、或合口貼膏托之、庶免其墜痛、倘全身作燒、服草烏頭酒有效、如欲止某處之疼痛、不宜先用生皰藥、只用芥末、薄荷冰、薄荷油、辣椒、松節油、香糊等類、令皮發紅而已、成人腹痛、常以芥末覆之、嬰孩但以香糊覆之有效、如因食滯或因顱腦積血與血虧、或腦系痛等、致患頭痛[1]、以此類藥敷之、俱效、腦系痛[2]、以薄荷冰、或薄荷油敷之有效、如痛處與目相近、必謹慎用之、勿令所敷之藥入目也。

製芥末糊藥之法、以芥末與麥粉相合、用熱水或熱醋調之、卽成、成人用之、必芥末麥粉各半、乃爲合宜、若孩童只可用芥末一分、麥粉三分、用法、先以厚紙鋪於案上、後以粗布複於紙上、將此糊藥攤勻、上覆細布、（恐藥力惹皮也）將紙之四圍折回、如鏡框然、（用厚紙取其有挺力）（覆時不致攤軟）覆於患處。


製香糊藥之法（Spice Poultice）此以派門他、丁香、洋桂、肉寇等末、各一分、胡椒末半分、攙勻、置於布袋內、使之平勻、以綫縫之、後以酒或醋溼此袋之一面、覆於患處、若皮膚薄者、宜少用胡椒丁香、以免皮膚受惹、覆此香糊、可留數句鐘或數日之久、視其病勢、再爲揭去、醫孩童之胃洄膜炎[3]、或食滯症[4]、此爲妙法。

1 Headache　3 Gastric catarrh
2 Nouralgia　4 Dyspepsia

蝥貼膏、製如銀圓之大小、貼於痛處、或貼於脊骨之旁、大效、腹統膜炎、宜貼於痛處、顱腦炎、宜貼於頸上、猶有若許之纏延炎症、卽久白濁、骨節過長纍棚炎等症、用此法亦效、雖有作燒之患、仍可用之、（按常理論之作燒不宜用此法）若骨節炎、宜以起皰藥敷於癰處之旁、膝節炎、如節左右之皮、未見紅色、亦可敷之、白濁久炎、宜以洋斑蝥火棉酒、敷於陽莖之下、或會陰處、有效、無論何等久炎、如用洋斑蝥無效者、宜以鐵燒紅（燒紅而止不宜太過）燙潰之、有效、或用鈉沘鋉沘砒弱酸類之潰藥亦可、但用此類藥後、該處之胭、受潰必甚、故着力日久不失、有醫者、將鋑鋉菓礬抹膏、敷於某處、以致成瘍、其效與潰藥同、若某處發炎後、有滲出之質、敷洋斑蝥、令其生皰、有效、卽如胸統膜發炎、所滲出之質、久不退去、宜以洋斑蝥敷腋下二三寸處、乃係最妙之法、或以皰內之水、誤爲滲出之質謬矣、蓋生皰只激發滲出之質、使之退去也、若胸膜內有滲出之質、乃係血絲膣之類、敷洋斑蝥必無大效、如骨節久炎、兼有滲出之質、敷洋斑蝥有效、然其效究不及氣酒、因氣兼有攺症之能也、但敷氣酒、宜至皮變黑、方能見效、凡此類久症、宜以氣抹膏日搓患處、有效、如皮膚變紅、宜停數日、以免過於受惹也、頸上之纍棚脹大[1]、未生膿時、亦可以氣抹膏搓之、精腺冠炎[2]最妙之醫法、乃以銀氰强礬濃消水、刷其陽囊、以皮變黑爲止、或如


1 Enlarged cervical glands
2 Epididymitis

第六十八圖



此圖乃表明人體之背面敷生皰藥處耳痛、或頭暈敷處如O、腦衣炎、或顱腦底積液敷處如M、咳血敷處如H、胸統膜炎敷處如PL、骿間系痛敷處如I、腎炎、或脊痛敷處如KS、骨節痺敷處如R、

第六十七圖



此圖表明人體之正面敷生皰藥處、心統膜炎敷處如A、闌尾炎敷處如P、嗓炎敷處如L、嘔吐、或胃炎敷處如V、胸統膜炎敷處如PL、骨節痺敷處如R。

練之後再練升降樓梯、最妙者、乃造一五六級之小梯、結構堅固、兩旁有欄、不致有跌落之虞、練時必專用其腿力、方能見效、盖練此法者、每多用其手力攀欄、以拽其身體、亦有畏其腿屈伸之難、用兩臂之挺力而上者。　又法、使病者坐於圈椅上、起坐練之、但起坐時、不准假手之力、凡練此法最緊要者、不宜過勞、以致有損、每日練二三次、每次一刻鐘足矣、且練時一聞所命、宜即從之、如臂有失和動之患、宜會通以上之法練之。


外惹內效之法

(COUNTER-IRRITATION) 此法乃用有惹力之藥、敷於皮上、以免發炎、或積血、或疼痛、或祛炎後滲出之質、此類藥分三種、即潰藥、起皰藥、紅皮藥、是也、無論某處發炎、不宜敷於該處、宜敷於四圍、或輕點於紅處之四圍、令起微皰、或敷於腦系相連之處亦可、如目發炎、以起皰藥敷於耳後有效、蓋因此處腦系與目之腦系相連也、按覺系受傷之時、痛處常在系末、故腹內系痛、或胼間系痛、常因脊梁有病而致、宜以此類藥敷於脊骨之旁、痛系所出之處、髀癧初起時、其痛乃在膝或踝節、必以此類藥敷於髀上、方能見效、用此法以醫炎症如下、如肺統膜炎[1]、肺炎[2]、眼簾炎[3]、因痺或受傷所致、滑膜炎[4]、顱腦炎[5]、腹統膜之新久炎[6]等症、用之皆效、若肺炎、或肺統膜炎初起時、以洋斑

1 Pleurisy
2 Pneumonia
3 Iritis
4 Synovitis
5 Cerebritis
6 Acute or chronic peritonitis

病者久臥、其肌久不經用、以致功用漸失、練行動時、或有旁腦司所並旁腦系、代作其不作之功、其故雖難細解、然用此法、每能見效、最緊要者、宜加意緩緩練之、否難見效。


第六十六圖



此圖係練和動格具

練腿之法　病者仰臥牀上、舒其雙腿、使人手對病者之足、約高二尺、伸其一指、令病者抬足觸其指、如此練三四次、則縮腿使足及股、繼縮之使膝及腹、再緩伸其腿、仍觸人指、二腿互相遞練、既畢、將腿緩緩放於原處。　又法、乃木板所製之練具、此具上有十二格、以爲置足之處、（如第六十六圖）病者臥時、二足置此具之二格內、有人令其抬足移於某格、宜立從之、設右足在第一格、令其移至第四格、左足在第七格、令其移至第六格、不宜違令、此具之楞、宜釘以布、以免足踵受傷。又法、令病者閉目而立、初練時、必有顚仆之患、練至數月、或能立穩、後則開目以一腿站立、如能立穩、仍閉目練之、或以黑油在地板上、刷一黑道、約寬一尺、使病者履之、不可令其足偏於左右、如其病重、必須有人扶之、若赤足履之尤妥、但不宜使踵先着地板、且不宜使其足橫行、此二者乃失和動者恆有之弊、俟能履此道、再刷一窄道、

第六十五圖



此圖表明浴後抬出之式

六 患腸熱症者、每三句鐘、宜入冷水一次、水之度數、宜在七十或五六十度。

七 用冷水沐浴時、如因器具不便、可以他器代之、不可因而輒止。

八 不可用庫秋蟠覆於腹上、因其令人皮色變紫、不能增病者之精神。


九 用冷水之大意、無非使病者抵拒其冷、以增其生命司所之力。

和動之練法

(CO-ORDINATED MOVEMENTS FOR TREATING LOCOMOTOR ATAXIA AND MYELITIS.)


此法之大旨、乃令失和動者、練習行動之法、果能如法練之、必見大效、按人失和動之力、其故有二、一因脊腦中有病、二因

第六十三圖



此圖亦表明用沐浴抬板之法

第六十四圖




此圖表明沐浴時以抬板置於盆底之式

四 如病者不喜冷水、寧可多搓其身、令早出水、切勿加以熱水。


五 沐浴之時、不可不搓病者之身、免其過於受冷。

第六十一圖



此圖表明沐浴抬板之式

第六十二圖



此圖表明用沐浴抬板之法

搓之、方能使熱血至於皮膚之血管內、以免臟腑積血之處、近之著名醫者、用冷水醫病、所宜切記者有九、臚列於左。

一 用冷水非爲減熱、乃爲增病者之精神。


二 用冷水時、不宜使病者皮色變紫、或牙齒戰顫。


三 切勿因病者不喜冷水沐浴、聽其遂欲出水、如牙齒戰顫、則不必禁之。

片時、倘不復原、則用熱水袋覆其足心、並飲穀烝酒少許、則無此狀矣、無論用何類冷水之法、用時宜以冷水袋覆於頭上、以免顱腦積血之患、且以浴盆置於牀傍、俾病者少受煩擾、如無抬板、必須數人謹愼抬之、方可、最要者、不令病人稍費氣力、抬板有數類、以最便者言之、即木板一塊、中作數孔、大小與浴盆之底同、一端以活板作枕、可免頭入水內、用時以庫秋布、鋪於牀上、以此板置於布上、後移病者於板上、使之入盆、盆內之水、宜僅沒其身、若水過多、必致身體浮蕩、最爲不妥、浴畢、將板之上端、搭於盆邊、下端墊以橫木、使水下流、用布輕輕拭乾、越數分鐘、抬至鋪庫秋布之牀上、暑熱時、只覆一單被、冷時可多覆一絨毯、但不可過嚴、且不可於覆濕單被時覆之、否則反增其熱度也、腸熱症如已越十五日、不可以冷水浴之、蓋其力甚弱、不能抵水之冷也、如在初患時用之、不但有袪病之益、且能保其身力不失也、如兼有腸流血、或心經虛弱、或腎經發炎等患、不宜用之、或言兼患肺炎者、仍可用之、然肺炎若非肺經血停之故、仍不可用、按患腸熱症者、初三四日、雖用冷水沐浴、熱度必難減少、他類熱症則不然、醫者宜切記之、無論此類症、熱度如何、宜每日用右手執海絨、蘸冷水揸其全身、以左手搓之、此不特潔其皮膚、且增其精神、中暍者、可以冰塊揸其身、或以冰水沐浴、但必多

此圖表明患腸熱症者、病至七日後、以冷水揸身至八十五次、熱度減少之狀、圖中之直虛綫、乃揸時所減之熱度、直實綫乃揸後所增之熱度、橫虛綫乃每日早晚之熱度、可知用冷水減熱之法、不但獲效於一時、而其所保護者甚大也、如揸時熱不見減、乃係水之冷力不足、或搓法不合宜之故、揸後熱不見增、乃係抵冷之力不足、宜加熱水少許而搓之、越數日專用冷水、則能抵禦矣。

署高、俾水易於下流、水之度數、宜酌病勢用之、此法蓋因單被噴濕、水氣易散、而熱度必減耳、用時亦必搓其全身、令血入於皮膚之血管內、可免血停臟腑之虞、以上之法、如不能減熱至百零一度、則宜用入冷水法醫之、其法如病者之熱至百零二度、或百零二度有半、常以七十度之冷水一盆、將病者放於其內、每三句鐘一次、每次十五或二十分鐘之久、宜以寒暑表噙於口內、或深塞於肛內、如其熱減至百零一度、即宜出水、不必拘定時刻、否則恐熱度過減、無力抵冷、有腦力脫失之虞、但在水內時、必有人搓之方可、如未入水時、以牛乳半盃、穀酒半至一量兩、(16.0-32.0)合服、能助其抵冷之力、當初入水時、病者自謂寒冷難忍、及至出水面變藍色、此狀雖似甚險、究屬無妨、越




TEMPERATURE (FAHR.)
DATE
RESP.
PULSE
DAY OF DISEASE
URINE
BOWELS
February
ON ADMISSION
SPONGE
ENEMA MILK OF ASAFOETIDA (EFFECT)
ASAFOETIDA ENEMA

第十六圖

必速、且增生命司所之力、如先用溫水、後緩加冷水、則失其激絡腦二部之力、而少有功效矣、病者用冷水沐浴、與健壯者用之、其理同、皆為激其生命司所耳、如甚虛弱、宜先用溫涼之水、後日加冷水、至能忍受為止、擦冷水法、病者年邁或虛弱、如用此法、水之度數、宜酌病勢用之、九十至七十度不等、如能抵七十度之冷、即宜用七十度之水、若抵冷之力微小、必用尤溫之水、方可、用時宜以一手持海絨擦之、一手隨其擦處搓之、若係青年、或不甚虛弱之人、水之度數、亦宜酌病勢用之、七十至三十二度不等、倘身熱不見減少、則以冰塊擦之、但必隨搓其皮膚方可擦、時以庫秋布鋪於牀上、覆以絨被、使病者解衣而臥、則牀上之被褥、不至濡濕、但必多搓其脊背、方可、蓋背肌與皮膚最厚、每多存熱、血則多停於此、故宜多搓、且搓腰時、腎亦大得其補助、如病者有抵冷水之力、用後皮必發紅、血運更顯有力、腦力尤為靈便、如以約二斤之冰塊、擦病者之身、務須謹慎、而退熱之效最準、腸熱症[1]越七日者、用之必效、倘其無效、必用者不得其法耳、最要者乃以一手持冰塊擦之、一手隨其擦而搓之、則血方能往復運行、且能抵冰之冷力、有醫者用冷水擦病者之身、而不見效、則用小牀一張、鋪以庫秋布、再覆以單被、使病者解衣而臥、以單被覆之、以水置於噴壺內、以澆其身、但必使小牀一端

1 Typhoid fever

遍身之血則均勻運行、若過於虛弱、可使立於溫水盆內、以免足冷之患、用畢、宜躺臥片時、失寐[1]之患此法亦能醫之、若因顱腦內血運不過而致、或過用腦力、至當寢睡時、腦仍不能休息、此法每效、亦有時此法能激人之全身、使已失功用之經復原、但宜日用一次、如醫失寢之患、則臨睡時用之、他病則用於淸晨爲最妙、見第五十九圖。

醫熱之冷法 (Cold in Fevers) 凡各類熱症、用溫涼水、或冷水、或極冷水、醫者俱宜因病酌用、有病者心神不安、不能寢睡、然其熱不見甚重、若以溫涼之水、或以水與酒各半、或以穀蒸酒加鹽少許、搓其全身、則腦部可安、熱度亦減、必能穩睡矣、或有但搓其四肢而見效者、然必沿脊背搓之、方見大效、用法以溫水浸海絨、畧擠而擦之、則身上之水、散而爲氣、熱度必減、如溫水無效、宜用冷水、近數十年、泰西各類重熱症、常以冷水醫之、用之者、已見實效、故謂較用他法尤妙、昔之用冷水以浴熱症者、以爲減病者之熱度、近知其減熱乃小效耳、其大效乃因其能激司絡腦所、則使血運行於遍身、不但無血積臟腑之患、並增其育身之功、且激其皮膚腎經、使之多袪身內之毒、若常如此、則熱度可減、亦不易生臥瘡、或他皮患、按用冷水退熱、必宜速搓、且須搓其遍身、使臟腑熱血多至皮膚之血脂內、其熱大爲減少、所用之水、必使絡腦二一部被激、則血運行

1 Insomnia

當出水、倘仍在盆內、必較前尤冷、此乃因時過長也、若於覺煖時出水、激厲之效、必終日存於身內、夫以上之理、試晰言之、人一入水、身之熱度大減、勻熱司所未增其作熱之力、皮膚之血脂縮小、血則被催至於臟腑、故其人甚覺寒冷、越片時心經受冷所激、其力增長、臟腑所存之血被催運行全身、並勻熱司所亦受激而增其作熱之力、故此時身體覺煖、精神頓增、若爲時過久、其生命司所過於受激、必致激變爲阻、身內各經之功用、大受擾亂矣、虛弱者、用冷水沐浴、入水時其狀與健壯者同、但其心與勻熱司所之力、不足抵水之冷、血仍存於臟腑、其人終無覺煖之時、必有傷風、或臟腑積血之患、與健壯者在冷水中爲時過久之狀無異、若加鹽於其內、使如海水之鹹、其激發精神之功較大、如以海水沐浴、其效尤妙、嬰孩每日宜用溫水沐浴、但爲時不可過久、數分鐘足矣、否則精神必致耗失、或謂人因用力而多生汗者、不宜浴以冷水、此論謬矣、角力者角畢、全身生汗、或用冷水沐浴、或投入冷水內、但其時不可過三十秒鐘、此等沐浴、乃免過身發板之患、腦力衰弱者、以單被蘸於水內、擰乾裹身、並覆其頭、乃爲妙法、但宜自搓其前身、倩人搓其後背、則血速回至皮、而身體覺煖矣、初用時、惟數分鐘、且於冷水內、少加溫水、每日漸減、至不加溫水、亦能忍受爲止、其益乃在絡部被激、而

第五十九圖



此圖表明單被蘸冷水裹身之法。

第五十七圖



此圖表明肺葉炎、胸統膜炎、或心統膜炎等症、用庫秋蟠之法。

第五十八圖



此圖表明顱腦衣炎、或顱腦積血、用庫秋蟠之法、頭痛亦可用之。

顱腦衣炎[1]或顱腦受傷[2]、以冰袋覆其頭上大效、失寐[3]之患、若以冷水袋覆於頭上、以熱水袋覆於足心、則常能安睡、若因過用腦力之故、其效尤顯、顱腦血虧[4]而失寐[5]者、臨睡時入冷水中、拭乾再寢、每效、蓋其身一入冷水、週身之血運行速而有力、則顱腦之血、不至甚虧矣、亦有用熱水沐浴者、其效尤妙、然此類之病、非因顱腦血虧、乃因腦部被惹也、(見熱法篇)如欲以冷水覆頭、宜以庫秋管、製成蟠形而戴之、用二水桶、一貯以冷水、置於凳上、空者置於地下、使此管一端入冷水桶中、一端入空桶中、用時吸水入管、則成虹吸流水之勢、水若流盡、則將二桶交換、水則又流入彼桶、如此循環不已、病者即得其效矣、遺精[6]之患、有醫者以冷水澆會陰、或陽囊並腰處、亦有醫者當病者臨睡時、以冷水一杯浸陽囊數分鐘、亦效、患痢[7]症者、如將冷水或冰水二至四量磅、(1000.0-2000.0)緩緩射於肛內、大效、痔症[8]無論用何法、如兼射冷水於肛內、則有輔效、以冷水沐浴、係增力之法、然用之者、必先視其能有益否、虛弱之人、無論用何沐浴之法、如用之過勤、且為時過長、腦力易致耗竭、但此多因每早用溫水沐浴之故、若健壯之人、用冷水沐浴、始則全身發顫、似不能忍受、水一至腹、則吸冷氣、身生寒栗、越片時自覺署煖、寒栗盡消、皮有紅色、脈大而速、呼吸之氣充滿、如此週身多得血之養育、自覺有力、此時即

1 Meningitis
2 Injuries of the brain
3 Insomnia
4 Cerebral anæmia
5 Insomnia
6 Emissions
7 Dysentery
8 Hemorrhoids

木、可以細鹽撒於冰塊上冰之越片時則有痲效、此法不可輕視、以其能速凍該處之腡也、如欲其尤速可以伊打置於噴霧具內噴之、亦可以伊替氯鹽代之、其效相等、用此類藥、必遠離燈火、緣其氣易燃故也、腦系痛[1]症、如其系與皮膚相近、以冷法冷之、有效、眶上系痛[2]、此法最爲合宜、但必至該處之皮、白而變硬方止、如一次無效、可日日用之、至半月、或二十日、庶可見效、髖大系痛、亦有以此法醫之者、有醫者於輕割症、用凍法使之痲木、然不爲妙、因病者受凍之痛、不減於受割之痛也、若用炙具時、先凍其炙處、乃爲止痛之妙法、肺炎[3]、或肺統膜炎[4]等症、如用冰袋或冰衣或冷水蟠、俱效、但病者虛弱、以上各法俱忌用之、冰袋之製法、乃以碎冰與鋸末相合、鋸末之多寡、以盡俫冰化之水爲宜、裝以布袋、使之平勻、用綫縫之、不令其攢聚一處、裹於胸前、但此法難免沾濡被褥之虞、有著名醫者、另用一法、醫肺炎症[5]、以布蘸於冷水內擰之、裹於胸前、每五分鐘換一次、雖病者不喜此法、越數句鐘、自覺大效、疼痛氣促漸次減少、脈亦平穩、身熱每減一度、病勢不至如從前之甚也、初用時、即病者戚友、亦俱以此法爲不佳、至功效顯著、則樂用之矣、人用此法、鮮有不見效者、心內衣炎[6]、或心外衣炎[7]等症、以庫秋冰袋覆前心、頗效、不但能免心跳、亦有平心袪炎之功、腸熱症[8]、用冷水袋覆前心、亦效、

1 Neuralgia
2 Supraorbital neuralgia
3 Pneumonia
4 Pleurisy
5 Pneumonia
6 Endocarditis
7 Pericarditis
8 Typhoid fever

再後用錄氯强盐一分水千分之消水浸手於其內、至一分鐘方可、如割時必須以手摸未經滅穢之物、宜先以布浸於錄氯消水內、裹於手上、不然、摸後必再用消水洗之、最妙之法、乃著庫秋手套、雖手有毒穢、亦與病者無妨、有醫者先用以上之法盥手、後以熱水加鋏錳上礬所製之濃消水、浸手於其內、再浸手於草酸消水內、以祛其色、再後以烝水洗之、以祛草酸、始行割治、但用此法、仍不免手皮破裂、故不如著庫秋手套之爲妙也。

冷法 (COLD AS A REMEDY,)

此法如用之合宜、必有功效、其用可分二類、一用於一處、二用於全身、用於一處者、其效有二、一如某處之血管有積血之患、以冰塊或冷水冷之、頗效、二如腦系疼痛、以氣易散之藥、置於噴霧具內、噴於痛處、冷時自不覺痛、冷過其痛或自此而止矣、燙傷或筋扭之患、泰西之人常將傷處浸於冷水內、亦有時用熱水浸之、或乾熱氣煖之、其效與冷水同、詳見熱法篇、總之或冷或熱、當在病者自擇其宜、用此冷熱二法、爲使血管縮小、無所滲出、且使所積之血流通、故腦系不受其擠力、跳痛之患則止矣、踝節扭[1]患、如以布蘸冰水裹之、或以冰袋覆之、乃爲妙法、一處之炎患、冷之之法不一、最便者乃以豬或羊之胱、或庫秋袋盛碎冰、覆於患處、如欲某處、暫時麻

1 Sprained ankle

此藥只有益於生膿之傷、若敷於無膿者、不爲妙劑、生膿愈多、藥效愈顯、然必敷至生膿處方可、如藥與膿相合而成痂、痂下仍生膿、藥力難達、則無效矣、且痂阻膿之外流、與病者甚爲有險、割症時宜將無穢之黃氰置於大口瓶內、覆紗布一層、用時隔紗布撒於傷處。

幾阿林（Creolin）此藥頗有滅穢之能、且無惹力、在有力之免穢藥中、毒力爲最小。故醫家多用之敷於皮上、潤性如油、與煠醇迴異、水不能化、然與水調勻、色白而不透光、故用之滅割具之穢、不爲妙法、蓋置割具於其內、視而不見也、割症者、以藥五分、加水百分、用以潔手、則無裂皮與阻捫覺之患、用之以洗傷處、或冲膿瘀、或用於分娩時、皆有大效、常用者即藥二分水千分、至藥五分水百分。

氫氧強洽 Aqua Hydrogenii Dioxidi, U.S. Hydrogenii Peroxidi Liquor, B.P. 此藥之用、乃敷於生膿之瘡、或射於膿脂之內、藥遇膿自沸、至膿盡受氧之改變爲止、如有不易透氣之膿瘀、則不易用、蓋因氣無從散出耳。

盥手之法（Preparation of Hands）醫者與助割症者、用熱水與鹼、由手至肘、以刷刷之、至三分鐘之久、以木枝與刷、剔淨指甲之汚穢、再用鹼水洗之、後用醇酒洗之、至一分鐘、

十分、以免割者手沾消水、而覺系被阻也、此藥之氣易散、如以紗布蘸之、置於過空氣處、越數句鐘、力則散盡、而無免穢之功、只爲無穢之布而已、有醫者常按此理、而獲割口收斂之速效、因免穢藥類、多有惹力、割處難於收口、若以紗布浸此消水、覆於割處、越數句鐘、身之熱度、必使藥力散盡、割處大獲滅穢之功、穢既無從而入、割口亦不受穢藥之惹、故收口最速、倘用之過多、不但有中毒之險、且醫者之手受惹、難免皮裂之患、如手裂皮、割症時手上之毒穢、不易滅盡、恐病者受毒也、且用力量更大之消水、其手必覺麻木、以致捫覺受阻而不靈。

袱毛消水 Liquor Formaldehydi, U. S. 此消水大有滅瘴毒之功、但甚有惹力、令人疼痛、故不常用、如以此消水一分、似盟盐消水二千分、以冲大痰、或洗腐肉皆可、其大用滅病室中傳染之毒耳。

黃氯 Iodoformum, 此藥常爲免穢之用、但無滅穢之能、然其免穢之力、不在能滅穢、乃在生穢處、藥質改變、而成穢脞蝣之敵物、如此則生膿不至太過矣、穢類能生長於此藥之內、若以有毒穢者、用之以敷割處、必致有損、然有法滅之、先以此藥置於錸氯强盐一分水千分之消水內洗之、後以甫烝之水、將藥中錸氯强盐洗出、則穢類滅盡矣、

水二千分矣。

以此消水洗患處、有用藥一分、水五百分、或千分二千分四千分不等、俱因其病而制其宜耳、若患處甚深或甚大、僅用藥一分水萬分、其力已足、常有割腹者、用藥一分水萬分冲之、以至中毒、平常割症之用、乃藥一分水二千分、在割症前一日、洗割處之皮膚、其法先以輭鹹與熱水洗之、薙净該處之毫毛、再洗之、又以醇酒或伊打洗之、後以此藥一分、水千分之消水洗之、再以此藥一分水二千分之消水、以布蘸而覆之、纏以布條、以備割治、割症時所用之消水、若宜用力量甚大者、必隨用力量小者、冲洗割處、以免嗽藥中毒之虞、割後所用之覆類、宜先煮於滾水內、晒乾、再以此藥一分水五百分之消水蘸之、後再以此藥一分水四千分之消水洗之。

炥醇 Pheol, U. S. Acidum Carbolicum, B. P. 此藥脂質不能阻其力、與錄氯强塩均屬有毒之藥、常用者、乃藥一分水二十至四十分之消水、雖水十五分能化藥一分、然不能立時化之、如欲以藥一分水二十分、使之立成消水、必以熱水方可、若不用熱水、必極力搖動、否則此藥必沉於盆底、用時難免受其濆力、故宜防之、且此消水有滅穢之能、常用以浸割具、在未割之前半句鐘、即以所用之割具、浸於其內、割時再加滾水等分、則成藥一分水四

常用者如左。

銾氯强塩 Hydrargyri chloridum corrosivum, U.S. Hydrargyri perchloridum, B.P. 此塩一分、加水五萬分、滅穢之力仍存、倘水內有胉質、則塩必與胉相合、變成銾胉礬、即無滅穢之力矣、如以此塩與烝水製成消水、日久體質必變、滅穢之力亦減、若加鈉氯塩或淡酸類少許、則體質即不能變矣、故此消水宜用現製者、如欲存之、必加鈉氯塩等分方可、有醫者云、宜加鈉氯塩十倍、方免改變體質、割症時必用棉蘸此消水擦之、擦時消水不能不與血盟並他類之胉質相合如割大症、需時甚久、恐滅穢之力減少、故醫者宜謹慎防之、方免此患、防法有二、一多用消水、使胉質不能阻其力、二 用較此藥多五倍之菓酸、亦可免胉質之阻力、良方如左。

銾氯强塩	℞- Hydrargyri chloridi corros, U.S. Hydrargyri perchloridi, B.P.	十五英厘	(1.0)
菓酸	Acidi tartarici	一英錢	(4.0)
烝水	Aquæ destillatæ	二量磅	(1000.0) —M.

此方有銾氯强塩一分、水千分、用時常有再加水一倍者、是此藥一分、

第三十三章　論醫病法

針刺法（ACUPUNCTURE）

此法乃以針刺身、爲止痛消腫祛痰之用、如腰痺[1]與骶大系痛[2]、其效最顯、醫腰痺之法、先以二針煮於滾水內數分鐘、以滅其穢、即將二針立刺入腰肌、約深八至十二分、俟數分鐘、則謹慎起出、以防針折之虞、按此法刺之、每有立效者、若痛在腰之兩旁、此法尤妙、醫骶大系痛、功效雖不如醫腰痺之準、然仍宜用之、其所用之針、滅穢尤須謹慎、宜刺至骶大系、即透入系鞘亦可、曾有名醫謂用此法射哥羅芳莫非等藥、其效尤妙、有時以針刺於骶大系出盆微下之處、其效最顯、又有醫者云、若以針刺無病之腿、與病腿相對之處、最效、惟於新痺症、與患熱症之腰痛、毫無功效、患痰瘇者、如其腿甚瘇、以針刺之、可放其痰、但越片時、針眼即塞、故不如以刀割之、但在未割之前、必先以滅穢之消水洗淨該處、割後用滅穢之絮覆之方可。

防穢法（ANTISEPTICS）

此法所用之藥、與滅瘴毒藥不同、不必有滅穢之能、只能阻穢生長、或敵穢毒力、或免毒被陳、或保護身膶、滅穢藥類、其功效亦與此同、故此三類藥常並論之、排醇、與錸氣强塩等、專有滅穢之力、若黃氣只能敵穢所生之毒、並無滅穢之力、近數十年來、多有醫者用心考查此等藥類、新製甚多、然鮮有上品、故罕用之、所

1 Lumbago
2 Sciatica

至半量兩、(4.0-16.0) 在英揀藥册者、分劑、十五至六十量滴、(1.0-4.0) 服時多加水送下、有著名醫者謂、如人過用目力、以致頭痛[1]、用此藥醫之、每有大效。

阿波冷 (ALBOLENE)

此藥係一類之脂、由羊毛脂而得、其質如水、無色、無味、空氣或酸類、俱不能改其體質、如口鼻涸膜發炎、以此藥與他藥相合、詳見五百三十一二面之方內 置於噴霧具內噴之、有效。

1 Headache

療效　白濁[1]之晚程、如病者顯久病之狀、此藥有效、醫家有於初患白濁、以此藥抵之者、然非妙法、因傷風[2]而鼻洒膜腫痕者、如洒膜顯多生液、以此藥之散作鼻煙齅之有效、若洒膜生液未多、忌用、氣管久炎[3]、或纏延之氣管炎[4]、此藥之脂楠乃為妙品、喑啞[5]者、如以此藥之散製成紙捲、吸之有效。

藥製與分劑

畢澄茄散 (Pulvis Cubebæ) 十至六十厘 (0.6-4.0)

畢澄茄流膏 Fluidextractum Cubebæ, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

畢澄茄酒 Tinctura Cubebæ, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

畢澄茄脂楠 Oleoresina Cubebæ, U. S. 二至二十量滴 (0.12-1.3) 置於藥殼內、或製成勻藥、日服三次。

畢澄茄餅 Trochisci Cubebæ, U. S. 此餅乃為醫嗓炎久症之用。

畢澄茄油 Oleum Cubebæ, 五至二十量滴 (0.3-1.3)

氫溴酸 (ACIDUM HYDROBROMICUM) 此酸大有惹力、但服之較他類溴藥少顯腸腺發炎、而其體功效無異、醫家所常用者、乃淡氫溴酸、Acidum Hydrobromicum Dilutum, 分劑一量錢、

1 Gonorrhœa
2 Cold in the head
3 Chronic bronchitis
4 Subacute bronchitis
5 Hoarseness

此膏似水、服用最妙。

哈瑪米利消水　Liquor Hamamelidis, B. P.

哈瑪米利酒　Tinctura Hamamelidis, B. P.

哈瑪米利抹膏　Unguentum Hamamelidis, B. P.

鈉㷔強礬　(SODII ETHYLAS)　此藥色白、其質細粉、置於水內、則分成醇酒與鈉氿、純酒能化之、但不改其體質、入藥者乃為除毛痣[1]並袪色痣之用、用法、以剪剪去其毛、化此藥於純酒內、用玻璃箸蘸敷越片時該處必致成痂、至半月將痂揭去、則毛根即盡絕矣、如毛根未絕、嗣皮復原後、可再如法敷之、如於未敷之前、以寇卡印五分、加水百分、製成消水、射於患處、則能止痛、如以此藥敷於痣上、脫去之後、或遺小瘢、英揀藥冊中有鈉㷔強礬消水。　Liquor Sodii Ethylatis, B. P.

畢澄茄　CUBEBA, U. S.　CUBEBÆ FRUCTUS, B. P.　此藥乃一類樹所結之果、未熟者方入藥用、產於加拉巴島、色黑、形如小豆、乾則抽縮不圓、嘗之味香、內含一油一酸並一精、油名畢澄茄油、酸名畢澄茄酸、精名畢澄茄精、惟油之氣易散、按此藥之力易失、藥行中如欲收存、不可製成藥散、必臨用現製方可、入服過分劑、則育道尿徑有發炎之患。

[1] Hairy growths

鐘、約有三十秒作痛、射後越半句鐘、其痛不似以先頻作、無痛時亦能安睡、倘一次不能大減、勿再與莫非同射、宜專以此藥、如數射之、用此法者云不但分娩時、弗覺疼痛、且無意外之虞、然不可確信、大約此法較用他迷蒙藥、尤爲阽險。

哈瑪米利

HAMAMELIDIS CORTEX, HAMAMELIDIS FOLIA, 此藥係一類之草、產於美國、因所含無緊要之精、故無體功效、然其醫症之能力、亦不爲小。

療效 如因泗膜常炎、或因受風、以致嗓鬆[1]而痛者、以此藥之烝流膏二十至六十量滴、(1.3-4.0) 加水一量兩、(30.0) 合勻、置於噴霧具內噴之、婦人分娩之後、如瀶微流血[2]不止、服此藥每效、吐血[3]或咳血者[4]、服之有效、溺血症[5]、他藥皆不能止者、此藥每能止之、腿患新瘍[6]者、如以布蘸此藥之流膏、敷瘍四圍發紅之皮、則必速於復原、但用藥時、宜將腿墊起、不令血停於患處、方能見效、胱流血症[7]、以此藥之烝流膏射於胱內、有效、痔症[8]無論流血與否、敷服俱效。

藥製與分劑

哈瑪米利流膏 Fluidextractum Hamamelidis Foliorum, U.S. Extractum Hamamelidis Liquidum, B.P. 五至二十量滴 (0.3-1.3)

哈瑪米利烝流膏 Aqua Hamamelidis, U.S. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

1 Relaxed sore throat
2 Uterine oozing
3 Hæmatemesis
4 Hæmoptysis
5 Hæmaturia
6 Leg ulcers
7 Bleeding from the bladder
8 Hemorrhoids

人聽敏、宜備半量兩、(15.0) 示以用法、聽其自用、若庸愚者、宜僅備一日所用、多加以水、不但免藥力散失、且免受毒力、按此藥有染衣之能、故醫者宜示人愼用、尤宜示人者、去瓶塞時、宜距面略遠、恐瓶內之氣噴出、以致面目受損。

毒力　人服毒分劑、則顯腸胃甚炎、嘔瀉帶血、腦力脫失等患、其殞命也、或因藥力穿透育道、或因育道發炎、或因腸內收窄、或因胃經液腺、大受損傷等故。

解毒法　宜服鎂硫强礬、灰消水、鹼消水等淡鹼類、與油類以解之、亦宜服鴉片、以平育道、如用煖身之法、或可免腦力脫失之患、

司寇坡拉印 (SCOPOLAMINA)

此乃司寇坡拉之鹼、本藥之體功效、與顛茄鬧羊花甚同、此鹼之體功效、與亥歐辛印相似、所常用者、乃司寇坡拉氯鹽、Scopolaminæ Hydrobromidum, U. S.　曾有外科醫者、以此藥一厘之百分之一、(0.0006) 與莫非一厘之十二分之一、(0.005) 相合、於割症之先、一至三句鐘、勻開射二至四次、以代伊打或哥羅芳之用、然不甚穩妥、故醫家少有用之者、亦有人射一或二次、使病者過迷蒙之初程、再用伊打或哥羅芳熏之、如此則易奏迷蒙之效、嘗有人以此藥一厘之百五十分之一、(0.00043) 與莫非一厘之六分之一、(0.01) 相合、射於產婦身內、以減分娩之痛、如四五分

療效　如因食滯而致頭痛嘔吐者、或腸胃失功以致食滯者、或小便含鏎草礬而兼顯癔患者、均以此藥爲上品、因其於育道液腺、不但有補之之功、且有激之之力也、殆瀉者、服之亦效、按此藥大有激膽之能、如以足分劑、連服數日、或能令人大瀉膽液、故肝變硬之初程、以及肝失功用之新或久症、服之有效、熱道之肝炎久症、乃爲最妙之品、但此症宜以足分劑、連日服之、至顯瀉膽、或育道發炎、方可停止、健壯者肝炎新症、宜服平藥類、此藥有激力、故不宜服、服此藥時、另有助其奏效之法、其法以此藥加於水內、或沐浴全身、或專浴其足、俱可、印度著名之醫者、備沐浴水法、先以氰強酸二分、氫氯酸三分相合、越二十分鐘、加蒸水五分、搖動之使成消水、加於水內用之、如欲沐浴全身、先以水五桶、傾於浴盆內、(宜用木盆)　加此藥之消水四量磅、(2000.0)　再加滾水、使浴盆之水熱至九十八度、始行沐浴、浴至二十分鐘、即宜停止、以布拭乾、卧於牀上、以被覆之、如專浴其足、以九十八度之熱水十四量磅　(7000.0)　加此藥之消水六量兩、(180.0)　浸足於其內、並以海絨浸浴其股、至三十分鐘、宜止而拭乾、因嗜酒而肝失功用者、用此浴法有效、如沐浴時皮膚受惹、宜少加此酸、以免惹患。

服法　成人每餐後可服三至五量滴、(0.2-0.3)　宜多用水送下、且宜用玻璃管服之、如其

1 Biliousness
2 Indigestion
3 Oxaluria
4 Lienteric diarrhœa
5 Hepatic cirrhosis
6 Hepatic torpor
7 Chronic hepatitis of hot climates

爲妙法、孩童暑熱綠瀉症[1]因此藥有斂力、並激腸腺之功、服之每效、孩童之飧瀉症[2]、無論所便者、或爲水、或似漿、俱有惡臭、以此藥與倍辛兼服、有效。

藥製與分劑

淡氰强酸 Acidum Nitricum Dilutum, 三至十五量滴、(0.2-1.0) 必多用水送下、且宜用玻璃管服之、以免牙齒受損。

騰氣氰强酸 Acidum Nitricum Fumans, B. P. 此乃大有力者。

毒力 服毒分劑、腎大受惹、育道發炎、以致便溺帶血、口腫與腹、大作疼痛、遂至殞命、即其人未立殞命、亦難保生存、恐致腸內收窄、或胃經液腺受傷也、以此酸滴於體膚、或衣服上、必致染成黃色。

解毒法 宜服淡鹼類以解之。

皇强酸 ACIDUM NITRO-HYDROCHLORICUM, U. S.

此藥乃氰强酸二分、鹽氣酸八分、相合而成、係紅色流質、製時必俟所發之氣騰過、方宜貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之、置於暗處、宜臨用現製、不可存貯多日、以致藥力散失、揀藥冊內有淡皇强酸、色淡黃、其性質與本酸不同、故不常用。

1 Green diarrhœa
2 Lienteric diarrhœa

氰強酸

ACIDUM NITRICUM

此酸在入藥之金酸類中、乃為最有力者、其質如水、存貯日久、色變淡黃、故宜貯於黑玻璃瓶內、以玻璃塞塞而存之。

體功效　如以此酸之濃者、敷於膶上、大有潰力、若多加以水、敷於涸膜、則顯惹斂二力、服微分劑、腸胃生液之腺、則被其激。

療效　此藥有敷服二用、其外敷之用、癰初瘡[1]或癀瘡[2]、敷之有效、但必先於患處之四圍、敷以油或抹膏、方免無恙之膶、受其潰力、瘊[3]或疥[4]或殰瘍[5]等患、敷之亦效、但未用之先、宜備鹼水、至潰力已足、則敷而解之、以免受潰過甚、有著名醫者、醫痔症[6]、以此酸之濃者、點一或二處、該處不覺甚痛、即結成瘢、其瘢漸漸縮小、則痔亦必隨之而小、但不可滿敷患處、以致受損、此醫亦云、流血痔症[7]、如以此藥半至一量錢、(2.0-4.0) 加水一量磅、(480.0) 敷於患處、則血流即止、不但此也、患處且獲收斂之功、腹內之墜痛、亦遂不覺、其內服之用、有補斂二功、小便含錯草礬者[8]、如皇強酸不便、可用此酸代之、究不及皇強酸之妙、如口內生小瘍[9]、可以此藥三量滴、(0.2) 約加水一二量兩、(30.0-60.0) 用玻璃管服之、有效、胃不消化者[10]、如於餐後每覺食物由胃反口、食畢以此藥數滴、加水服之、每效、腸不消化者[11]、如於餐後數句鐘、覺腹內不安、且有疼痛、以此藥與苦補藥兼服、乃

1 Chancres
2 Chancroids
3 Warts
4 Gangrene
5 Phagedenic ulcers
6 Hemorrhoids
7 Bleeding hemorrhoids
8 Oxaluria
9 Stomatitis
10 Gastric indigestion
11 Intestinal dyspepsia

敵鼠疫盟 (ANTIPEST SERUM) 此盟乃近之醫者、爲敵鼠疫[1]而備、製法與敵痔盟迥異、先備肉湯若許、將患鼠疫者之血取出少許、置於湯內、以微火熱至一定之度數、如此兩月、血內之穉、則必滋生、再熱之、至穉盡死爲度、以空針射於皮內、必有敵此疫之能、但必及早用之、如人已患此症、不特無益、反致有損、但射後五至七日、如遇鼠疫之染毒、較常人尤易患之、及至十日、少有患之者、有醫者謂射此盟後、患之者只有四分之一、且較未射者減輕十倍、亦有醫者謂射此盟十日之後、未見有患此疫者。

雜藥類

鉀砂強礬 (POTASSII SILICAS)

鈉砂強礬 (SODII SILICAS) 此二藥係無色之流質、又名流玻璃 可代石膏之用、骨折[2]筋扭[3]等傷、以此藥刷於布條上裹之、越片時藥則變硬、有輔助傷處之功。

糖 SACCHARUM, U. S. SACCHARUM PURIFICATUM, B. P. 此糖係蔗糖煉成、白者乃入藥用、蘆粟或蘿蔔、亦含此糖、有免腐之能、而無免釀之力、如加於鐵藥類中、可免鐵變成鏽類、按此糖係輕養炭之類、有育身之功、多服者易生脂膶、故肥胖過度者不宜服、若腸胃食釀、或患糖尿症者、亦不宜服。

1 Plague
2 Fractures
3 Sprains

醇酒 Alcoholis	半量兩	(16.0)
薄荷油 Olei menthæ piperitæ	十二量滴	(0.8)
辣椒油𣏌 Oleoresinæ capsici	一量滴	(0.05) —M.

成人每二或三句鐘、服五至十五量滴、(0.3-1.0) 如多服之、恐有意外之虞。

S.—5 to 15 minims for an adult, in water, every two hours for three doses. More than this quantity is dangerous.

補藥類

堪杜然勾 (CONDURANGO)

此藥乃一類樹皮、產於叩倫比亞、西歷一千八百七十三年、始入藥用、爲醫胃疽[1]之品、然實無醫胃疽之能、其所以用之者、因此類症、多兼泗膜發炎、此藥有解炎之功、減少其痛苦、故人多用之於此症耳、常服者乃此藥之流膏、分劑、一至二量錢、(4.0-8.0) 亦有服此藥之葡酒者、分劑、半至一量兩、(15.0-30.0) 又有以藥一分加水八分煎之者、分劑、半量兩、(15.0) 日服三次、因患此症者、胃經所生之酸液較少、故有時加氫氯酸少許。

敵症盟類

[1] Gastric cancer

汗之患、每數句鐘服五厘、(0.3) 其體功效人尚未知、但以其能感汗腺之系、故用之以醫此症、英德二國之醫者、用此藥大見功效、余嘗用此藥以醫癆症之盜汗、但未見效、有時服此藥者、有惡心瀉腹之患、分劑一至五厘、(0.06-0.3) 置於藥殼內、每五句鐘服一次。

哥羅顛 (CHLORODYNE) 此乃最著名之方、盟瀉[1]或疴症[2]服之有效、人配此方時、所用之藥味、各有不同、最常用之方如左。

莫非氯塩	R-Morphinæ hydrochloridi	八英厘	(0.5)
烝水	Aquæ destillatæ	半量錢	(2.0)

見火莫非氯塩即化、撤下俟凉、加

Heat together, and as soon as the morphine is dissolved and the liquid cooled, add

淡氫氯酸	Acidi hydrochlorici diluti	半量錢	(2.0)
哥羅芳	Chloroformi	一量錢半	(6.0)
印度麻酒	Tincturæ cannabis indicæ	一量錢	(4.0)
淡藍酸	Acidi hydrocyanici diluti	十二量滴	(0.8)

1 Serous diarrhœa
2 Colic

成氰强酸、故今多用氰强酸製之、然醫盟瀉[1]或似癨[2]之瀉症、究不如氰弱酸爲妙、其良方如左。

氰弱酸	℞-Acidi nitrosi	一量錢	(4.0)
樟腦消水	Aquæ camphoræ	八量兩	(240.0)
後加	et adde		
鴉片酒	Tincturæ opii	四十量滴	(2.6) —M.

每三至四句鐘服一量兩。(60.0) S.—Two ounces in water every three or four hours.

猶達森 (EUDOXINE) 此藥以挪色分與鉍、用化法而得、其色淺棕、其質細粉、嘗臭無味、每百分內含鉍幾六十分、入藥用者、因其有滅腸內之穢、與免腸內食物釀壞之能、孩童之瀉[3]症、服此藥半至五釐、(0.03-0.3) 成人五至二十釐、(0.3-1.3) 有效、其醫此症之能、與鉍礬類相等、但斂力較小、而改症之能與滅穢之力較大、因其滅穢之力較大、故患腸洄膜新炎或久炎而兼瀉症者、服之有效。

阿嗄唎辛 (AGARICIN) 此藥出於美國南方、以朽木製成酒膏、多有醫者、以此藥醫盜

1 Serous diarrhœa
2 Choleraic diarrhœa
3 Diarrhœa of children
4 Night-sweats

療效　[1]白濁症以此藥一分之四分之一至一分、加水百分、製成消水、射於尿脂內、有效、如係久症、必用藥五分、方能見效、按此藥有滅白濁黴穢之能、其力能深入泗膜之內、如力不過大病者不覺甚痛、用後所流之白濁頓減、[2]睥炎諸症、目科家常以此藥五分、加水百分、製成消水醫之、如[3]白濁睥炎與[4]嬰睥膿炎等症、以此消水洗之有效、惟睥癧炎不能醫之、以其力不足也、[5]陰道白濁炎、此藥有效、[6]膿瘡或[7]燙傷以此藥五至十分加硬煤油蠟或羊毛脂百分、製成抹膏敷之有效。

鉦𤋮硫礬 ZINCI PHENOLSULPHONAS, U. S. ZINCI SULPHOCARBOLAS, B. P.

鈉𤋮硫礬 SODII PHENOLSULPHONAS, U. S. SODII SULPHOCARBOLAS, B. P.

此二礬結晶無色、畧有激力、且有滅穢之能、故有製之成散、以為敷[8]瘡口之用者、亦有製成消水為洗瘡之用者、惟醫[9]暑瀉症乃常用之藥耳、無論成人孩童、大便惡臭或患[10]腸熱者、服之可減腸內之穢、然非有醫此症之功、但能止瀉並免惡臭耳、以上之用、惟鉦𤋮硫礬最為合宜、分劑二至三厘、(0.12-0.2)成丸服之、日服三或四次、如人因[11]中內身之毒、[12]大便乾燥而[13]腸脹者、與洋鼠李兼服、有時獲效、按此二藥祛身時、大約仍為本藥、其體質不甚改變也。

賀氏樟腦調藥 (HOPE'S CAMPHOR MIXTURE)

此藥原以氰弱酸製成、因此酸見水即變

1 Gonorrhœa
2 Conjunctivitis
3 Gonorrhœa ophthalmia
4 Ophthalmia neonatorum
5 Gonorrhœal vaginitis
6 Suppurating ulcers
7 Burns
8 Sores
9 Diarrhœa
10 Typhoid fever
11 Auto-intoxication
12 Constipation
13 Flatulence

鉀藍洽 ℞-Potassii cyanidi 二英厘 (0.12)
莫非硫強礬 Morphinæ sulphatis 一英厘 (0.06)
洋郁李糖漿 Syrupi pruni virginianæ q. s. ad 三量兩 (90.0) —M.
日服三至五次、每服一小勺。(4.0) S.—Teaspoonful three to five times a day.

又方

鉀藍洽 ℞-Potassii cyanidi 二英厘 (0.12)
錏氯塩 Ammonii chloridi 二英錢 (8.0)
辛寇那甘香酒 Elixiris calisayæ q. s. ad 三量兩 (90.0) —M.
日服三至四次、每服一小勺。S.—Teaspoonful three or four times a day.

斂藥類

銀核礬 (NARGOL) 此藥乃以銀與核素酸、用化法合成、無臭、與黃氣迴異、每百分內含銀十分、水易化之、其潰力較他類銀礬為大、置於脂類中、則不沉澱、如製成消水、置於火上沸之、則不改其體質。

大花仙人掌 (CACTUS GRANDIFLORUS)

此藥產於莫西革西印度等處、有激心之能、他類仙人掌、雖亦有此能、而其力較小。

體功效　服此藥者、血壓加增、惟心之跳動、不見遲緩、或有時畧速、近有醫者查明、知其非大有感絡部之能也。

療效　心跳[1]與心虛[2]等患、服此藥或略有效。

藥製與分劑

大花仙人掌酒 (Tinctura Cacti Grandiflori) 二至八量滴、(0.12-0.5) 此乃所常用者。

大花仙人掌流膏 (Fluidextracti Cacti Grandiflori) 二至四量滴、(0.12-0.25)

阻心藥類

鋏藍洽 (POTASSII CYANIDUM, U. S.)

此藥最毒、色白、形成細粉、或凝成不透光之塊、臭之有藍酸之味、嘗之覺辣、且有鹼味、水二分能化藥一分、其用與藍酸同、分劑、一厘之十分之一、(0.006) 患氣管炎[3]或肺癆[4]等症而咳嗽不止者、頁方如左。

1 Cardiac palpitation
2 Cardiac weakness
3 Bronchitis
4 Phthisis

體功效　與加非印寇卡印同。

療效　此藥有激身心與腎之能、故身體與心經虛弱者[1]、服之有效、有醫者謂暈船[2]之患、服之有效、又有醫者謂有解酲之功、但無確據、頭痛而兼惡心[3]者、服之每效、宮欠縮力[4]、服此藥之流膏、三十至百二十量滴、(2.0-8.0) 有激之之能、藥行中每以此藥配製數種、謂大有增身之力、然不足為憑、即能增力、亦只暫而不常也。

藥製與分劑

寇拉流膏 (Fluidextractum Kolæ)　十至三十量滴 (0.6-2.0)

寇拉甘香雜酒 (Elixir Kolæ Composita) 二量錢 (8.0) 內有寇拉寇卡草阿拉拏等藥、虛弱之人、如與砒兼服大效、良方如左。

鉀砒弱礬消水 ℞	Liquoris potassii arsenitis, U. S. / Liquoris arsenicalis, B. P.	十五量滴	(1.0)
寇拉甘香雜酒	Elixiris kolæ compositæ	四量兩	(120.0) —M.

每餐後服二量錢。(8.0)

S.—Dessertspoonful after meals.

1 Feeble heart
2 Sea-sickness
3 Sick headache
4 Uterine inertia

阻動系藥類

布羅吞 (BROMETONE) 此藥乃以布羅方與酸醛、加鹼潰藥製成、色白、結晶、成細長三稜之形、嘗之鼻之味似樟腦、必熱至三百三十二度、方能融化、醇酒伊打本辛俱能化之、冷水略能化之、熱水較冷水所化稍多、每百分內含溴七十七分、其體功效與溴鹽類甚似、故可代溴鹽之用、所擅長之處、用二至十厘 (0.12-0.6) 之小分劑、即可與溴鹽類之大分劑、功效相等、如服足分劑、或有發暈、不思飲食、心靈遲鈍等患、但一顯即過、而無遺患、服法置於藥殼內最妙。

莎拉耨 (SOLANUM CAROLINENSE) 此藥係一類草、產於美國南方、有醫者查其體功效、謂有阻顱腦之能、而有激脊腦之力、入藥者乃為醫癎[1]症之用、孩童之癎症、服之最妙、余醫用之於此症、其犯症每較前為稀、且其陣抽之勢亦較輕、但宜用此藥之流膏、初用之分劑、十五至六十量滴、(1.0-4.0) 日服三次、後宜加至二量錢。(8.0

激心藥類

寇拉 (KOLA) 此藥係非洲一類樹子、內含加非印、與揸古律印、及一類植酸、最要者乃在所含之加非印、亦有止瀉之功、其功或在所含之植酸也。

1 Epilepsy

卡印不同也、如用爲痲目之藥、可以藥一至四分、加似盟塩消水百分、乃爲合宜、其一分藥之消水、乃爲射睟之用、其四分藥之消水、乃爲滴目之用、如以藥一分之十分之七、加水百分、亦可爲浸潤痲法之用、若以藥一厘、(0.06)加塩消水十五量滴、(1.0)射於脊腦衣內、必使人下體痲木、但未射之先、宜置於火上沸之、以滅其穢、(詳見寇卡印篇)如此射法、或謂其少有乖效、但有醫者用之、嘗屢有生汗不止、頭痛、嘔吐、或亦有失便遺溺者、究之射痲藥於脊腦中、不如用伊打哥羅芳之穩妥也。

阿利品 (ALYPIN) 此藥乃由化法而得、色白、結晶、水、與醇酒、俱易化之、以試紙試之、不改其色、如以其消水置於火上沸之、必過五分鐘、方改其體質、其痲效與寇卡印相等、其惹目之力、小於猶肯、無縮緊血脂之能、如用之於目內、宜以藥二分加水百分、若用之於他處、宜以藥十分加水九十分、且宜用新製者、有醫者謂用此消水於目內、無散瞳之力、且不失便視之功、因其無縮緊血脂之能、故適於用、然亦有時不適於用、如割鼻內泗膜積血之症、必使血脂縮小、方無流血過多之患、故此藥不如寇卡印之妙、但用寇卡印、藥力一過、其積血之患、亦與此藥相等、此消水可作浸潤痲法之用、與臂上棚精兼用亦可。

漸失、故宜用新製者、其大用、乃於割目時、可代寇卡印之用、如以藥一分、加水百分、製成消水、滴於目內、越十五秒至一分鐘、痲效即顯、其效能存五至十五分鐘之久、且瞳不散大、眸膚不乾、目球之輭硬如常、脉脂亦不至先則縮小、後則積血、其功實與寇卡印不同、然醫者多用寇卡印爲痲目之藥、若眸炎、睛簾炎等、究不及此藥尤妙也。

猶他民印 (EUPHTHALMIN) 此藥爲化合之鹻、乃係流質體、功效與阿刀便甚似、但初滴於目內、因藥力激動面系皷膜之支、或致涎腺生液畧多、如以此藥二至十分、加水百分、製成消水、滴於目內五至二十分鐘、瞳則散大、至一句鐘、散大至極、越五至八句鐘則復原、有醫者謂令瞳散大之故、乃因動目系未被攤也、惟目之和系不被攤。

挪代肯 (NOVOCAINE) 此藥乃化合而成、結晶無色、水最易化之、所以入藥者、乃爲代寇卡印之用、其力與寇卡印同、而毒力較小、以此藥一分之四分之一、至二分、加水百分、製成消水、其效較他化合之痲藥爲小、用時如加腎上棚精、其效甚妙。

似寇印 (STOVOCAINE) 此藥乃以化法化合而成、放光形如鱗片、水、醋、木酒、煙霧、俱易化之、如以此消水、置於火上沸之、體質不變、與寇卡印不同、其毒力小於寇卡印一倍、如以消水敷於某處、則某處之血脂、即見鬆大、故用之敷於傷口、必致流血更多、亦與寇

酒相似、有安睡之功、分劑二十至四十量滴、(1.3-2.6) 置於甘草水、或糖漿類內服之、最宜、或謂服後必睡至七八句鐘之久、余曾用之、每見功效、但至翌日、常顯睏倦之狀。

沛斯阿 (PISCIDIA ERYTHRINA)

此藥乃由一類之樹取出、產於西印度海島、有止痛之能、並有醉效、其效雖不及鴉片之大、而無鴉片之乖效、但其體功效、尚未查考盡致、醫家可再查之、有二醫者謂、此藥於動覺腦系、少有感力、其大能、乃激絡部、以增血壓、因月經不調[1]而致痞頸痞項抽搐、以及經痛者、此藥最妙、因此藥不感腦部、並能止痛、故因痛而失寐[2]者、服之有安睡之效。

藥製與分劑

沛斯阿流膏 (Fluidextractum Piscidiæ) 半至二量錢 (2.0-8.0)

沛斯阿膏 (Extractum Piscidiæ) 二至十厘 (0.12-0.6)

激腦藥類

何嫛肯 (HOLOCAINE)

此藥乃用化法化合而成、其合質與芬阿錫吞相似、冷水幾不能化、故常用者、乃此藥之氯鹽、此鹽色白、結晶成塊、水能化之、嘗之味苦、遇鹼類立敗其體質、有痳效、與滅穢之能、故外科用此消水時、不必更用滅穢之法也、但此力日久

1 Dysmenorrhœa
2 Insomnia

一次服訖。 S.—The entire amount to be taken in one dose.

度鮑司印 (DUBOISINE) 此藥係一類樹葉之鹻、產於奧司大利亞、其大用、能令癲[1]者安睡、但必與亥歐辛更迭服之方可、如以一厘八十分之一、至六十分之一、(0.0008-0.001)用空針射之亦可、經用此藥者、謂其能使小便減少、且胃經畧失其功用、喉內潤膜甚乾、口內帶有鹼味、有服藥之癖忌者服之、致有涎盛汗旺之患、雖有如此弊效、亦不得不用、因無他藥勝於此者也、養癲院之醫者、謂用此藥時、癲者雖不覺惡心、常將所食者吷出、但多寡不等、癇[2]症、此藥亦效、顫癱[3]症、有醫者謂用此鹻之硫强礬有效、接此礬有散瞳之能、其力與阿刀便同。

多莫拉 (DORMIOL) 此藥乃以哥拉與㳫泚製成、係無色之流質、有安睡之能、與哥拉相似、其力或遜於哥拉、嘗之畧似樟腦、微覺辣味、水能化之、尋常所售者、乃水與藥等分之消水、用者必加水四倍、方爲合宜、以前後所加之水合計之、是藥一分、水九分也、分劑半至一量錢、(2.0-4.0) 加糖漿服之。

思寐那 (SOMNAL) 此藥乃用化法製成、爲無色之流質、嘗之味辣而熱、與燼氰弱浮

1 Insanity
2 Epilepsy
3 Paralysis agitans

第三十二章　後續雜藥類

續者、續其後譯而未及印者也、蓋此書已翻印數章、英文原本重出、歷閱至終、見其中增補若許、是以一一譯出、但不能從始按類加入、特將前數章所未及印者、姑續於此、嗣複印時、再行按類列入。

迷蒙藥類

𤆵氣塩 (METHYL CHLORIDE) 此藥係一類之氣、如用壓力、則易變成流質、惟此流質可入藥用、臭之味似哥羅芳與伊打、貯於玻璃管內、其管之一端有螺帽、用時揭去其螺帽、以手握之、則藥必藉手之熱度、噴於皮上、復變成氣、但藥管必距病處十寸之遠、方爲合宜、夫藥既能藉手之熱度、噴於皮上、而變成氣、必能攝取皮之熱度、使皮變冷、而顯痲效、故割小症時、以此藥噴患處、越數秒鐘、則皮無血色、後則發白硬如厚紙、乘此時割之、病者自不覺痛、但未用之先、宜以鹼與伊打洗其病處、至洗盡本來之油、而後噴之、且不可過二至四分鐘之久、恐過受凍傷、以致膶變成疪、按此藥擅長之處、較伊打不易燃著、且速於收效。

𤆵替連氣塩 (METHYLENE CHLORIDE) 此藥之製法有數類、一以哥羅芳用化法而得、二

傷口、則膶內之液、必漸改藥之體質、復分為氣、與秋毛柳酸三藥、以之敷傷、可代黃氣之用、其擅長之處、乃無惡臭與毒力、且大有滅穢之能、如以之製成抹膏、或與油類相合、或撒於布帶上、或與雲母石、鋅養、鉍礬等細粉相合、敷於傷口俱可、按此藥入胃不改其體質、故可用為腸內滅穢之藥、服法乃置於水或牛乳、或加非、或搓古律內、服之最妙、分劑五至十厘、(0.3-0.6) 曾有醫者、以大分劑灌於獸類、竟不顯受毒之狀。

挨拉木 (XEROFORM) 此藥乃以鉍、氯、俳醇、製成之礬、體質最輕、形成細粉、所以入藥者、乃為代黃氣之用、但其中無氯、故無黃氣之妙能、然亦無黃氣之臭味、畧有滅穢之功、因其為體輕之散、能使傷口變乾、則穢更無從生長也。

伊賽 (IZAL) 此係似松瀝之氤氳類、製成勻類之藥、色暗白、無毒力、有滅染毒之能、用法、以此藥一分、加水二百分、製成消水、可代錄氯強鹽之用、今在北京協和醫院、以此藥一分水千分之消水、浸其呼吸具之紗布、以抵鼠疫之染毒、且以此消水、用大噴霧具噴患鼠疫者之室、以滅其染毒、他類染毒、用之亦可。

消水中之穉、不但此也臨射之時更用各類防穉之法防之隔一或二日射一次、每次半至三量錢 (2.0-12.0) 如係大瘤、宜射於其中、小則射於四圍、但不宜過度、恐腡有潰爛之虞、按此藥實無療治惡癥之能、即阻其生長亦罕有之、惟能止痛、以免病者之苦楚耳、如瘤潰爛、宜用有力滅穉藥敷之、無論其瘤潰爛與否、射後必以紗布蘸此藥之消水覆之方可、但此消水、大有藥力、人不喜用、他類安尼林染料、能力與此藥相等、故醫者謂烌黃色、其效亦同。

三幾蘇 (TRIKRESOL) 此藥乃三類幾蘇合成、此三類幾蘇之性、與幾阿林、烌醇相似、故此藥亦與之相似、色白、乃係流質、鼻之味似幾阿蘇、水百分、能化藥二分半、至成透光之消水、其消水之惹力與毒力、較烌醇或錸氯强盐消水爲小、且不似烌醇之消水阻人之覺系也。

療效　外科醫士常以此藥一分、加水百分、製成消水、以作滅穉之用、如眼科用之滅穉、加水五百至一千分、乃爲合宜。

袱毛顚 (FORMIDINE) 此藥乃以氯、袱毛、柳酸、用化法而得、其質細粉、其色紅黃、嘗之幾於無味、鼻之署有氣味、水、醇酒、淡酸類、俱不能化、鹼類消水、漸漸能化、如以此藥敷於

胱炎[1]症、如小便含鹼、服之有變酸之效、黶瘢[2]之患、敷此消水、有祛之之能、鮮有皮膚受惹者。

硼絨布（Borated Lint）此布之製法、以硼強酸濃消水、置於火上沸之、蘸絨布於其內、晒之而成、或用鈉硼烘礬消水、如法蘸之亦可、割症後覆於傷處、乃係最妙之法。

硼強酸甘油 GLYCERINUM ACIDI BORICI, B. P.

此藥乃以硼強酸、與甘油用火煉成硬片、用時必加甘油、使成流質、名甘油硼甘油、Glyceritum Boroglycerini, U. S. 為免腐之藥、如與非醇調和、敷皮症、或各類眸膿炎[3]症、均可。

炑藍色（METHYL BLUE）

此係安尼林中一類染藍之料、常與砒靡合、倘其中含砒、敷之則有惹力、純者方入藥用、此藥有滅穢之能、然有醫者查明阻穢生長之力無多、故外科用之、不為甚妙、惟目科有必須滅穢之症、此藥可用、然目科用此滅穢之處、較他滅穢藥為妙者無幾、惟於淚具患病時、必須滅穢者、此藥乃為上品耳、瞼炎[4]與瞼癩[5]、眸疱炎[6]、或眸純炎[7]瞭瘍[8]等症、以此藥一分、加水千分、製成消水、滴於目內、或效、惡瘀[9]之患、有醫者常以此藥射之、用法以此藥一分、加水五百分、製成消水、後以熱石絨過濾、以滅

1 Cystitis
2 Freckles
3 Purulent conjunctivitis
4 Blepharitis
5 Eczema of the eyelids
6 Phlyctenular conjunctivitis
7 Conjunctivitis
8 Corneal ulcer
9 Malignant neoplasms

敷之亦效、常以此酸製成洗眼藥、單用之、或與寇卡印同用俱可、如欲存貯寇卡印消水、其中必加此酸、方免生霉變壞之虞、其良方如左。

寇卡印氯鹽	℞-Cocainæ hydrochloridi	四至八英厘	(0.25-0.50)
硼强酸	Acidi borici	十至二十英厘	(0.6-1.3)
烝水	Aquæ destillatæ	二量兩	(60.0) —M.

以數滴滴於眼內。 S.—To be used by dropping into the eye.

硼强酸抹膏 Unguentum Acidi Borici, 有免皮裂[1]之能、且有良方如左。

硼强酸	℞-Acidi borici	一英錢	(4.0)
白蠟	Ceræ albæ	一英錢	(4.0)
硬煤油蠟	Petrolati, U. S. Paraffini duri, B. P.	二英錢	(8.0)
洋苦杏油	Olei amygdalæ expressi,	二量錢	(8.0) —M.

調勻、每早晚敷之。 S.—To be thoroughly mixed and applied night and morning.

1 Chapping.

如病愈而無瘈瘲之患、則每日所服之分劑、不宜過十五至三十厘、(1.0-2.0) 恐病者服成慣性、反使藥力不顯、且易有惡心、瀉腹、消瘦、生㾊等乖效、其㾊或似紅熱症、或似癩症、或起皰、但癩與皰、率在骨節處、痄症[1]口白瘍[2]口瘍炎[3]口頰疳[4]等、如以此藥製成消水、漱之有效、肛門癢[5]、陰門癢[6]、臭汗[7]等患、亦頗有效、身錢癬[8]、或髮錢癬[9]等患、以此濃消水敷之有效、漱藥之良方如左。

鈉硼烘礬	℞ Sodii boratis, U.S. Boracis, B.P.	一英錢	(4.0)
鈉氫碳強礬	Sodii bicarbonatis	一英錢	(4.0)
炥醇	Phenolis, U.S. Acidi carbolici, B.P.	三十英厘	(2.0)
甘油	Glycerini	一量兩	(30.0)
純水	Aquae purae	二量磅	(960.0) —M.

鈉硼烘礬蜜藥 Mel Boracis, B.P. 口瘍症[10]、敷之有效。

硼強酸 ACIDUM BORICUM, 此藥之效、與鈉硼烘礬同、若製成消水、有醫瘑症[11]之功、燙傷[12]

1 Diphtheria
2 Aphthous stomatitis
3 Cancrum oris
4 Gangrenous stomatitis
5 Pruritus ani
6 Pruritus valvæ
7 Bromidrosis
8 Tinea circinata
9 Tinea tonsurans
10 Cancrum oris
11 Erysipelas
12 Burns

等、置於水內、則成透光似鹼之消水、可爲割具滅穢之藥、但使割具滑而難執、爲不便耳、此藥有潤膚之功、如欲敷於泗膜、水百分、藥不宜過二分。

幾蘇雜消水 Liquor Cresolis Compositus, U. S. 此消水與來蘇同。

鈉硼烘礬 SODII BORAS, U. S. BORAX, B. P. 此礬有由化法而成者、然美國常由喀利佛揑那法大二省之湖邊採取、但必經煉法、方可用之、水十二分、能化藥一分、昔人常言此藥與硼酸消水、皆有滅穢之力、然實無此效、惟有免腐之功、服之無甚功效、只有使尿變鹼之能、然有醫者謂、癇[1]症用之大效、分劑八至十五厘、(0.5-1.0) 漸次增之、至胃道受惹爲止、其味不美、故宜加引藥類方可、良方如左。

鈉硼烘礬 ℞	Sodii boratis, U. S. Boracis, B. P.	半英兩	(16.0)
甘油	Glycerini	一量兩	(30.0)
甘草流膏	Fluidextractæ glycyrrhizæ U. S. Ext. glycyrrhiz. Liq B. P.	二量兩	(60.0)
烝水	Aquæ destillatæ	六量兩	(180.0) —M.

每飯後服二量錢、(8.0) 以水送下。 S.—Dessertspoonful in water after each meal.

1 Epilepsy

孩童二至五厘、(0.12-0.3) 每二三句鐘服一次。

安息祔透 (Benzonaphthol) 此藥可代祔透之用、食滯釀[1]症、服之有效、分劑十厘、(0.6) 置於藥殼內、日服三次。

炦醇 PHENOL, U. S. ACIDUM CARBOLICUM, B. P. 詳見本篇。

幾阿林 (CREOLIN) 此藥由煤溚而得、乃係流質、形似糖漿、色如深棕、頗有免腐之能、且少毒力、置於水內、水則變白、藥不能融化、只成勻類、但水百分、只可加藥十二分、若或過之、餘則沉澱矣。

療效 產時或產後、導產者可以之潔手、或可以藥一分、加水百分冲陰道、爲滅䔿最妙之藥、但不可以之浸割具、因此消水不透光、置割具於其內、視而不見也、婦人之胱炎[2]症、名醫常以此藥冲之、初用時、以藥一分、加水百分、冲至數次、或加藥至二分、則顯功效、耳聤[3]患以藥一分、加水五百分、射於耳內、鼻瘍[4]患以藥一分、加水百分敷之、鼻炎[5]而鼻涕過多、以致成痂者、以藥一分、加水千分冲之、痢[6]與䐈炎[7]等症、以藥五分、加水千分、射於肛內、瞼邊炎[8]、瞭炎[9]、睟疱炎[10]等症、以藥一至二分、加水百分敷之、亦皆有效。

來蘇 (LYSOL) 此藥亦由煤溚而得、色棕透光、其質似油、味與幾阿蘇同、功用與幾阿林

1 Fermentative dyspepsia
2 Cyst tis
3 Otorrhœa
4 Nasal ulcers
5 Rhinitis
6 Dysentery
7 Colitis
8 Blepharitis
9 Keratitis
10 Phlyctenular ophthalmia

吸司所受碳强莠之激力、不能如常、則病者之呼吸必緩而微、而肺中所入迷蒙氣必少也、亦有醫者以氧加入哥羅芳、不使空氣相雜、令病者吸之、此法之弊、亦與上同、又有醫者、以氧與迷蒙藥合貯於庫秋管內、令病者吸之、此法亦不宜用、蓋吸時則袋縮、呼時則袋鼓、呼吸只此袋中之氣、恐有意外之虞、以其空氣不純也。

鈉他連 NAPHTHALENUM, U. S. 此藥由煤澑而得、結晶透光、形成薄片、別具一種氣息、醇酒畧能化之、服後噫氣時、口內覺有燒庫秋之味、有免腐之功、釀瀉臭瀉[1]等症、服之非但敗臭、亦能醫症、孩童之暑瀉[2]、每二至四句鐘、可服一厘之六分之一、至四分之一(0.01-0.015) 成人可服五至十厘、(0.3-0.6) 如過此分劑、有惹胃之患、或加白糖、或置於藥壳內、服之皆可、然此非常用之藥、每有服之而無效者、若灌於獸類、必患瞕症。

鈉透 BETANAPHTHOL, U. S. NAPHTHOL, B. P. 此藥乃由鈉他連用化法而得、敷之有免腐之功、服之可醫胃釀[3]、腸胃脹[4]等患、盟瀉[5]臭瀉等症、服之有效、分劑二至五厘、(0.12-0.3) 置於藥壳內、服之最妙。

鈉透鉍礬 (Betanaphthol-Bismuth, Orphol) 此藥係一類細粉、嘗嗅無味、或言有鈉透免腐之力、亦有鉍礬平育道之能、盟瀉釀瀉[6]二症、常以此醫之、分劑成人五至十五厘、(0.3-1.0)

1 Fetid diarrhœa
2 Summer diarrhœa
3 Gastric fermentation
4 Flatulence
5 Diarrhœa of serous type
6 Serous and fermentative diarrhœa

時以此消水潤之、則石膏必輭而易揭矣、若用爲漱口藥、每令人牙痛、蓋因牙有癬處、藥與癬相觸、變癬愈甚、以金補牙者亦然、或言病體缺氯者、服之有效、然此理不確、姑列分劑於下、一至四量錢、(4.0-16.0)

氯(OXYGEN) 此乃氣質、內外科常用之、用法有二、一將氣擠入鐵桶內、令人吸之、二將氣加於蒸水內、令人飲之、肺炎[1]之中晚二程、因血缺氯之故、病勢甚險、年邁者氣脘炎[2]之晚程、肺癆[3]症而氣促、血虧[4]及血虧惡症[5]、與血多白脒[6]等症、吸之皆效、受煤氣而欠氣[7]者、吸之頗效、如以此氣六十分、氰氯下洽四十分、相合吸之、有平腦系部之功、熏哥羅芳、或伊打等迷蒙藥時、如與氯並用、不但可免中毒、且使病者熏後少有嘔吐、生命司所亦少受阻、但此氣與迷蒙藥並用時、宜視病勢如何、不宜與迷蒙藥合勻吸之也、有醫者常將迷蒙藥置於瓶內、用一庫秋管、與氯袋相連、另用一庫秋管、置於瓶內、令病者啣之、如此則吸時氯由迷蒙藥經過、肺中所得之氣、只爲氯與迷蒙氣矣、此法亦不爲妙、蓋人吸迷蒙藥之多寡、必與所吸之氯相等、是所得之迷蒙效雖多、而受氯之激力亦大也、常用此法者、謂如此用之、必多費時刻、方能奏效、亦有人謂所用之時刻雖多、究不能得其迷蒙之效、蓋因此二氣相合吸之、肺中之氯必多、血中之碳强養必少、呼

1 Pneumonia
2 Bronchitis
3 Phthisis
4 Anæmia
5 Pernicious anæmia
6 Leukæmia
7 Asphyxiated

氫氱強治（HYDROGENII DIOXIDUM）

此藥乃氫氱二氣所成、其化公式即氫二氱二、係無色之流質、臭之無味、嘗之略苦、形似糖漿、水易化之、入藥者、乃以藥三分、水九十七分所成之消水、Aqua Hydrogenii Dioxidi, U. S. Liquor Hydrogenii Peroxidi, B. P. 此水一瓶、能發氱至十瓶之多、功效皆在此氣、使熱至五十九度、其重率必至 (1.006-1.012) 乃爲合宜、但熱之、晒之、或搖撼之、皆易失其功用、如氱一失、則與水無異、故必謹慎貯之方可、如欲試其功效存否、可以鋏錳上礬些二須置於試筒內、加消水一至二量錢、4.0-8.0 如其自沸之力大、藥力尚存、否則其力已失矣、

療效　此藥之大用、乃醫痳症[1]、以之敷患處、頗有袪之之功、且無毒力、與炥醇迥異、但敷時略覺痳痛、後乃假皮漸脫、惟當以絮蘸而敷之、或用玻璃噴霧具噴之俱可、不可用金類之器具、蓋此藥一近金類、立變體質也、喉門微核炎症[2]、先敷此藥、使患處潔淨、後敷怪阿寇有效、患瘻者[3]、無論其瘻或係癧、或係膿菌毒、以此消水射於瘻內俱效、但射時必有放氣之處、否則將膿菌逼至四圍、病者甚受其害、惡瘤[4]生膿、或各類之瘍[5]、敷之有效、如被槍藥轟爆[6]、黑砂陷入皮內、常時敷之、有袪黑色之功、或言螫傷[7]敷之、其痛立止、揭合口貼膏時、如以此消水置於噴霧具內、隨揭隨噴、可免粘痛、如欲去石膏布捲

1 Diphtheria
2 Follicular tonsillitis
3 Abscess-cavities
4 Malignant growths
5 Ulcers
6 Powder-stains
7 Bee's sting

膠透 ("GLUTOL") 此藥乃以筋膠與莯毛製成、其質細粉、有免腐之功、撒於傷口[1]、能使發乾而成假皮、以免毒穢侵入、或言敷燙傷[2]頗效、

鉀錳上礬 POTASSII PERMANGANAS. 此藥色棕結晶似針、遇潮濕則失氣、變其體質、有免腐敗臭之功、如投於汚穢之處、無甚功效、因藥中之氯與之相合、則成他類之物矣、若不多用、功效頃刻即盡、割症者加此藥於水中、待其藥力化足、以之盥手、後蘸草酸消水、祛手上之藥色、再以蒸水洗之、方可割治、此爲最妥免腐之法、瘍瘡[3]或受傷處[4]以此藥六十厘(4.0)加水一量磅(480.0)洗之、亦可以此藥二十厘(1.3)加水一量磅(480.0)以筆蘸而敷喉、或用爲漱口、皆可、痧[5]或紅熱[6]之喉炎症、鼻臭炎[7]或中耳炎[8]等症、以此礬一厘(0.06)加蒸水一量兩(30.0)浴之有效、經閉[9]症有醫者以此藥三至五厘(0.2-0.3)醫之、然其效不似高錳弱礬之妙、且有惹胃之患、食滯[10]、腸胃氣脹[11]等症服之有效、蓋此藥有發氣之性、故於腸胃內有免釀之功、血含尿酸[12]、並虛胖[13]等患、有醫者以此藥醫之、然其效無常、有二名醫云、蛇毒[14]者毒未被陳之先、如以此藥敷之最妙、並以空針射傷處之四圍、其效尤顯、按此藥乃化學中敵鴉片[15]之妙品、中植物類或砒毒[16]者、此爲最有力之敵藥、但不宜與植物類藥同置臼內研之、恐有崩炸之虞。

1 Wounds
2 Burns
3 Ulcers
4 Wounds
5 Diphtheria
6 Scarlet fever
7 Fetid rhinitis
8 Otitis media
9 Amenorrhœa
10 Dyspepsia
11 Flatulence
12 Lithæmia
13 Obesity
14 Snake-venom
15 Opium poisoning
16 Phosphorus poisoning

錯氯粉消水 Liquor Calcis Chlorinatæ, B. P.

氯氣 Vapor Chlori, B. P. 詳見本篇。

錄氯強塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM CORROSIVUM, U. S. HYDRARGYRI PERCHLORIDUM, B. P.

袱毛消水 LIQUOR FORMALDEHYDI, U. S.

此藥係一類之氣、頗有滅瘴毒、並滅穢之功、乃木酒與氯所成者、此消水每百分水內、含氣三十七分、似水而無色、別具一種氣息、於溯膜大有惹力、與酒或水皆可相合、如與水合、數日則袱毛與水相分、故色白似乳、必貯於瓶內、置於冷暗之處、方可、近數年來、有醫者常以氣一分、加水至百分、其免腐之力、足敷割症之用、且毒力較錄氯強塩消水為小、如以割下之瘤、置於其內、則能存之、以備查考、若係大瘤、則宜少加水、以增其免腐之力、或言以此氣一分、加於牛乳三萬二千分內、可存數日之久、人食之亦無損傷、有醫者以含氣三十七分之消水、用為漬藥、以敷癰瘡有效、用此消水以滅瘴毒、其益有三、一用之無險、二不損布色、三價值甚廉、患臭汗[1]者、以此消水一分、加水四至六分洗之、有效、虛汗[2]者、浴其遍身、亦效。

猶袱毛 (EUFORMOL)

此藥內有郁加列、冬綠油、薄荷冰、硼酸、袱毛等物、以藥一分、加水一至四分、可醫虛汗之患。

1 Bromidrosis
2 Excessive sweating

第三十一章　論滅瘴毒藥類

錔氯粉 CALX CHLORINATA, 此藥之製法、乃以熟石灰、（化學家名錔氫）使氯氣串入、每百分中、能攝氯三十五分、甚有惹力、不可用為服劑、藥行所售者氯多不足、因存貯日久、氯氣已失也、人面若挨近此藥、眼必大受其惹、如鼻之不覺其惹力、則知其力已失矣、按此藥之功用、廁中或溝中之瘴毒、如每七日撒此粉數斤滅之、乃為上品、患腸熱症者、所用之便具、於未便之前、可傾此消水於其內、使便中之種滅絕、製消水法、以此粉一磅、(500.0) 加水十六量磅、(8000.0) 即成、論此粉為最有力之敗臭藥、以之撒於死畜上、或人死因有事故、不能埋葬、若以布蘸此消水裹其屍、能免臭味、即傾於污水內、亦能令其清潔可飲、但水每十立方尺、必加錔氯粉二兩、(60.0) 方可、因氯有改色之力、故有色之布、不宜熏之、傷風而喑啞[1]者、過半月如不復原、以輕氯酸數滴、滴於錔氯粉、或鈉氯鹽上、使病者同空氣吸之、或謂其有效、有人以錔氯粉置於盤中、放於屋內、為滅瘴毒之用、此法殊謬、但人多以此法為可恃、不用他法、每有因之而受染者、此法雖能敗臭、究不甚妙、蓋此粉之味、只能解臭味、不能滅瘴毒、雖多用之、亦能滅瘴毒、然惹力甚大、人不能忍受也。

1 Aphonia

則煨至能成丸爲止。

大卡糵梅 ℞-Taka-diastase 四十五英厘 (3.0)
脺梅 Pancreatini 四十五英厘 (3.0)
馬前子膏 Extracti nucis vomicae 四英厘 (0.25) —M.
分置於二十藥殼內、每餐後服一殼。
Pone in capsulas No. XX. S.—One capsule with meals.

如胃經虛弱、可於此方內加辣椒少許。

煉牛膽 FEL BOVIS, U. S.

此係牛膽囊中取出之液、焙之使乾、每百分僅得十五分、如因不消油類食物、或生來膽液不足、以致食滯者、此藥能醫之、分劑五至十五厘、(0.3-1.0) 足分劑、每有輕瀉之功、嘗有醫者如此用之、按服此藥時胃液消化之功必減、胎與腥類之食物消化尤難、蓋此藥能使胎與腥類縮小而變硬、且大改胃經之液、以致功用受阻、故用之者、必於食畢數句鐘、胃經消化之後、腸正消化之時服之、方於胃經之功用無阻也、醫者宜切記之、純牛膽液分劑亦與此同、製法、以牛膽液置於火上、煨至三分之一、加醇酒一分合勻、至二十四句鐘、上下必分二類、上清而下稠、將清者傾出、餘

辣椒脂㯶 B-Oleoresinæ capsici 十至二十量滴 (0.6-1.3)
膵梅 Pancreatini 二十英厘 (1.3)
薑散 Pulv. zingiberis 四十英厘 (2.6)
木炭散 Pulv. carbon. ligni 四十英厘 (2.6) —M.

置於二十殼內、每飯後服一至二殼。
Pone in capsulas, No. XX. S.—One or two, t. i. d. with meals.

如木炭不便、可將饅首切成薄片、以火烤之、至似木炭之狀、亦可代其用、如病者食滯過甚、且有嘔吐之患、若服木炭、則所吐者與大便、必無酸味、但大便色黑而已、成人釀[1]酸之瀉症、服以上之方有效、倘病者腸胃發炎、宜去辣椒脂㯶、若以木炭塊或散作濾水之用、乃最妙之法。

𪌂梅 (DIASTASE) 此藥由酒酵取出、係一類助消化之品、胃經消化食物之時、亦有此梅、功用與倍辛膵梅相似、穀芽中有此藥之功者、惟大卡𪌂梅、乃日本化學家所製者也、服之能使𥽝類變成葡糖、如人不能消化𥽝類之食物、每餐後服此藥二至五厘、(0.12-0.3) 大效、並有良方如左。

1 Fermentative and acid diarrhœa

物、與病者不宜、不必用之、蓋恐胵經之功用反減、久之則功用盡失矣。

胵梅消水 Liquor Pancreatis, B. P. 分劑一至二量錢 (4.0-8.0)

怕怕印 (PAPAIN)

此乃一類菓汁、產於熱道、無論其遇酸液鹼液、俱不能阻其消化之功、與倍辛胵梅不同、但服之者見效甚微、故少有用之者、分劑一至八釐、(0.06-0.5) 或言此樹之葉、孕婦服之、恐有小產之虞。

木炭 CARBO LIGNI

此炭之製法、乃以輭木置於火內、不使空氣侵入、燒之而成、入藥者、宜色黑而脆、且宜疎鬆、嘗齅俱無味、純者水不能化。

療效 以此藥散製作糊藥、敷於久瘡、或疖塊、有滅穢免臭之功、因其有吸水之能、使穢無從生長、並能使氫與他物改變體質也、然雖能滅穢、因其不潔、鮮有用之者、糊藥之製法、以木炭散半兩、(16.0) 碎饅首二兩、(60.0) 胡麻子散一兩半、(45.0) 滾水十量兩、(300.0) 先以碎饅首與胡麻子散加於水內、置於火上、至十分鐘、以木炭散一半、加於其內、後攤於布上、再撒所餘之炭、乘熱覆患處、有效、若作為服劑、頗有醫胃酸噫噎[1]之功、胃弱[2]或胃泗炎之中程、因不知留意於飲食之故、以致多有噫噎之患、良方如左。

1 "Sour stomach"
2 Atonic or subacute gastric catarrh

乳凝結、病者服之、有養育之能、且有助人消化之功。

胑梅 PANCREATINUM, U. S. 此藥係胑經之梅、分為四種、一胑化腥梅、二胑化脂梅、三胑化[米覓]梅、四凝乳梅、若以[米覓]二十五分、靡胑梅一分、其[米覓]即為水所能化、美揀藥册所定之力、即以此為準、其取法、乃由猪之胑經而得、如不便、可將猪飼飽過六句鐘、當胑經作功時、則殺之、將胑經取出、以刀𩐍切之、秤準、加淡酒四倍、待至十二句鐘、傾清、或隔渣、所傾之流質內、即含胑梅、分劑一至二量錢、(4.0-8.0) 更有至妙之法、將猪之胑經𩐍切之、加純酒、待至二十四至四十八句鐘、將酒壓出、再加甘油十倍、泡至四十八句鐘、隔渣、即成胑梅甘油、以三十量滴、(2.0) 調於一盃牛乳內服之、頗有助消化之功、藥行所售者、乃細粉、分劑二至二十厘、(0.12-1.3) 食時服之、或食畢即服、俱可、若與鈉氫碳强礬同服、其效尤妙、食物不化[1]、以致瀉腹、並胃失功用、或因胑經生疸而失功用、以致糖尿[2]症、或有他症、而令胑經消瘦者、此藥皆效、有醫者云、因此藥惟於鹼液中成功、故只可備病者飲食之用、若用為服劑、藥至胃中、胃液所含之酸、立變其體質、反有損消化之功、此論甚謬、蓋食時胃液未生、必過一至二刻鐘、酸液方為此藥之敵、此一二刻時、藥已成功、如此服之、常見功效、按此藥備病者食物之用、頗有助胃消化之功、若此類食

1 Indigestion
2 Diabetes

第三十章　論助消化藥類

倍辛 PEPSINUM, 此藥乃係胃液消化之黴、由猪胃而得、純者得之最難、故藥行常售者、多係黴變滲脛、少係倍辛、且常攙泗液與粹脛等物、如有黴變滲脛、膜之必有臊味、且置於過空氣處、易攝水氣而發粘、如以此藥與淡氫氯酸相合、加食物於其內、其消化之力、與在胃中相等、按美揀藥冊、此藥一分、必有消化粹脛三千分之力方可。

療效　此藥因能醫食滯之患[1]、然稱之者、亦未免過甚、如病因肝經所致、此藥必無醫之之能、蓋醫此等症、究不如脛黴為妙也、此藥宜食時服之、或食畢卽服俱可、脛黴亦然、但此藥常與氫氯酸同服、或見大效。

藥製與分劑

倍辛消水	(Liquor Pepsini)	二量錢	(8.0)
倍辛	Pepsinum,	五至十五厘	(0.3-1.0)
倍辛甘油	Glycerinum Pepsini, B. P.	一至二量錢	(4.0-8.0)
倍辛香酒	(Cordiale Pepsini)	一至二量錢	(4.0-8.0)

食畢卽服、如將倍辛甘油、或倍辛香酒一量錢、(4.0) 調於一盃牛乳內、置於冷處、則其

1 Indigestion

嘗有服二十厘（1.3）而無乖效者、亦有婦人服五厘、（0.3）大有癱患者、故用此藥者、分劑不宜過五厘、（0.3）服後二句鐘、宜服瀉劑、常用此藥者、謂其效爲最準。

石榴根皮流膏 Fluidextractum Granati U. S. 二十至三十量滴、（1.3-2.0）

石榴根皮煮水 Decoctum Granati Corticis, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

洋蘇冰 THYMOL, 詳見本篇。

卡瑪拉（KAMALA）此藥乃一類樹角內所生之棚與毛、產於阿比辛亞印度中華與司大利亞等處、內含一精、名拉特林、此精不入藥用、如服一或二錢、（4.0-8.0）大有瀉效、且有祛帶虫[1]之功、亦有用之祛蛔虫[2]者、宜與鬧羊花同服、以免痺患、服法、宜置於糖漿內、越八句鐘、如不見效、再如法服之、必效。

1 Tape-worm
2 Lumbricoides

石榴根皮 GRANATUM, U. S. GRANATI CORTEX, B. P.

此藥係石榴樹根之皮、內含一流鹻、名石榴印、(Pelletierina) 水二十分能化鹻一分、此鹻有礬盐四類、即石榴印炭匿礬、石榴印硫强礬、石榴印氣盐、石榴印氯盐是也、按石榴印炭匿礬之用、較多於他礬、乃黃色細粉、嘗之味苦、水七百分、醇酒八十分、俱能化欒一分、服毒分劑者、動系之末被癱、其狀與中固拉拉毒相似、但知覺仍存、惟二股之動系、受毒最重、然二股未被癱之先、或有轉筋之患、亦或有惡心嘔吐者。

療效　有醫者以此藥爲祛蛔虫之劑、究之其大用、只祛帶虫[1]而已、或言野石榴根皮、較人種者、其效尤大、然必用足分劑方效、用法、以此皮二兩、(60.0) 加水二量磅、(960.0) 泡二十四句鐘、煎至一量磅、(480.0) 每句鐘服二量兩、(60.0) 至服完爲止、但此法使服之者、常覺不安、瀉腹甚重、且大有惡心嘔吐等患、服後如不瀉腹、恐虫脫藥之毒力、不能隨藥瀉下、必服萆麻油、或他類瀉劑、方能見效、且用藥之先、必禁飲食十二句鐘方可、近之醫者、因人服此藥受苦太甚、故少有用之者。

藥製與分劑

石榴印炭匿礬 Pelletierinæ Tannas, U. S. 三至五厘、(0.2-0.3) 此礬爲此類藥中常用之品、

1 Tape-worm

非利瑪脂楠 Oleoresina Aspidii, U. S. 半至一量錢、(2.0-4.0) 置於藥壳内服之、或製成匀藥亦可、良方如左。

非利瑪脂楠	℞ Oleoresinæ aspidii, U. S. / Extracti filicis liquidi, B. P.	四十五量滴	(3.0)
凡尼拉酒	Tincturæ vanillæ	四十五量滴	(3.0)
非滷散	Pulveris acaciæ	三十英厘	(2.0)
烝水	Aquæ destillatæ	一量兩	(30.0) —M.

禁食一日後一次服之、過二句鐘、服鎂硫强礬一劑。

S.—Take entire amount after fasting, and follow in two hours by a full dose of sulphate of magnesium.

非利瑪流膏 Extactum Filicis Liquidum, B. P. 十五至六十量滴、(1.0-4.0) 日本有名醫二人、查明蓖麻油、有助本藥被吸之力、故二藥同服、易於中毒。

倭瓜子 PEPO, U. S. 此子有祛帶虫[1]之能、宜去皮空腹服之、且無危險、越二句鐘、可再服有力之瀉劑、如欲使人易服、與白糖共研細末可也、分劑二兩、(60.0)

松節油 OLEUM TEREBINTHINÆ, 詳見本篇。

1 Tape-worm

乖效　乖效於下節毒力中論之、但仍有服此藥而成遺溺之患者。

毒力　服過分劑者、則有肌肉微顫、筋抽、昏迷等患、亦有瘈瘲似癎者、凡所見之物、皆成黃色、蓋因藥將眼水染黃之故、或有所見之物、俱成綠色、過數日方能復原者、亦有漸次成盲者、小便先則色黃、後則紅紫、或似血色、此非因其中含血、乃爲藥色所染耳、中毒者、無腸胃發炎之患、因其在育道中無惹力也。

鈉山道年 (Sodii Santoninas)　此藥易化而速暕、故不宜用爲殺虫之劑、只可用之醫視系[1]之症、蓋殺蛔虫之藥、必存於腸內、虫乃食之也、分劑日服二至八厘、(0.12-0.5)

非利瑪 ASPIDIUM, U. S. FILIX MAS, B. P.

此藥係一類草根、產於印度、爲殺帶虫[2]之上品、其力惟遜於石榴、印、未服之先、必禁飲食十二至二十四句鐘、使虫無食物之助、早晨服一劑、過半句鐘、再服一劑、後服鎂硫强瀉一劑、俟受毒之虫瀉下、再食食物、然當查所袪之虫有頭否、如無頭、必再如法用藥、否則虫仍生長、若服毒分劑、則腸胃受惹、以致瀉腹、如藥被暕、先則腦部受阻、以至癱瘓、後則腦力脫失、遂即殞命、服此藥之脂楠、如過一量錢有半、(6.0) 不爲無險。

藥製與分劑

1 Disease of the optic nerve
2 Tape-worm

成末、恐其易於被嗽、以致中毒也、成人之分劑、一至二厘、(0.06-0.12) 置於藥殼內服之、隨即服鎂氯弱塩一至二厘、(0.06-0.12) 過十二句鐘、再如法服之、必效、近有醫者云、以黃色之山道年醫痺[1]症大效、日服三至五厘、(0.2-0.3) 勻開服之。

藥製

山道年藥餅 Trochiscius Santonini, 每餅內有山道年一厘、(0.06) 分劑一二餅、另有良方如左。

山道年	℞-Santonini	五英厘	(0.3)
白糖散	Pulv. sacchari alb.	三英錢	(12.0)
非菘散	Pulv. acaciæ	八英厘	(0.5)
相合研勻、再加	Misce bene, et adde		
非菘漿	℞-Mucilaginis acaciae.	十六量滴	(1.0)
水	Aquæ	酌用	

作成十餅、孩童分劑、一或二餅。
Ft. in troches No. X. S.—One or two lozenges, as directed.

[1] Sprue

蛔虫[1]之功、將此子研成細末、外加糖漿、孩童服之最宜、分劑、十至三十厘、(0.6-2.0)

藜藿油 Oleum Chenopodii, U. S. 此油滴於糖上、或以非菡製成勻藥類、較此子最妙、五正歲之孩童、分劑十量滴、(0.6) 如能服藥殼尤妙、宜空腹服之、但次晨必服瀉劑方可。

哥蘇 CUSSO, 此藥乃一類草花、產於阿比辛亞、內含一氣易散之油、並炭匿酸、苦辛等藥、於人無毒、力有殺帶虫[2]之功、用法、以此花半兩、(16.0) 研成細末、加水一量磅、(480.0) 製成冲藥、早晨空腹服之。

藥製與分劑

苦辛 (Koosin) 二十至四十厘、(1.3-2.6) 宜置於藥殼內服之。

哥蘇流膏 (Fluidextractum Cusso) 半量兩、(16.0) 或言孕婦服之、恐有小產之虞、但無確據。

山道年 SANTONINUM, 此藥乃由一種花蕾取出之精、產於小亞西亞西域等處、醇酒、哥羅芳、俱能化之、水不易化。

療效 此藥之大用、乃專殺蛔虫[3]、無殺帶虫之能、宜空腹服之、或言視系受病、若服中分劑、有增目力之功、遺溺[4]之患、有時他藥所不能醫者、此藥能醫之、宜用其晶、不宜研之

1 Lumbricoides
2 Tape worm
3 Lumbricoides
4 Urinary incontinence

第二十九章　論殺虫藥類

士拜枝喇 SPIGELIA, U. S.　此藥乃一類草根、產於美國南方。

療效　此藥爲殺蛔虫[1]之妙劑、宜空腹服之、服後必服鎂硫强礬、或他速效之瀉劑、使中毒之虫、隨藥而下、如用緩效之瀉劑、恐虫已脫藥毒、而不能下矣、故必如法服之方可見效。

藥製與分劑

士拜枝喇流膏　Fluidextractum Spigeliæ, U. S.　二量錢　(8.0)

士拜枝喇辛那流膏　(Fluidextractum Spigeliæ et Sennæ.)　二正歲之孩童、半至一量錢、(2.0-4.0) 成人一量兩、(30.0) 此膏之味不惡、故孩童易服。

阿西大 (AZEDARACH)　此藥係一類樹皮、產於敘利亞波斯印度等處、內有毒力、(此樹之葉無毒惟皮有之) 多服之者、其狀與中士拜枝喇、或顛茄等毒者相似、有殺蛔虫[2]之功、用法、以此皮二兩、(60.0) 加水二十四量兩、(720.0) 煎至十六量兩 (480.0) 孩童之分劑、半至一量兩、(16.0-30.0) 每二句鐘服一次、至見大便爲止。

藜藿 (CHENOPODIUM,)　此藥乃一類草子、產於美國、內含一油、名藜藿油、其氣易散、有殺

1 Lumbricoides
2 Lumbricoides

鉛礬彈礬餅 (Trochisci Cretæ)

灰擦藥 Linimentum Calcis, U. S. 此以灰消水與胡麻子油各半製成、乃爲敷燙[1]傷之用。

鈣碳强礬 俗名白土 (CRETA) 此藥係微物之殼積合年深而成、入藥用者、惟煉鈣碳强礬。

煉鈣碳强礬 CRETA PRÆPARATA, 此藥醫盟瀉[2]症有效、若兼服植類之斂藥、如佳奴、兒茶、或鴉片樟腦等酒、其效尤妙、良方如左。

佳奴酒	R-Tincturæ kino	一量兩	(30.0)
兒茶雜酒	Tincturæ gambir compositi,	二量錢	(8.0)
鈣碳强礬調水	Misturæ cretæ	加至六量兩	(180.0) —M.

每三句鐘服二量錢、(8.0) 至瀉止爲度。

S.—A dessertspoonful every three hours until diarrhœa ceases.

藥製與分劑

鈣碳强礬雜散	Pulvis Cretæ Compositus, U S.	十至六十厘	(0.6-4.0)
香鈣碳强礬散	Pulvis Cretæ Aromaticus, B. P.	十至六十厘	(0.6-4.0)
香鈣碳强礬鴉片散	Pulvis Cretæ Aromaticus cum Opio, B. P.	十至六十厘	(0.6-4.0)

1 Burns
2 Serous diarrhœa

厘、(0.6-2.0) 此類礬之糖漿、分劑俱一至四量錢、(4.0-16.0) 日服三次、功效與硫迴異、醫者必切記之、因常有誤論此理者也、服錯硫礬類、則硫不入血、惟錯入之、服硫强酸、硫質亦不入血。

石灰 化學家名鈣弱養 CALX, 此藥乃以白花石、或鈣礦强礬、或蠔殼、燒之而得、頗有驗效、與酸斂二類不合。

療效 此藥具有潰力、患久瘍[1]者敷之、有激其收口之功、亦有祛毛瘡[2]之能。

鋏鈣潰藥 Potassa cum Calce, 此製在潰藥中、爲最妙之品。

灰消水 Liquor Calcis, 此消水能免酥腥變硬、多激胃經生液、故有助胃消乳之功、亦有改酸之能、且畧有斂力、如嬰孩或乳婦服之、大概有助嬰孩長骨之功、糖尿症[3]、與慣犯尿酸及惡心[4]嘔吐者、服之俱效、嘔吐[5]者、若以乳與此消水各半小勻同服、雖服他藥無效者、服此亦每有效、分劑一量錢至二量兩、(4.0-60.0) 亦可敷於頭上、以醫癬症[6]、痳症[7]敷之、有祛假皮之功、但其效不似氫氯强洽之大、可置於噴霧具內噴之、或以棉蘸而敷之亦可、其製法、以白石灰一塊、似桃核大、置於四量磅 (2000.0) 淨水內、俟其沉澱、褩淸、貯於瓶內、後再加水至石灰力盡爲止。

1 Old ulcers
2 Hairy growths
3 Diabetes
4 Nausea
5 Vomiting
6 Tinea capitis
7 Diphtheria

日服三次、每服半量兩、(16.0) 飯後一句鐘服之最妙。

S.—One to two tablespoonfuls three times a day.

此方服後、常覺乾渴、如胃經受惹、則宜減其分劑、如人有流血過甚之性、或兼患瘀瘫、服此藥如惹胃經、則宜以錏乳礬二十厘、(1.3) 日服三次、如葯不被啑、宜以葯一分、加水三十分、製成消水、射於皮內、若此藥惹力過大、不宜用為射劑、有醫者曾用此藥之小分劑、醫性易流血者、但服之不宜過四日、恐多服反增其患也、服法先服十五至三十厘、(1.0-2.0) 後每句鐘服五厘、(0.3) 至五六次為止、次日如法服之。

錏硫下礬、與澱錏硫強礬、Calcii Phosphas Praecipitatus, U.S. Calcii Phosphas, B.P. 每用之醫癧[2]與嬰骨輭[3]等症、常用者乃錏硫下礬糖漿、Syrupus Hypophosphitum, U.S. 或錏硫下礬雜糖漿、Syrupus Hypophosphitum Compositum, U.S. 或錏乳硫強礬糖漿、Syrupus Calcii Lactophosphatis 蓋骨與各類之胭內、原有錏硫強礬、故缺此類礬者、服之大效、曾有人以此礬灌於獸類、不但能長骨之硂類、即骨之牲類亦能增長、骨折者[4]、如長合甚遲、或肺癆[5]並癧等症、錏硫下礬或效、肺癆症、初患時、此類礬有效、至中晚二程、則少有醫之之能、乳婦之牙癬[6]、或血虧[7]等症、此類礬有效、錏乳硫強礬、較錏硫下礬尤妙、因其易於被啑也、此二礬之分劑、俱十至三十

1 "Bleeders"
2 Scrofula
3 Rickets
4 Fractures
5 Phthisis
6 Dental caries
7 Anæmia

每三句鐘服二量錢、(8.0) 病愈爲止。

S.—A dessertspoonful every three hours until diarrhoea ceases.

此調水無甚斂力、其大用乃爲攺酸之劑、並有護腸洄膜之功、按鍇碳强礬、在攺酸藥類中、其力最遲、故用爲腸內攺酸之劑、乃爲上品、蓋於胃內不變其體質、至腸內始見功效也、手足妄汗[1]、與瘍[2]或燙傷[3]、敷之俱效。

鍇氯盐 Calcii Chloridum 此藥之過分劑、有惹腸胃之力、甚至殞命、有醫者用之醫瀼櫔癧[4]症、或言能使癧之四圍、有被鍇包裹之功、如孩童之骨不能合宜生長[5]、服之有效、然最妙者、乃鍇乳硫强礬、如癤[6]生膿過緩、以此盐製成消水、灑於糊藥上、有輔助生膿之功、服之者、可以此盐五厘、(0.3) 加水一量錢、(4.0) 製成消水用之、患癢[7]者、日服三次、每次二十厘、(1.3) 或效、又有良方如左。

鍇氯盐	℞-Calcii chloridi.	二英錢	(8.0)
陳花酒	Tincturæ aurantii flor.	六量錢	(24.0)
哥羅芳水	Aquæ chloroformi q. s. ad	六量兩	(180.0) —M.

1 Sweating of the hands and feet
2 Ulcers
3 Scalds
4 Scrofulous enlargement of glands
5 Deficient bone-formation
6 Boils
7 Itching

貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之。

鈉沘消水 Liquor Sodii Hydroxidi, U. S.

鍇 (CALCIUM,) 此係金類元質、不入藥用、入者乃其數類礬盐、即鍇氯盐、Calcii Bromidum, U. S. 澱鍇碳强礬、Calcii Carbonas Præcipitatus. 鍇氯盐、Calcii Chloridum. 鍇銧下礬、Calcii Hypophosphis. 澱鍇硄强礬、Calcii Phosphas Præcipitatus, U. S. Calcii Phosphas. B. P. 枯鍇硫强礬、Calcii Sulphas Exsiccatus, U. S. 凡此礬盐類、俱與酸類不可合用。

澱鍇碳强礬 此藥有醫盟瀉[1]之功、亦有改酸之能、孩童之對磨瀨[2]皮裂等患、敷之有效、服分劑十至三十厘、(0.6-2.0) 最妙者、惟鍇碳强礬調水、Mistura Cretæ, 此製每量兩 (30.0) 內、有鍇碳强礬三十厘、(2.0) 孩童之分劑一量錢、(4.0) 成人之分劑一量兩、(30.0) 患盟瀉者、如以此水與他類歛藥同服、功效尤妙、其良方如左。

佳奴酒	℞-Tincturæ kino	一量兩	(30.0)
兒茶雜酒	Tincturæ gambir comp.	二量錢	(8.0)
鍇碳强礬調水	Misturæ cretæ	六量兩	(180.0) —M.

1 Serous diarrhœa
2 Intertrigo

消化、且有助胃生化腥梅之功、分劑十至二十釐。(0.6-1.3)

鈉伊替礬 (SODII ETHYLAS,) 此藥色白、形如細粉、加水則成酒與鈉氷、加醇酒則化之、但不改其體質、能祛生毛之痣[1]類、用法、先將毛剃去、以此礬化於純酒內、用玻璃管蘸而敷之、越片時即成一痂、半月後揭去、則毛之根盡絕矣、倘有未盡、俟收口後再敷、宜於未敷之前、以寇卡印一釐、(0.06) 加水二十量滴、(1.3) 用空針射於痣之四圍、可免其痛、凡諸等痣類、皆可以此法醫之、但祛後或成小瘢。

鈉伊替消水 Liquor Sodii Ethylatis, B. P.

鈉硫下礬 SODII THIOSULPHAS, U. S. 此藥無色、過光、形如鱗片、置於過空氣處、則攝水氣、以試紙試之、畧有鹼效、水一分、能化藥一分、酒不能化。

療效 寄生之皮症[2]、以此礬一錢、(4.0) 加水或猪脂一量兩、(30.0) 調和敷之、頗效、如以三十釐、(2.0) 加水一量兩、(30.0) 有醫漆咬[3]或皮癢[4]之功、若因瘴症溺血[5]者、每四句鐘服十至三十釐、(0.6-2.0) 常效。

鈉氷 SODII HYDROXIDUM, U. S. 此藥之潰力、較小於鋏氷、潰力之大小、能隨人意用之、用法與鋏氷同、以脂或貼膏覆患處之四圍、再敷此藥、則無恙之皮、不致受其潰力也、此藥必

1 Hairy growths
2 Parasitic skin diseases
3 Rhus poisoning
4 Pruritus
5 Malarial hæmaturia

第二十八章 論改酸藥類

鈉 (SODIUM)

此係金類原質、於人身少有感能、入藥者乃其數類礬鹽。

鈉醋礬 SODII ACETAS, U. S.

此礬或可代鉀醋礬之用、然用之者鮮。

鈉氣碳強礬 SODII BICARBONAS,

此礬常爲改酸[1]之用、如因胃釀[2]之故、以致嘔吐而頭痛[3]者、服之有效、如與鋰氣弱鹽同服、能增鋰氣弱鹽之功、凡鹼藥類、俱能激肝而免液變稠、非只此礬也、節痺[4]症、多有醫者以此礬置於水內化開、以布蘸之、裹於骨節痛處、大效、患胃酸之良方如左。

鈉氣碳強礬	R-Sodii bicarbonatis	三十英厘 (2.0)
菓酸	Acidi tartarici	五英厘 (0.3) —M.

此二藥各以半盃水化之、後合爲一盃、沸時即服。

S.—Dissolve each in half a tumbler of water, add one to another and swallow during effervescence.

鈉氯鹽 SODII CHLORIDUM

此藥亦有育身之功、血與身胭所含之鹼、多緣此鹽、且能助胃生液、胃內之乳酸、與此鹽相合、則成爲鈉乳礬、與輕氯酸、輕氯酸尤關緊要、不但助其

1 Gastric acidity
2 Gastric fermentation
3 Sick headache
4 Rheumatism

高嶺土 KAOLINUM, 此土乃由石變成者、癩[1]症、撒於惹處有效。

高嶺土糊藥 Cataplasma Kaolini, U. S.

[1] Eczema

流出、亦可敷之、使膿變稠、而後放之、如此其痛可漸次而減、以至痊癒、但癰患未必盡然、敷後仍有甚痛者、則不宜再敷、當以刀放膿方可、痘症[1]、如以輭火棉酒敷於面上、可免成瘢之患、癲症[2]之節炎、如加氯酒等分敷之、痛先覺增、逾時必效。

藥製

輭火棉酒 Collodium Flexile, 此以火棉酒九十二分、堪阿大脂楠五分、蓖麻油三分、相合而成、無縮力、亦不變硬、故較火棉酒尤妙。

止血火棉酒 Collodium Stypticum, U. S. 此酒內含炭匿酸、能止輕流血之患、然因其不潔、故用之者少。

洋斑蝥火棉酒 Collodium Cantharidis, U. S. 詳見洋斑蝥篇。

⿰米堯 AMYLUM,

⿰米堯類甚繁、由玉蜀黍而得者、方入藥用、對磨瘢[3]患、製成藥散、敷之有效、其緊要之用、乃製成⿰米堯水與糊藥也、⿰米堯水之製法、以⿰米堯二大勺、(30.0) 加水一量磅、(480.0) 置於火上煮之成漿、再加滾水、至成稀漿爲止、可作引藥之用、亦有平潤膜之功、肛發炎[4]或受惹時、以此水射於肛內、則有平之之能、糊藥之製法、以⿰米堯加水化之、置於火上煮成稠漿爲止、如於每兩 (30.0) 內加硼酸三十厘、(2.0) 則有滅穢之功。

1 Smallpox
2 Gouty inflammations of the joints
3 Intertrigo
4 Rectal irritation

輭鹼擦藥、Linimentum Saponis Mollis, 鹼擦藥、Linimentum Saponis, 此藥常與他類同用、以擦肌板或筋扭等患良方如左。

草烏頭酒	℞·Tincturæ aconiti	二量錢	(8.0)
顛茄酒	Tincturæ belladonnæ	二量錢	(8.0)
鴉片酒	Tincturæ opii	二量錢	(8.0)
鹼擦藥	Linimenti saponis q. s. ad	加至六量兩	(180.0) —M.

鹼貼膏 Emplastrum Saponis, 此膏之大用、乃攤於布上、以貼臥瘡[1]、如尙未成瘡、貼於壓處、可免此患、亦有用之以醫節扭者[2]。

火棉酒 COLLODIUM, 此藥乃以火棉、置於醇酒與伊打內化成、爲過光之流質、臭之頗有伊打之味。

療效 此酒於浮傷[3]或蹭傷[4]、以刷刷之、可免空氣入於傷口、但有縮力、敷後皮必綳縮、至乾時而止、因病者多受疼痛、故醫者必加他藥、製成輭火棉酒用之、癤[5]初起時、頂有膿皰、四圍發硬、如敷於硬處、切勿敷於皰上、或不至於生膿、如業已生膿、此法無益、若未

1 Bed-sores
2 Sprained joints
3 Small wounds
4 Abrasions
5 Boils

甘油鉛醋礬抹膏 Unguentum Glycerini Plumbi Subacetatis. B. P.

撒卡林 BENZO-SULPHANDUM, U. S. GLUSIDUM, B. P.

此藥色白、形如細粉、嗅之無味、嘗之甚甘、較白糖甘二百二十倍、藥被祛時、不變體質、無體功效、糖尿[1]瘨[2]等症、可代白糖之用、胃失功用者忌服、以其有阻胃之力也、分劑無定、其一釐(0.06)之甘味、與白糖一小勺(4.0)相等、常用之分劑乃半釐。(0.03)

煤油蠟 PETROLATUM, U. S. PARAFFINUM MOLLE, B. P.

此藥自煤油而得、存之日久、味終不壞、常用爲潤皮之藥、腸胃受惹[3]者、可以此藥平之、因不被噏、故多服亦無損傷、且無瀉效、製抹膏者、常以之爲主也。

流煤油蠟 PETROLATUM LIQUIDUM, U. S. PARAFFINUM LIQUIDUM, B. P.

此類藥常置於噴霧具內、以噴鼻嗓之惹患。

白煤油蠟 PETROLATUM ALBUM, U. S.

此油純而無色。

鹼 SAPO, U. S. SAPO DURUS, B. P.

此藥乃鹼類與油類相合而成、常用者係鈉沘與洋橄欖油所成、喀司替勒鹼、乃最上之品、嬰孩大便結燥、可以此鹼製成肛彈、蘸水塞於肛內、有通大便之功。

輭鹼 SAPO MOLLIS,

此藥常用之以醫皮症、如癩[4]症等類。

1 Diabetes
2 Gout
3 Gastro-intestinal irritation
4 Eczema

乾且多漬牙穢者、如加水等分、漱口大效、肺癆[1]之晚程、而舌燥者、如依上法製之、再加檸檬汁少許、用之漱口有效、瘖頸[2]積血之患、因此油有攝水之能、可以絮蘸而塞之、日換一次有效、皮受惹者、以此油十五分、加洋山芋糡一分、置於火上和勻、即凝成過光之膏、再加錳養數分、敷之大有平之之功。

藥製

甘油炥醇 Glycerinum Acidi Carbolici, **B. P.**

甘油炭匿酸 Glycerinum Acidi Tannici, **B. P.**

甘油鉦鋏硫強礬 Glycerinum Aluminis, B. P.

甘油硼強酸 Glycerinum Acidi Borici, B. P.

甘油鉛醋礬 Glycerinum Plumbi Subacetatis, **B. P.**

甘油卡喇坎 Glycerinum Trageacanthæ, **B. P.**

甘油鈉硼烘礬 Glycerinum Boracis, B. P.

甘油倍辛 Glycerinum Pepsini, B. P.

甘油糡 Glycerinum Amyli, B. P.

1 Phthisis
2 Congestion of the uterine cervi

第二十七章　論潤皮藥類

濕羊毛脂 ADEPS LANÆ HYDROSUS. 此藥由羊毛而得、色白、較他類之脂不易成皺、雖日久亦無腥臊之味、以其甚粘、故鮮有用之者、如加軟煤油蠟三分之一、則不粘而易用矣、有醫者謂、此油能潤透皮內、若加以喇瑣辛、潤力尤大、但皮症專敷此脂、少有醫症之能、必合他藥同敷方效、若製成抹膏、與猪牛羊等脂無異、但有時惹皮、然不常見。

甘油 GLYCERINUM. 此藥由脂類用烝法而得、易攝水氣、其能化之物極多、有敷之而皮受惹者、亦有敷之而生瘡者、以其能攝皮內之水也。

體功效　如將此藥射於血脈內、則有癱瘓之勢、因其多攝血內之水也。

療效　有醫者云、患糖尿症[1]者、服之尿則加增半倍、若以之代糖之用、不爲妙法、亦有醫者云、頗有功效、故糖尿或他類不可食糖之症、可試用之、如欲輕瀉可服一至二量錢、(4.0-8.0) 以一至四量錢、(4.0-16.0) 射於肛內、亦有瀉效、加水少許亦可、但加水與否不爲緊要、如用甘油肛彈、Suppositoria Glycerini, 必有瀉效、大便久燥[2]、此彈最妙、然或有惹肛之患、按此藥有免腐之能、如加水四五倍、以噴霧具噴於鼻內、有醫新鼽症[3]之功、如欲敷於皮上、宜加水等分方可、盯聹[4]變硬、以此油滴於耳內、能使之柔輭、腸熱症以致口[5]

1 Diabetes
2 Chronic constipation
3 Acute coryza
4 Impacted cerumen
5 Dry mouth of typhoid fever

可以此糖代之、因其於人身內被㖔後、遇氣即改其體質、故即日服一至二兩、(30.0-60.0) 或亦不爲過度、且有育身之功、不受食育之孩童、或患肺癆者、如胃經不能消化蔗糖、此糖爲宜。

1 Tuberculosis

甘草錏沘 Glycyrrhizinum Ammoniatum, U. S. 五至十五厘 (0.3-1.0) 此乃以錏沘消水化甘草之甘精而成、故其味較他製之甘草尤甘。

胡麻子 LINUM,

此藥係一類草子、內含一油並一類之膠、其油名胡麻子油。

療效 泗膜[1]受惹者、此藥有潤之之功、故胱新炎[2]、氣管炎[3]、胃炎[4]、腎炎[5]等症、服之有效、製法、以熬胡麻子三錢、(12.0) 甘草膏三十厘、(2.0) 加滾水十量兩、(300.0) 煨於火傍、一至四句鐘之久、不宜使之滾沸、蓋水一滾沸、其油與子卽分、服之則難於下咽矣、此藥淡而無味、人多不喜服、若加檸檬汁、白糖、非菡等少許、則易服矣、如病者咳嗽過甚、可加鴉片樟腦酒少許、則有平嗽之功、有醫者以此油二量兩、(60.0) 用爲瀉藥、或言以此劑醫痔症[6]、大效。

藥製

胡麻子散 Lini Contusum, B. P. 此散常製成糊藥用之。

灰擦藥 Linimentum Calcis, U. S. 此以胡麻子油與灰水各半、調和而成、爲敷燙傷[7]之用。

左糖 (LEVULOSE)

此係一類之糖、較蔗糖尤甘、純者內無葡糖、患糖尿症[8]者、忌食蔗糖、

1 Inflamed mucous membranes
2 Acute cystitis
3 Bronchitis
4 Gastritis
5 Nephritis
6 Hemorrhoids
7 Burns
8 Diabetes

藥製與分劑

甘草膏 Extractum Glycyrrhizæ, 五至百二十厘 (0.3-8.0)

甘草純膏 Extractum Glycyrrhizæ Purum, U. S. 五至百二十厘 (0.3-8.0)

甘草流膏 Fluidextractum Glycyrrhizæ, U. S. Extractum Glycyrrhizæ Liquidum, B. P. 一至二量錢 (4.0-8.0)

輔香酒 Elixir Adjuvans, U. S. 此酒內有甘草流膏。

甘草雜調藥 Mistura Glycyrrhizæ Compositus, U. S. 一至四量錢 (4.0-16.0) 內有鴉片樟腦酒十二分、銨葡酒六分、燈氰弱浮酒三分。

甘草雜散 Pulvis Glycyrrhizæ Compositus, 一至四錢、(4.0-16.0) 按美揀藥冊此散千分內有辛那百八十分、甘草二百三十六分、淨硫八十分、小茴香油四分、白糖五百分、按英揀藥冊每十二分內有辛那二分、甘草二分、小茴香一分、升硫一分、白糖六分、其大用乃為瀉劑、分娩後常用之、無論何症、如因躺臥日久、大便乾結、服此散乃為妙劑。

甘草鴉片餅 Trochisci Glycyrrhizæ et Opii, U. S. 每餅內有鴉片一厘之二十分之一、(0.003) 甘草膏二厘、(0.12)

第二十六章 論潤藥類

非酒 ACACIA, U. S. ACACIÆ GUMMI, B. P. 此藥乃由一類樹汁曬乾而成、產於亞非利加洲之北、奧司大利亞等處凝結成塊大小不同其色黃白畧能透光無體功效。

療效 喉胃腸洒膜[1]受惹或發炎以此藥含於口內化而咽之、或置於水內、化而服之、俱有平洒膜之效、如陰陽尿徑之洒膜發炎、亦可用之、因其力微小、故常與他平藥同服、有醫者以此藥與胡麻子並他類之藥兼用、醫孩童或成人之乾嗽[2]症、其法先將胡麻子浸於水內、煨於火傍、數句鐘之久、但不宜使至滾沸、後加此藥、與檸檬油少許、化勻服之、製藥者、使藥成丸、亦多用此酒

藥製

非酒漿 Mucilago Acaciæ, 此漿乃以非酒十兩五錢、(340.0) 灰消水十兩、(320.0) 水三十二量兩 (1000.0) 製成。

非酒糖漿 Syrupus Acaciæ, 此糖漿乃以非酒六錢、(25.0) 糖漿二兩半 (75.0) 製成。

甘草 GLYCYRRHIZA, U. S. GLYCYRRHIZÆ RADIX, B. P. 此草產於歐羅巴亞西亞等處、入藥者、係此草之根、如製膏服之、有激口生涎之功、亦有輕瀉之效、且因其能改味、故常用爲藥引。

1 Inflamed or irritated mucous membrane
2 Dry cough

即染成深棕以色。

上、若患處較大、則以數粒置於過空氣處、俟變成流質、以玻璃管蘸而敷之、但患處之四圍、宜敷以油、或覆以合口貼膏、則無恙之皮、不至受其潰力、曾有婦人、生楊梅之濕瘡甚重、以此酸潰之、竟至殞命、故用此藥、不爲無險、如欲患處畧潰、可以此酸百厘、(6.6) 加水一量兩、(30.0) 敷之、則潰力不至過甚、若誤服此酸、宜用醫胃道炎症之法醫之、即服灰消水、非酒漿、並當用吐劑、或可救其生命。

鏹強酸消水 Liquor Acidi Chromici, B. P. 此水乃以酸一分、水三分製成。

溴 BROMUM, U. S.

此藥係深紅色之流質、別具一種氣息、有如氯味、宜貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之、置於寒冷之處、若敷於皮上、潰力最大、甚至深入肌裏、傳染之痻症[1]、可以玻璃管蘸而敷之、其患庶不至浸淫四散。

加沕烘酸 PYROGALLOL, U. S.

此藥乃以加沕酸、用火煨之而成、色白、形如細鱗、無味、嘗之覺苦、伊打、醇酒、皆易化之、水一分零十分之六、能化藥一分、見光即變黑色、故宜貯於黑色瓶內、嚴密塞之。

療效 凡寄生之皮症[2]、以此藥三十至百厘、(2.0-6.6) 加豬脂一兩、(30.0) 製成抹膏、敷之有效、如膏內多加此藥、則多有潰力、癬症[3]、以此藥醫之、可代齊墳便之用、惜其敷於皮上、

1 Hospital gangrene
2 Paracitic skin diseases
3 Psoriasis

粇散	Pulv. amyli	三英錢	(12.0)
寇卡印氯塩	Cocainæ hydrochlorat.	三十英厘	(2.0)
蒸水	Aquæ destillat.	加至二量錢	(8.0) —M.

調成糊藥、敷於患處。 S.—Apply as a paste.

鋅氯塩消水 Liquor Zinci Chloridi, 此消水乃爲滅癉毒之用。

錸氯強塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM CORROSIVUM, U. S. HYDRARGYRI PERCHLORIDUM, B. P. 詳見本篇。

高錸氰強礬消水 LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS, U. S. LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS ACIDUS, B. P. 詳見錸篇。

硫強酸 ACIDIDUM SULPHURICUM, 詳見本篇。

氰強酸 ACIDUM NITRICUM, 詳見本篇。

鑛強酸 CHROMII TRIOXIDUM, U. S. ACIDUM CHROMICUM, B. P. 此藥色紅結晶、易攝水氣、嘗之有金酸之味、乃爲酸母、必加水而後成酸、宜貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之、不可與燐氰弱浮酒、醇酒、甘油、或他類之生質相合、恐有崩炸之險。

療效　此酸爲潰藥之用、能醫皮與洇膜生瘤症[1]、如患處較小、可以此酸之一粒、敷於其

1 Groths on the skin or mucous membrane

第二十五章 論潰藥類

鏀泚 POTASSII HYDROXIDUM, U. S. POTASSA CAUSTICA, B. P. 此藥色白質硬、易攝水氣、頗有潰力、瘍胬[1]或瘰類、常用此藥醫之、膚疽[2]初起時、去痂敷之、越一二分鐘、再敷糊藥、至數日潰肉脫而疽愈矣、用法、先以油類抹於疽之四圍、以合口貼膏、按疽之大小、中剪一口、覆於患處、使其疽顯露、用鉗夾此藥之小塊擦之、庶不至潰無恙之皮、而患處立受其潰力、潰力已足、則敷醋、或他類弱酸藥以解之、但敷此藥甚覺疼痛、故常用鏀泚錯弱嫠 又名危恩漿 (Potassa cum Calce) 以代之、雖潰力較鏀泚為小、功用與鏀泚同。

砒弱酸 ARSENI TRIOXIDUM, U. S. ACIDUM ARSENIOSUM, B. P. 詳見本篇。

鉦氯塩 ZINCI CHLORIDUM, 此塩色白、結晶似針、易攝水氣、臭之無味、嘗之辛辣、以試紙試之、則有酸效、亦有滅瘴毒之能、昔之醫者、常以此藥一至二厘、(0.06-0.12) 加水一量兩、(30.0) 用為洗目之藥、今用之者少、白濁[3]之中程、可如上製法射於尿脘內、有效、膚疽初起之良方如左。

鉦氯塩 ℞ Zinci chloridi 一英錢 (4.0)

1 Exuberant ulcers
2 Cutaneous cancer
3 Gonorrhœa

者謂、於腸胃毫無損傷、究之服者胃經如大有消化之功與湅力、則必中毒、若消化之功與湅力畧小、則不致中毒也。

賽蒲阿 (THAPSIA) 此藥乃由一類草根之皮所得之樠、產於歐洲東南各處、有生皰之力、常製成貼膏、貼於患處、亦常作爲敷藥、如敷之日久、則大顯惹力、倘仍敷不止、必致成瘡也。

加火棉酒二量兩、(60.0) 以刷敷之。 S.—Apply with a brush to the part affected.

琥珀 (SUCCINUM) 此藥乃由地中掘出之柄、產於布路司玻利非亞等國、入藥者、乃用烝法由此柄取出一類之油、名琥珀油、其氣易散、大有惹力。

療效 呃逆不止者[1]、此油乃為上品、節痺症[2]、如用此油敷之有效、瘥[3]、癪[4]、哮嗽[5]等症、曾有醫者用此藥大效、嬰孩之氣管炎[6]、如兼有腦部受惹之狀、以此油一分加洋橄欖油三分、搓其胸背有效、成人之喉新炎症[7]、如氣管被累、先服鈉氯鹽之足分劑、後以此油一分、加洋橄欖油三分、搓其頸與胸有效、此油之服分劑二至六量滴、(0.12-0.36) 調勻服之。

相思子 (JEQUERITY) 此藥乃一類草子、敷於傷口、則有毒力、與蛇毒相似、不可用為服劑、患睥瘋久炎者[8]、如以此子半錢、(2.0) 加百零四度之熱水一量兩、(30.0) 製成冲藥、以刷蘸之、敷於睥上、病狀即改、必另發新炎而起白皮、此炎一過、每多痊癒、如所發之炎甚猛、可以布蘸極淡之錄氯強鹽熱消水覆之、屢行更換方可、接此冲藥變壞甚速、宜用現製者、不然必加硼酸四至八厘、(0.25-0.5) 方能存數日之久、若射於蛋內、則大顯阻心之力、如將此子整服、則少顯中毒之狀、然有醫者謂、服此子必致腸胃受惹、亦有醫

1 Persistent hiccough
2 Rheumatic joints
3 Asthma
4 Hysteria
5 Whooping-cough
6 Bronchitis of infants
7 Acute laryngitis
8 Chronic granular conjunctivitis

齊瑣便 CHRYSAROBINUM, 此藥係酸鹼中性之精、由一類木取出、色黃、形成細粉、嘗之無味、酸鹼二類消水、與伊打、俱能化之。

療效 痾症[1]、或寄生類之皮症[2]、服此藥一厘之八分之一、(0.008) 或效、然用齊瑣便抹膏敷之、乃爲常法、以此抹膏惹力甚大、故宜加安息香猪脂四五倍、調勻用之、雖如此減少其力、猶有敷後皮腫而發炎、以至皺脫者、如皮有傷口、忌敷、恐藥力被暰、則有嘔吐之患也、此藥有染皮之力、敷之者、皮色必染成深棕、故不宜敷於面上、倘皮色受染、以鉀氯粉製成淡消水洗之、可去其色、若衣爲其所染、則無法能去之矣、患痾者、宜先沐浴、使患處之皮變輭、後再敷藥、良方如左。

齊瑣便	℞ Chrysarobini	一英錢	(4.0)
伊打	Ætheris	酌用	
醇酒	Alcoholis aa q. s. ut ft. sol.	酌用	
火棉酒	Collodii	二量兩	(60.0) —M.

製此方時、以齊瑣便一英錢 (4.0) 加伊打醇酒等分、至齊瑣便化盡、再

1 Psoriasis
2 Parasitic diseases of skin

常作貼膏之用、肌痺[1]氣管[2]久炎等、貼之有效。

巴根地樠貼膏　Emplastrum Picis, B. P.

堪阿大樠 （PIX CANADENSIS）

此樠由堪阿大松樹而得、與巴根地樠同。

堪阿大樠貼膏（Emplastrum Picis Canadensis）

松樠 RESINA

此藥乃係蒸松節油時所遺者、製貼膏或蠟抹膏、常用之、患氣管久炎者[3]、如燃而吸之或效、凍瘃[4]或燙傷[5]之輕者、有醫者嘗以樠蠟抹膏敷之有效、如敷樠蠟雜抹膏則有激效。

松樠抹膏 Unguentum Resinæ, B. P.　其用與樠蠟抹膏同。

安他斐便 （ANTHRAROBIN）

此藥色黃、形如細粉、遇潮氣改其體質、水與酸類不能化、醇酒與淡鹼水類俱能化之、如化於醇酒內、可存七日之久、取用甚便、所成之消水、先則色棕、繼則色綠、後則色似青蓮、體質與齊瑣便相似、醫皮症之能、亦與之相似、各類癬症、如以十至二十分、加醇酒、或淡鹼水百分、製成消水、洗之有效、疥[6]斑癬[7]瘰[8]等症、有著名醫者、以此藥醫之、有醫者謂、此藥少有惹皮之力、與染皮之能、故較齊瑣便尤妙、且其染衣之患、亦不爲甚、稍加浣濯、即痕漬無遺也。

1 Muscular rheumatism
2 Chronic bronchitis
3 Bronchitis
4 Chilblains
5 Scalds
6 Psoriasis
7 Pityriasis versicolor
8 Herpes

粉三分、調勻敷之、可免其皮受傷、如欲製成貼膏、以芥末麥粉合勻、用熱水或醋調和、攤於布上、以敷患處、受此藥之惹力、其傷痊瘉最遲、雖已痊瘉、患處仍有紅色、稍觸卽痛、其紅色或有永不退者、如燙傷甚重、宜以灰消水、與洋橄欖油各半、調勻敷之、若灰消水不便、僅敷洋橄欖油亦可。

藥製

芥油 Oleum Sinapis Volatile, 此油大有惹力、並有起皰之能、嗜酒而胃失功用者、服一量滴之四分之一至二分之一 (0.015-0.03) 有效。

芥紙 Charta Sinapis. 此紙有外惹內效之功、其惹力頗大、故貼之者、宜先以潮濕之細麻布、墊一二層、再貼此紙、方免起皰之患。

芥擦藥 Liminentum Sinapis, B. P. 此藥乃以芥油、蓖麻油、樟腦、酒等製成。

辣椒 CAPSICUM, U. S. CAPSICI FRUCTUS, B. P. 詳見本篇

松節油 OLEUM TEREBINTHINÆ, 詳見本篇

錏洸消水 AQUA AMMONIÆ, 詳見本篇

巴根地樆 PIX BURGUNDICA, B. P. 此樆由挪威之松樹而得、人身之熱度、能使之融化、故

洋斑蝥蠟膏 Ceratum Cantharidis, U. S. 此膏攤於布上、以為生皰之用。

洋斑蝥火棉酒 Collodium Cantharidatum, U. S. Collodium Vesicans, B. P. 此酒為生皰之用、乃最潔淨、然其被血所嗽、較他製甚易。

洋斑蝥消水 Liquor Epispasticus, B. P. 此水專為外惹內效之用。

煖貼膏 Emplastrum Calefaciens, B. P. 此膏略有外惹內效之力、如不欲生皰者可用之。

洋斑蝥貼膏 Emplastrum Cantharidis, B. P.

洋斑蝥抹膏 Unguentum Cantharidis, B. P. 此膏亦為生皰之用、用時宜先以鹼水洗其處、後用粗布擦乾、令皮發紅、再後以醋擦之使濕、隨即敷藥。

白芥 SINAPIS ALBA, U. S. SINAPIS ALBÆ SEMINA, B. P **黑芥** SINAPIS NIGRA, U. S. SINAPIS NIGRÆ SEMINA, B. P 此二藥內含一類大有惹力之油、名芥油、Oleum Sinapis Volatile, 功效多在此油。

療效 此藥有外惹內效之功、常以醫腸胃脹之痳症[1]、或腹與胸之新炎[2]、肌痺[3]、節炎[4]、系痛[5]等症、亦可用之、頭痛[6]、或顱腦積血[7]、敷於項上有效、如敷於皮上過數分鐘、其皮有如燙傷之狀、故皮薄者、必用芥末麥粉各半、調勻敷之方可、如孩童用之、宜以此藥一分、麥

1 Colic
2 Acute inflammations of the abdominal and thoracic viscera
3 Muscular rheumatism
4 Inflamed joints
5 Neuralgia
6 Headache
7 Cerebral congestion

胱受阻、則可服之、有悸症與年邁之婦人、或咳或噫或笑時、有遺尿[1]之患、雖係久症、此藥常有功效、莖舉砂痛[2]服此酒半量滴、(0.03) 每日二三次或效、有著名醫者云、若因貪色太過、以致陽痿[3]者、以此酒五至八量滴、(0.3-0.5) 與鐵氯酒之足分劑、並馬前子等藥同服、或不至絕嗣、但此係過分劑、用者最宜謹慎、蓋此藥不幾及毒分劑、無激陰陽之效也、白濁久症[4]與胱底棚遺液[5]等症、服之有效、皮科醫士謂服此酒、有醫疥[6]、癩[7]瘡[8]癢[9]癬等症之功、但所用之分劑、必使胃與腎不受其惹方可、此藥外惹內效之力最大、敷於皮上、必致生皰、而有祛積液[10]之功、故不用之以醫輕炎症、必重炎症方宜用之、並不可用之過多、恐其被喉惹腎、致有淋漓刺痛之虞、腎積血或腎炎者、不宜用此藥以生皰、蓋此類之病、易受藥惹而中毒也、曾有醫者云、有人本無腎炎之病、敷此藥致患腎新炎重症、且致腦中尿毒、又有醫者云、用此藥之酒半量滴、(0.03) 加水四十量滴、(2.6) 敷湯傷[11]有效。

藥製與分劑

洋斑蝥酒 Tinctura Cantharidis, 半至五量滴 (0.03-0.3) 此藥中可為服劑者、只有此酒。

1 Incontinence of urine
2 Chordee
3 Impotence
4 Gleet
5 Prostatorrhœa
6 Psoriasis
7 Eczema
8 Lichen
9 Prurigo
10 Effusions
11 Burns

第二十四章 論外惹內效藥類

洋斑蝥 CANTHARIS

此藥乃一類之蟲、產於西班牙義大利西西利島俄羅斯等處、以俄羅斯所產者爲上品。

體功效 以此藥敷於皮上、先有惹力、後則生皰、如用之過多、則生皰必大、或致藥㾓作燒、腦部受激、服中分劑者、胃經覺煖、陰陽尿具畧受其激、而受感最重者、乃在腎經、服毒分劑者、腰甚作痛、胱與尿管灼痛、陽莖强直、甚至胱急腎炎、溺血、小便先則短少、後則閉塞、尿管口亦大作痛、最重者、陽莖陰道、或有生瘍之患、且口渴思飲、育道發炎、若服吐劑、令之吐出、其蟲之翼甍仍見、若服此藥末則不然

療效 此藥有服敷二用、可服者惟洋斑蝥酒、有激瘄之效、若病者虛弱、以致經閉[1]、此爲妙劑、有醫者云、脫膚腎炎之中程、服此藥之小分劑頗效、然此論未確、如用之、恐其病加增、若腎經虛弱之晚程[2]、以致失其功用乃效、或病者用力稍過、增其尿胞之患、如每日三次服此藥酒半量滴、(0.03)有效、若因嗜酒以致腎脫膚久炎[3]、且多失功用、其效尤妙、雖不能使之痊瘉、亦能利小便、而使病勢減輕、腎總漏炎[4]、胱久炎[5]等症、服之均效、有醫者云、婦孺之胱惹患[6]、服此藥一量滴、(0.06)每日三次有效、倘胱發炎、則不宜用、如因

1 Amenorrhœa
2 Advanced stages of nephritis
3 Chronic parenchymatous nephritis
4 Pyelitis
5 Chronic cystitis
6 Irritability of bladder

藥製與分劑

金印草流膏　Fluidextractum Hydrastis, U. S. / Extractum Hydrastis Liquidum, B. P.　五至三十量滴 (0.3-2.0)

金印草酒　Tinctura Hydrastis,　三十至一百二十量滴 (2.0-8.0)

金印草甘油　Glyceritum Hydrastis, U. S.　專爲敷洇膜之用。

金印草印　Hydrastina, U. S.　一釐之四分之一至二分之一 (0.015-0.03)

金印草印氯鹽　Hydrastinæ Hydrochloras, U. S.　半至一釐 (0.03-0.06)

哥大林印 (COTARNINE)　此藥乃由鴉片之鹻名拏哥汀者用化法而得、體功效、與金印草印相似、經旺[1]、赤癠[2]、鼻衄[3]等症、服之有效、常用者、乃哥大林印氯鹽分劑半至四釐、(0.03.0.24) 製之成丸、或置於藥壳內、日服三次有效、或以一至二釐、(0.06-0.12) 用空針射之、亦可。

1 Menorrhagia
2 Metrorrhagia
3 Epistaxis

道鬆弱之白帶[1]、鼻洇膜久炎[2]等症、此爲妙劑、或言金印草酒、有醫瘴症之功、但無確據、白濁[3]之晚程、或服或射、均爲妙品、射法以雜金印草印五厘、(0.3)加水一量兩(30.0)射之、有著名醫者、醫白濁新症之良方如左。

金印草印氯盐	℞-Hydrastin. hydrochloridi	五英厘	(0.3)
銀腥礬	Protargol.	五英厘	(0.3)
甘油	Glycerin.	三十量滴	(2.0)
烝水	Aquæ destillat.	加至一量兩	(30.0) —M.

先以溫水射之、後射此藥、日射四至六次、必令存至五或十分鐘之久、方能見效。

S.—Precede with a hot-water injection and use four to six times daily, telling the patient to retain it five to ten minutes each time.

婦人之白濁[4]、或白帶[5]等症、以此藥一錢、(4.0)加滾水八量兩、(240.0)洗之有效、或以金印草流膏半至一量錢、(2.0-4.0)加水一量磅(480.0)洗之、其效亦同。

1 Leucorrhœa
2 Chronic nasal catarrh
3 Gonorrhœa
4 Vaginal gonorrhœa
5 Leucorrhœa

麥奴印 (Ergotinum)　二至五厘 (0.12-0.3)

麥奴之力無常、因其原力無常、故宜用經試者、如欲試之、可灌有胎之獸類、視其有打胎之力否、抑或灌無胎之獸類、視其有縮小血脈之力否、如有力者、獸類食之日久、則血脈縮小、微血脈即不能運血、無力者、雖久食之、與血脈亦無損傷。

毒力　新毒　中毒之輕者、漸次而顯、或甚覺饑餓、或有時嘔吐、重則有頭痛、昏譫、發冷、坐臥不安等患。

積毒　中積毒者原分二類、一患肌抽搐、或瞕症、一患疔症。

金印草 HYDRASTIS, U. S. HYDRASTIS RHIZOMA, B. P.

此藥乃產於北亞美利加之北、入藥者乃其根、內含二鹻、一名金印草印、一名畀耳畀林、惟金印草印令人瘓瘫之力較大。

體功效　試以此藥灌於獸類、先則脊腦瘓瘫、後則全身被癱、若藥中多含金印草印、瘓瘫之患必重、如將金印草印、射於獸頸盂內、血壓先則減少、後則大增、且顯毒力、人服足分劑、於生命司所少有感能。

療效　腸胃泗膜久炎者[1]、服之有效、如因嗜酒所致、其效尤妙、因其有補胃之能、故瘅症後服之最宜、無論何處之泗膜、若失功用而虛弱者、即泗膜癀症之中程[2]、宮泗膜炎[3]、陰

1 Chronic gastro-intestinal catarrh
2 Catarrhal jaundice
3 Uterine catarrh

他類之積血[1]者、亦效、如與毛地黃同服尤妙、痢症[2]如多帶血亦效、盟瀉症[3]或效、頭暈[4]者、如頭與頭皮作痛、以此藥之流膏二十量滴、(1.3) 錏氣盐五至十厘、(0.3-0.6) 日服三次、常效、瘖洄膜之下有筋瘤[5]之患、（此瘤常有流血者）嘗有醫者、以此藥醫之、蓋服此藥、瘖必縮小、瘤則少得血之養育、流血之患亦漸次而止、其連瘤之筋、必致腐爛、而瘤則脫落矣、但其效甚緩、且大有疼痛之患、若瘤之大者忌服、血流痔症[6]、其小便長數[7]者、此藥或能醫之、如與鈉氣盐同服、其效尤妙。

藥製與分劑

麥奴流膏 Fluidextractum Ergotæ, U. S. Extractum Ergotæ Liquidum. B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

麥奴膏 Extractum Ergotæ, 五至三十厘 (0.3-2.0) 此藥可作射皮之用、惟純麥奴爲最妙、然純者未入揀藥册。

麥奴葡酒 (Vinum Ergotæ,) 四至八量錢 (16.0-30.0)

麥奴冲藥 Infusum Ergotæ, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

麥奴射藥 Injectio Ergotæ Hypodermica, B. P. 三至十量滴 (0.2-0.6)

麥奴錏沘酒 Tinctura Ergotæ Ammoniata, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

1 Hypostatic congestion
2 Dysentery
3 Serous diarrhœa
4 Vertigo
5 Uterine fibroids
6 Bleeding hemorrhoids
7 Diabetes insipidus

且此藥有激各類無志肌之能。

療效　此藥常於分娩時用之、以免產後崩[1]之患、用法、胎頭將過會陰時、以麥奴之流膏、半至一量錢 (2.0-4.0) 服之、切不宜早服、恐有意外之虞、然服之者少、蓋產後崩乃罕見之事也、若娩婦易犯此症、則宜服之、如已有流血之勢、則用此膏一至二量錢 (4.0-8.0) 或服麥奴葡酒一量兩、(30.0) 越一刻鐘即效、其效可存半句鐘之久、以常理而論、將分娩時、此藥不宜用、然有時亦可用之、如分娩之先、並無他患、惟宮漸次失其縮力[2]、服加非或寇拉、或他類激藥、俱無效者、則服此流膏五至二十量滴、(0.3-1.3) 之小分劑有效、蓋小分劑使宮之縮力、不至瘈瘲、只使其縮力如常也、陰道狹窄者忌用、宮口尚未及舒展者、亦忌用、產後重崩[3]、以純麥奴、或麥奴印、射於身之一處、最為妙法、售純麥奴者、乃以此藥貯於玻璃管內、每管只敷一次所用之分劑、用時宜以空針由管內吸出射之、若分娩後、宮內有血塊、或胎膜留於其內、此藥忌用、恐致宮口縮緊、血塊胎膜不下、以致受毒也、產後宮不復原[4]、服此藥之中分劑有效、有醫者云、肺腎二經流血之患、服之大效、然非妙法、試專以肺言之、夫肺脈管本無司絡腦所之系、若用此藥、血必多歸於肺血管、是反增其流血之患也、鼻衄[5]、經旺[6]、崩[7]等症、有效、病臥日久、以致肺有積血[1]、或

1 Post-partum hemorrhage
2 Uterine inertia
3 Severe postpartum hemorrhage
4 Subinvolution of the uterus
5 Epistaxis
6 Menorrhagia
7 Metrorrhagia


第二十三章　論縮子宮藥類

麥奴 ERGOTA,　此藥係黑麥上之菌絲羅、內含數精、依化學家所論、乃爲一夾雜藥、然所論者亦不一、如用此藥之一精、其力不似本藥之大、惟麥奴印一精、與本藥之力畧同、以其內含數精也、或言此藥之力、惟在其鹼、名可納印、亦有言可納印非鹼者。

體功效　**腦部**　此藥於腦部少有感能。

絡部　如以中分劑射於盂內、血壓先則減少、後則畧增、其減少者、因藥力至心、以致心經被阻也、其畧增者、因激司絡腦所也、如射過分劑、血壓則減而不增、司絡腦所漸次被癱、至心癱則殞命矣、服中分劑者、有增血壓之效、緣其能激心肌、與血脘之肌、使之縮小也、心經不受其阻者、因藥力不能驟至於心也。

第五十六圖



此圖表明麥奴激脊腦中司子宮所如A亦激子宮肌如B

子宮　常言此藥有激子宮肌絲之力、服之者其子宮縮小、此言雖確、然有未盡、近有醫者查明、亦有激司子宮所（此所在腰處之脊腦間）之能、產婦服足分劑、子宮則縮小、內有瘈瘲之勢、胎即被逼而下、如服微分劑、或只增其縮力、而無瘈瘲之勢、

療效 有以此油爲打胎之劑者、然其險甚大、且功效無常、亦有服毒分劑而無效者、嘗有醫者以之爲祛風劑、近少用之、如因虛弱以致經旺[1]或癪症[2]此油有效、嘗有醫者以之爲祛蛔蟲藥、然不如他藥之穩妥、其分劑三至六量滴、(0.2-0.4) 置於藥殼內服之。

炭阿西呑 (TANACETUM)

此係一類之草入藥者、乃其葉與嫩梢、內含一氣易散之油、名炭阿西呑油、(Oleum Tanaceti) 分劑一至三量滴、(0.06-0.2) 有調經之功、亦有祛風之效、服毒分劑者、先有似癇之瘈瘲、後則昏迷、以至殞命、蓋因呼吸被阻耳。

芫荽油 APIOL

此油由洋芫荽而得、形如樟腦、因其易化、故常售者乃以油七十五分、加醇酒二十五分、成爲流質、其體功效、尚未確知、然有法醫二人、謂服過分劑者、則耳鳴、頭痛、且有酒醉之狀。

療效 或以服此藥之過分劑、與貴林同、故謂其能醫瘴症、但此言不確、後有醫者查明、其正川乃醫經閉、用法自行經之前七日服起、日服三次、每服二至八量滴、(0.12-0.5) 因其味不美、宜置於藥殼內服之、或言此藥無打胎之力、然常有私服此藥、自打其胎者。

1 Menorrhagia
2 Metrorrhagia

第二十二章　論調經藥類

鉀錳上礬 POTASSII PERMANGANAS, 詳見本篇。

洋斑蝥 CANTHARIS, 詳見本篇。

沙芬 SABINA, U. S. 此乃一類長春矮木之梢、產於歐亞美三洲之北方、內含一氣易散之油、名沙芬油、Oleum Sabinæ, U. S. 若以此油敷於皮上、其惹力較松節油爲大、服毒分劑者、先則惡心嘔吐、育道發炎、靈性無覺、後則尿閉、遂至殞命、孕婦中此藥之毒、將死時、則必小產、而多流血、故不可以此藥打胎、因其險甚大也。

療效　經閉症[1]、如每三四句鐘、服此油五至十量滴、(0.3-0.6) 頗有激蕩與卵腺之能、使多蓄血、以助其經、經旺[2]之患、服之或效、服法置於藥殼內、或製成勻藥最妙。

沙芬流膏 Fluidextractum Sabinæ, U. S. 分劑五至十量滴、(0.3-0.6)

芸香 (RUTA) 此藥係一類之草、內含一氣易散之油、名芸香油。

體功效　此油敷於皮上、乃有惹力、以至起皰、服過分劑者、有育道發炎之患、藉肺腎與皮而祛、故服之者、由痰尿汗中、可嗅其味、如服毒分劑、必致嘔吐、腹痛、並有似癇之瘈瘲、然因此藥而殞命者甚鮮。

1 Amenorrhœa
2 Menorrhagia

錏碳強礬 AMMONII CARBONAS,

此礬成塊、色白、透光、錏沘之味極大、嘗之味辣、以熱至七十七度之水四分、能漸化藥一分、如置於過空氣處、則錏沘之氣、與碳強洽漸失、亦不透光、後則體質變輕、或成細粉、如置於滾水內、則錏沘氣、與碳強洽相分、滾之既久、必盡飛散、氣管炎[1]症、服之有效、如在初起時、或嬰孩與幼童患之、其效尤妙、單用、或與錏氯鹽兼服俱可、此藥爲激呼吸絡二部速而有力者、故割孩童之症、用迷蒙藥、此部受阻時、醫者每以此藥激之、分劑二至十厘、(0.12-0.6) 加非菘糖漿、以水送下、茲方如左、

錏碳強礬	R-Ammonii carbonatis	四十八厘	(3.2)
非菘糖漿	Syrupi acaciæ	一量兩	(30.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	加至三量兩	(90.0) —M.

三四歲之孩童、每二句鐘服一小勺。(4.0) 白水送下、

S.—A teaspoonful every two hours in water for a child of three or four.

1 Bronchitis

豆蔻雜酒 Tinctura cardamomi composit. 加至二量兩 (60.0) —M.

日服三次每次一小勺 (4.0) 白水送下、 S.—Teaspoonful t. i. d. in water.

配此方時、必按所列之次序加藥方可、此藥雖有醫症之功、然因服之者多顯乖效、故著書者未嘗用之。

代澠尼 (DIONIN)

此藥乃以莫非用化法而得、色白、結晶形如砂粒、其味畧苦、水七分、醇酒二十分、糖漿二十分、皆能化藥一分、伊打、哥羅芳、俱不能化、此藥有服敷二用、其內服之用、如患肺病而久嗽[1]、且肺內作痛者[2]、服一釐之四分之一、至四分之三、(0.015-0.045) 有效、患胃瘍[3]或胃疽[4]腸疽[5]甚覺痛苦、如服莫非而嘔吐者、可服此藥以止其痛、失眠者[6]、服倍羅拏或索弗拿、如兼服此藥、能增其睡效、肛痛之患、以此藥一釐 (0.06) 製成肛彈、射之有效、其外敷之用、常醫目疾、有時瞭生瘍[7]、瞭體炎[8]、睛簾並圍炎[9]、緑眼[10]等症、以此藥一至五分、加水百分、製成消水、每日滴於眸袋內、二至三次、有效、但初滴時大顯惹力、自覺灼痛、且眸顯腫狀、越二十分鐘、眸腫卽消、灼痛亦止、但無痲效、如與寇卡印同敷、必兼有痲效矣、如敷至數次、惹力漸減、若隔日敷之惹力必輕。

1 Cough
2 Pain in chest
3 Gastric ulcer
4 Gastric cancer
5 Cancer of bowel
6 Insomnia
7 Ulcer of cornea
8 Parenchymatous ketatitis
9 Iridocyclitis
10 Glaucoma

厘(0.5-1.3)置於藥殼內、或製丸服之俱可、日服二三次、如服之過勤、恐有惹胃之患。

賽阿寇 (THIOCOL) 此藥乃由怪阿寇、用化法而得、色白、形如細粉、臭之無味、嘗之先覺略苦、後則變甜、水易化之。可代怪阿寇、與幾阿蘇之用、氣管久炎[1]、或肺癆症[2]、服之有止嗽之功、宜日服三次、每次十至三十厘、(0.6-2.0) 其所擅長者、乃在藥味甚微、易於被㖦、且無惹胃之患、如服此散、或置於藥殼內均可。

布羅方 BROMOFORMUM, U. S. 此藥乃係布羅方九十九分、純酒一分、係無色之流質、別具一種氣息、嘗之味甘、醇酒易化、水畧化之、必不酸無色者、方入藥用、且宜貯於深黃瓶內、置於暗處、有阻絡部之能、而阻心之力無幾。

療效　此藥雖有迷蒙之能、而醫者不作熏藥之用、只用之以醫嗬嗽[3]、服分劑二至五量滴、(0.12-0.3) 日服三次、並有良方如左。

布羅方	℞-Bromoformi	十六量滴	(1.0)
醇酒	Alcoholis	二量錢	(8.0)
甘油	Glycerini	十二量錢	(45.0)

1 Chronic bronchitis
2 Tuberculosis
3 Whooping-cough

萵苣糖漿 Syrupi lactucarii 三量兩 (90.0)
透路糖漿 Syrupi tolutani 三量兩 (90.0) —M.
日服三或四次、每服二至四量錢、(8.0-16.0)
S.—One to two dessertspoonfuls three or four times a day.

又方

替耳品泚 ℞-Terpini hydrat. 四十英厘 (2.6)
安息香酸 Acidi benzoici 四十英厘 (2.6)
寇第印 Codeinæ 五英厘 (0.3)
製成二十丸、日服三四次、每次一丸。
Fiant pilulæ No. XX. S.—One pill three or four times a day.

近數年來、售藥者、多以此藥、與赫囉印、製成香酒類、用為祛痰之劑、乾嗽不止者、亦能醫之、

替品那 (TERPINOL) 此藥乃以替耳品泚、加金酸類置於火上、煎之而成、其質似油、臭之味似玉簪花、水幾不能化、伊打、醇酒、俱易化之、功用與替耳品泚同、分劑八至二十

與伊替氣塩哥羅芳、各等分相合、滴數滴於海絨上、置於病者之鼻前、吸其氣亦效、陰陽尿徑之久炎[1]、有醫者以之代檀香油、或哥拜巴之用。

服法　以此藥五至十滴、(0.3-0.6) 置於藥殼內、或滴於白糖上、每三句鐘服一次、但有惹胃腎之力、亦有時令人瀉腹。

替耳品沘　TERPINI HYDRAS, U. S.

此藥乃將松節油、醇酒、氰强酸相合、以化法製成結晶、無色、嘗之略覺有味、齅之則無、冷水二百五十分、或滾水三十二分、或醇酒十分、或伊打百分、或哥羅芳二百分、俱能化藥一分。

療效　此藥有激喉嗓氣管等泗膜生液之能、延纏之氣管炎或久炎[2]、有祛痰之效、草泗炎症[3]、必用足分劑方效、宜日服三次、每服十五至二十厘、(1.0-1.3) 置於藥殼內、或成丸服之、按此藥之用無多、但醫以上二症、乃歸上品、常用之分劑二至三厘、(0.12-0.2) 並有良方如左。

替耳品沘	℞-Terpini hydrat	七十五英厘	5.0,
伯蘭地	Spirit. vini gallici	二量兩	(60.0)

1 Genito-urinary inflammations
2 Subacute or chronic bronchitis
3 Hay fever

之故乃因呼吸部被阻也。

辛伊加 SENEGA, U. S. SENEGÆ RADIX, B. P.

此藥乃一類草根、產於美國。

療效 延纏之氣脘炎或久炎[1]、此藥有激氣脘使痰易出之力、心腎二經有症、兼患痳腫、有醫者用之爲利小便之劑、究之此藥阻心之力過大、無論心經患何病症、皆不宜用、其正用乃醫氣脘久炎、然必與他類袪痰藥兼服、方可。

藥製與分劑

辛伊加糖漿 Syrupus Senegæ, U. S. 一至二量錢、(4.0-8.0) 海葱雜糖漿內、亦有此藥。

辛伊加流膏 Fluidextractum Senegæ, U. S. 十至二十量滴 (0.6-1.3)

辛伊加酒 Tinctura Senegæ, B. P 一至二量錢 (4.0-8.0)

辛伊加冲藥 Infusum Senegæ, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

辛伊加濃消水 Liquor Senegæ Concentratus, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

替利賓 TEREBENUM,

此藥乃以硫強酸與松節油相合、蒸之而得、爲無色之流質、水不能調和、齅之其味若松、

療效 氣脘新炎晚程或氣脘久炎[2]、此藥能化氣脘內之稠痰、或服或熏、俱效、若以此藥、

1 Subacute and chronic bronchitis
2 Late stages of acute, or chronic bronchitis

血根 SANGUINARIA, U. S. 此藥係一類草根、最要者、乃其所含之鹻、名血根印、入藥以來、醫者嘗用之醫數類病症、但不爲上品、蓋其益不敵所損也。

療效 氣管久炎、乃係此藥專醫之症、昔日醫者、嘗用之作吐藥、以醫哮吼、因其惹力與阻力過大、故止而不用、有著名醫者、謂人患腸胃洄腺炎、而兼有癀症者、此藥有激肝之功。

藥製與分劑

血根流膏 Fluidextractum Sanguinariæ, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3) 爲祛痰之劑、十至三十量滴、(0.6-2.0) 爲嘔吐之劑、如作吐劑而不見效、不可聽其存於胃內、必須用他類吐藥吐之、或用胃抽器抽之方可、以其毒力過大也。

血根酒 Tinctura Sanguinariæ, U. S. 二十至三十量滴、(1.3-2.0) 爲祛痰之劑、一至三量錢、(4.0-12.0) 爲嘔吐之劑。

血根醋 Acetum Sanguinariæ, U. S. 十至三十量滴、(0.6-2.0) 爲祛痰之劑、二至四量錢、(8.0-16.0) 爲嘔吐之劑。

毒力 服毒分劑、初則嘔瀉、流涎、後有似痓之瘈瘲、絡部大受其阻、其殞命也、非因以上

松澔 Picis liquidæ 六英錢 (24.0)
綠鹼 Saponis viridis 二英兩 (60.0)
猪脂 Adipis 二英兩 (60.0)
錩礞呫礬散 Pulveris cretæ 四英錢 (16.0) —M.

如皮易受惹、可多加猪脂、惟孩童之乾癩無效、乾癩之良方如左。

松澔 ℞-Picis liquidæ 半英錢 (2.0)
澱硫 Sulphuris præcipitati 半英錢 (2.0)
鉦養抹膏 Unguenti zinci oxidi 一英兩 (30.0) —M.

早晚敷於患處。 S.—Apply night and morning.

松澔藥類、面上忌敷、因其有染皮之力也。

阿摩特 AMMONIACUM, B. P.

此藥乃一類樹膠、近少用之、氣管久炎[1]、如不作燒服之有效、分劑十至三十厘、(0.6-2.0) 成丸服之。

阿摩特調水 Mistura Ammoniaci, B. P. 氣管久炎、服之有效、分劑半量兩。(16.0)

1 Chronic bronchitis

存貯瓶內、隔數句鐘搖動一次、七日後置於濾筒濾之、每服二量兩。(60.0)

氣管久炎、歐洲各國、常以松瀝消水醫之、其製法、乃以松瀝一分、水四分、貯於瓶內、每數句鐘搖動之、俟至二十四句鐘、傾出過濾、每日勻服一至二量磅、(500.0-1000.0) 初服則吐痰必多、後則漸少。

藥製與分劑

松瀝糖漿 Syrupus Picis Liquidæ, U. S. 此乃以松瀝消水、加白糖而成。

松瀝葡酒 (Vinum Picis) 一至四量兩、(30.0-120.0) 功用與此藥之糖漿或消水同、其製法、乃以松瀝一量磅、(500.0) 甘油、白葡酒、蜂蜜、各半量磅、(250.0) 淡醋酸一量兩、(30.0) 滾水六量磅、(3000.0) 貯於瓶內、以熱水燉之、不時搖動、其熱不使過一百六十度、約過數句鐘、提出其瓶、置於他處、二三日後、過濾數次、即成。

外用 癬[1]症、以松瀝抹膏、Unguentum Picis Liquidæ, 敷患處、有效、並有良方如左。

澱硫 ℞-Sulphuris præcipitati 六英錢 (24.0)

1 Psoriasis

症、有醫者用之、謂有大效。三十至六十量滴 (2.0-4.0)

藥製與分劑

龍骨草流膏 (Fluidextractum Euphorbiæ Piluliferæ)

龍骨草煮藥 (Decoctum Euphorbiæ) 二量兩 (60.0) 此煮藥之製法、試畧言之、以此草乾葉一撮、加水四量磅、(2000.0) 置於火上煮之、至三量磅 (1500.0) 爲止。

松瀝 PIX LIQIDA, 此藥乃以松樹、用乾烝法而得、色黑如油、水畧能化之、醇酒、油類、鏦泚消水、鈉泚消水、俱易化之、如將此藥烝之、可得瀝油、Oleum Picis Liquidæ, U. S. 有醫者以此油、加淡油類、用噴霧具以噴氣脘炎[1]症、或置此油於滾水內、以吸其氣亦可、然不爲妙劑、延纏之氣脘炎或氣脘久炎[2]、以此藥製成二厘 (0.12) 之丸、服之有效、腸胃洄膜炎[3]亦效、有名醫治久瀉[4]之良方如左。

灰消水 B-Liquoris calcis 八量磅 (40000.0)

松瀝 Picis liquidæ 一量磅 (500.0)

洋郁李皮散 Pulv. pruni virginianæ 一英兩 (30.0) —M.

1 Bronchitis
2 Subacute and chronic bronchitis
3 Gastro-intestinal catarrh
4 Chronic diarrhœa

蒜 (ALLIUM) 此藥內含一氣易散之油、能激胃洄膜、使多生液、故有助消化之功、傷風[1]不止、致氣脂常炎者、可以蒜搗爛、敷於胸前有效、如皮膚受惹、不易忍受、可攙麩一半、製成糊藥敷之、嬰孩之瘈瘲[2]、無論因大腦或脊腦之故、可以此糊藥敷於脊背、或足心有效、腸胃洄膜炎[3]者、糊於腹上有效、如內加數類香料、其效尤妙、孩童延纏之傷風[4]可加於牛乳內、以火沸之、每數句鐘服少許有效、或以蒜油製成勻藥、服之亦可、此油之分劑、一至二量滴、(0.06-0.1) 孩童傷風新症、作燒時不宜服、因其激力過大也、有醫者以蒜汁二至五量滴、(0.1-0.3) 醫嘔吐[5]之患有效。

蒜糖漿 (Syrupus Allii) 孩童之分劑一量錢、(4.0) 成人之分劑四量錢、(16.0)

海葱 SCILLA, 詳見本篇。

龍骨草 (EUPHORBIA PILULIFERA) 此藥係一類之草、產於奧司大利亞與西印度海島。

體功效 試使獸類食毒分劑、呼吸與絡部、大受其阻、以至殞命、於他部則少顯感能、服足分劑、有時胃經受惹。

療效 此草所以入藥者、乃爲醫瘷[6]症之用、經用者、謂以此藥醫此症、功效如神、究之其功效最顯者、人尚未知係何類瘷症、亦未知此藥何以有此能也、氣脂久炎[7]與氣脹[8]等

1 Persistent cold
2 Convulsions of infants
3 Gastro-intestinal catarrh
4 Colds
5 Vomiting
6 Asthma
7 Chronic bronchitis
8 Emphysema

體功效　此藥之體功效、人未詳察、惟吸最大之分劑、則有迷蒙之效。

療效　氣管新炎[1]、或久炎症[2]、常以此藥醫之、且因其中含有氣質、不但有醫症之效、亦有改症之能、如氣管洄膜發炎、吸此藥則痰不致稠粘、而氣管亦不致脹大、由是醫者、於瘵症[3]、或因瘵而氣脹者[4]、以爲大有醫之之功、亦有醫者謂肺炎症、此藥有效、惟至晚程之時、最爲合宜、然此等功效、著書者實未見之也。

用法　以此藥十至二十量滴、(0.6-1.3) 置於布上吸之、或病者自執藥瓶、藉手之熱度、以散其氣、嗅之亦可。

膠草 GRINDELIA, U. S.

此草產於美國、內含一樹一鹼、並一氣易散之油。

體功效　無論人與禽獸、服中分劑、無甚功效、過分劑、先則覺系之末、與脊腦覺所被癱、後則動所與其系亦癱、以其能激顱臟腑系、故脉覺遲緩、能激司絡腦所、故血壓加增。

療效　瘵症[5]服之神效、氣管炎[6]之晚程亦效、用法服膠草流膏 Fluidextractum Grindeliæ U. S. 二十至六十量滴、(1.3-4.0) 或以此草之葉浸於鋏氰強礬消水內、俟乾、製成煙捲、或置於盤內燃之、以吸其氣、俱效、胱炎[7]久症服之有激胱之效、中漆毒[8]而皮炎者、如將此草之流膏、加水十倍、敷之有效。

1 Acute bronchitis
2 Chronic bronchitis
3 Asthma
4 Emphysema
5 Asthma
6 Bronchitis
7 Cystitis
8 Ivy poisoning

氣、惟此最爲妙法、氣管久炎[1]、或臭肺炎症[2]、此法有效、昔有醫者、以此盐醫瘴症、近少用之、亦有名醫以此盐醫卵腺系痛[3]、又有以之醫肝經久失功用[4]、或肝炎中程[5]、肝變硬[6]、肝瘴[7]等症者、孩童腸胃涸膜久炎[8]、此爲妙劑、並有良方如左。

錏氯盐	℞-Ammonii chloridi	四十八英厘	(3.2)
甘草流膏	Fluidextracti glycyrrhizæ, U.S. Extracti glycyrrhizæ liquidi, B.P.	一量兩	(30.0)
烝水	Aquæ destillatæ	三量兩	(90.0) —M.

三至四歲之孩童、日服三次、每飯後服一小勺。

S—Teaspoonful every two hours in water for a child of three or four years.

製丸服之亦可、必當多用水、或牛乳送下、方免惹胃之患、有醫者云、胃內多存酸液[9]、失功用而作痛者、於飯前半句鐘服十厘、(0.6) 最妙、中漆毒[10]而皮炎者、以此盐一兩、(30.0) 加水二量磅、(1000.0) 洗之有效。

燐氣盐 (AETHYLIS IODIDUM) 此藥乃無色之流質、火不能燃、其氣易散、畧有辣味、人多嫌其味不美、然不多齅、則無惹力、其體質見光即改、故宜貯於黑色瓶內、置於暗處。

1 Chronic bronchitis
2 Fetid bronchitis
3 Ovarian neuralgia
4 Chronic torpor of the liver
5 Subacute hepatitis
6 Hepatic cirrhosis
7 Hepatic abscess
8 Intestinal catarrh
9 Hyperacidity of stomach
10 Varnish poisoning

第二十一章 論祛痰藥類

路卑利 LOBELIA, 詳見本篇

銻鉀菓礬 ANTIMONII ET POTASSII TARTRAS, U. S. ANTIMONIUM TARTARATUM, B P 詳見本篇

衣必格 IPECACUANHA, U. S. IPECACUANHÆ RADIX, B. P. 詳見本篇

鉀檸礬 POTASSII CITRAS, 詳見本篇

阿甫莫非綠塩 APOMORPHINÆ HYDROCHLORIDUM, 詳見阿甫莫非篇。

錏綠塩 AMMONII CHLORIDUM,

此塩之功用、與他錏類之塩礬迥異、絡部與呼吸部、不受其感、惟激泗膜生液之力甚大、其氣能醫氣脘炎症[1]、製此氣有數法、一以此塩數厘置於鐵勺內、以燈火烤之、其氣即生、可令病者吸之、二用三玻璃瓶、一貯濃錏沘消水、一貯鹽綠酸、一貯清水半瓶、以玻璃管、將二藥瓶、與清水瓶相連、令二瓶之氣入於清水內洗淨、則成錏綠塩氣、可令病者以玻璃管吸之、三以大盤盛硫強酸四兩、(120.0) 以小盤盛濃錏沘消水二兩、(60.0) 以鈉綠塩一錢、(4.0) 置於硫強酸之盤內、過一分鐘、則錏綠塩之氣、彌滿屋內、此氣一過、再加鈉綠塩、其氣仍生、可令病者吸之、如欲常用此

1 Bronchitis

披路加便氰强礬 Pilocarpinæ Nitras, B. P. 一厘之八分之一、至二分之一、(0.008-0.03)

不符之藥　阿刀便茵精、俱爲本藥之敵藥。

乖效　服此藥者、或有目視迷離、嘔吐、腦力脫失、涎腺與喉門栅腫、呃逆等患、如解嘔吐之患、莫非爲妙、有醫者云、常服此藥者、其髮則黑而粗。

燄氰弱浮酒 SPIRITIS ÆTHERIS NITROSI, 詳見本篇。

錏醋礬消水 LIQUOR AMMONII ACETATIS, 此消水有改酸之功、亦畧有發表之效、其力遜於燄氰弱浮酒、分劑、一至二量錢、(4.0-8.0)

衣必格鴉片散 PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII, U. S. PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS, B. P. 此藥乃以鴉片一分、衣必格一分、乳糖八分製成、昔爲表藥類中之最要者、近多以乍波蘭的代之、分劑五至十五厘。(0.3-1.0)

乍波蘭的流膏	℞—Fluidextracti pilocarpi, U. S. Extracti jaborandi liquidi, B. P.	一量錢	(4.0)
辣椒酒	Tincturæ capsici	一量兩	(30.0)
洋斑蝥酒	Tincturæ cantharidis	半量錢	(2.0)
蓖麻油	Olei ricini	一量錢	(4.0)
醇酒	Alcoholis	四量兩	(120.0) —M.

每早晚敷無髮處、以手搓之。

S.—Apply with friction in spots to the scalp, night and morning.

藥製與分劑

乍波蘭的葉散 (Pulvis Pilocarpi Foliæ) 四十厘 (2.6) 製成冲藥服之。

乍波蘭的流膏 Fluidextractum pilocarpi, U. S. Extractum jaborandi liquidum, B. P. 十至四十量滴 (0.6-2.6)

披路加便 Pilocarpina 常用者乃披路加便氯鹽。Pilocarpinæ Hydrochloridum, U. S. 射分劑、一厘之八分之一、至二分之一、(0.008-0.03) 服分劑、一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.03) 因服之少有嘔吐之患、故較乍波蘭的尤妙。

乍波蘭的酒 Tinctura Jaborandi, B. P. 二至四量錢 (8.0-16.0)

阻力過大、恐其益不抵所損也、然用一厘之三十分之一、至二十分之一 (0.002-0.003) 之小分劑、有激腎之功、虛弱者、夜間生汗不止[1]、用阿刀便無效、可以此鹻一厘之二十分之一、(0.003) 於汗前二句鐘、或射或服、常效、因能激虛弱汗腺、使之復原也、瘡症[2]初患時、有數著名醫者謂、每三句鐘射此鹻一厘之六分之一、(0.01) 至全身生汗爲止、後每四或六句鐘射一次、不但有醫症之能、並有防症之力、然射時必服酒或士的年、方免心經受阻之患、中耳久症而眩暈者[3]、最妙之醫法、以此鹻射於身之一處、每數日一次、必至口中多生涎沫、始能見效、射藥後、當令病者躺臥片時方可、頭禿者[4]、敷此藥則有生髮之能、但不可過多、恐髮囊之際、致生膿皰也、良方如左。

佇波蘭的流膏 ℞	Fluidextracti pilocarpi, U S. Extracti jaborandi liquidi, B. P.	一量兩	(30.0)
洋斑蝥酒	Tincturæ cantharidis	半量兩	(16.0)
鹼擦藥	Linimenti saponis	二量兩半	(45.0) 1-M.


每早晚敷無髮處、又有良方如左。

1 Profuse sweating
2 Erysipelas
3 Aural vertigo
4 Baldness

之能減其燒、因其大有阻力、故熱症不宜用、胸統膜炎[1]而有積液者、有醫者曾用此藥醫之、然不如用洋苦瓜汁、或鎂硫强礬、加水少許服之、更不如用胸針、放其所積之液、尤爲最妙之法、有二著名醫者云、以此藥之鹻、醫睭膜之患[2]、每日以一厘之十二分之一、至十分之一、(0.005-0.006) 用空針射於皮內甚效、服此藥之流膏亦可、但難免惡心之患、且因病者不宜受發表之力、故必用小分劑、如以鹻滴於目內、有縮瞳之功、故各類眼球發脹之患有效、醫者每以代厄司連之用、如用之縮瞳、可以披路加便一至四厘、(0.06-0.25) 加水一量兩、(30.0) 每句鐘滴一或二滴於眼內、至見效爲止、過用目力而作痛者、以此鹻一厘之十分之一、(0.006) 加水一量兩、(30.0) 滴於目內、日用三次、每次數滴有效、製此藥時、宜加硼强酸四厘、(0.25) 則免其生菌、菸酒之矇症[3]、用此鹻之小分劑有效、腸洄膜發炎、致患黃症者[4]、如每二日射此鹻一厘之六分之一、(0.01) 過二十日爲止、常效、腎炎致腦中毒者[5]、此鹻乃爲妙劑、患腎炎症者[6]服之、其效不一、一 令人生汗、則皮可代腎之功用、二 尿毒多藉汗而祛、三 因其有減血壓之力、故腎炎減輕、但宜謹慎用之、如心經虛弱、宜兼服酒與士的年、以免阻心之虞、多有醫者云、四旬以上者、若患腎炎、兼有心症、此藥忌用、腎球絡蟠久炎症、亦忌用、產痙瘋症、此藥爲常用之品、但其

1 Pleurisy
2 Opacities of the vitreous humor
3 Tobacco and alcoholic amblyopia
4 Jaundice
5 Uræmic poisoning
6 Bright's disease

第五十五圖



此圖表明用披路加便如何增血壓之力與用阿刀便如何增血壓之力

第一段係未射披路加便之先血壓之至數爲一百二十六

第二段係已射披路加便之後血壓之至數爲九十六

第三段仍射披路加便其至數減至七十

第四段係射阿刀便其至數增至一百四十五

祛尿脛基。

眼　此藥於睛簾內能激動眼系之末、故有縮瞳之力。

液　服此藥者、或生汗一量磅、先則含酸、後則如常、再後含鹼、且能激胃、口、目、皮、腎、使多生液、亦能激乳腺使多生乳。

療效　腎經之痳腫[1]、服此藥或其鹼有效、若心經之痳腫、因其阻力過大、故不甚妙、嘗有服之立即殞命者、瘴症[2]將發冷時、服

1 Dropsy
2 Malarial fever

第二十章　論發表藥類

乍波蘭的 PILOCARPUS, U. S. JABORANDI FOLIA, B. P.

此乃一類樹葉、產於南亞美利加、內含二鹼、一名披路加便、體質柔軟、製而成礬則結晶、一名伊搜披路加便。

體功效　健壯者服此藥之足分劑、面色發紅、後則生汗、不久全身淋漓不止、或口中涎液流溢於外、過二至五句鐘、其汗方止、且服此藥常令人惡心、有在汗時或汗後嘔吐甚重者、亦有不易受其發表之力者、有著名醫者云、或有孩童服此藥至六十釐、(4.0)其效始顯、亦有服過大之分劑、而無發表之效者。詳見服藥避忌篇

腦部　人服中分劑、與此部少有感能。

絡部　人服足分劑、有阻此部之力、若以中分劑灌於禽獸、其脉必遲、血壓必減、見第五十五圖　若人服之、其脉不遲而反速、或每分鐘多至四五十次、但其力微小耳。

胃經　此藥有惹胃之力、亦有時令人惡心、或甚重之嘔吐。

身熱度　此藥有減身熱之能、服之者、先或少增其熱度、後則大為減少、或因盤膛鬆大、而生汗過多之故。

腎經　此藥之大分劑、能令人生汗、而小便減少、小分劑、有激腎之功、故服之者、則多

大有利小便之能、不但在人如此、獸類亦然、歐美各國之醫者、亦多謂其有此能、但亦有用之而無效者、腎久炎症、服之亦少見效、因腎祛膚之功用已失大半、故此藥之功效不顯也、然服之亦無損傷、有醫者謂、各類㾓[1]症、無論由腎由心而致、服之俱效、雖小便不見通利、仍可服之、惟腎新炎者忌用、以此類症宜用平腎之藥、不可用惹腎之劑也、此藥所含之擅古律印無多、故必用一或二錢 (4.0-8.0) 之大分劑、分置於數藥殼內、日服一次、或以熱水送下亦可、因其味不美、究不若置於藥殼內爲妙、按此藥著書者雖嘗用之、而功效不顯、因爲醫家所重、故不得不論及之。

1 Dropsy

哥拜巴塊 Massa Copaibæ, U. S. 此藥乃鎂養與該藥調和、製之成塊、服時拈之成丸、然此法不爲甚妙。

洋斑蝥 CANTHARIS 詳見本篇

堪阿大麻 APOCYNUM, U. S. 此藥產於美國、由堪阿大至弗羅耳達皆有之、入藥者乃此麻之根、常有以他類之麻、誤認爲此麻者、醫者宜多留意、如用此麻無效、宜另購一鋪者可也、服此藥之過分劑、則有嘔瀉與育道受惹之患、惟尋常之分劑、則少顯乖效、如因心經或腎經有病以致⿸疒水患者[1]、服此藥之酒五至二十量滴、(0.3-1.3) 或流膏一至五量滴 (0.06-0.3) 有效、服後則小便必多、⿸疒水患卽退矣、因其奏效甚速、與用套針祛⿸疒水相似、故醫者以植物套針名之、有醫者查其體功效、於心經有何關係、則見脉力遲緩、血壓加增、故知其力與毛地黃相似。

代猶嚆忝 (SODIO-THEOBROMINE SALICYLATE, OR DIURETIN) 此藥乃以鈉柳强礬、與揸古律印、用化法製成、遇空氣卽改其體質、因其內含揸古律印、故有利小便之能、按揸古律印係結晶之鹻類、其味覺苦、其氣易散、體功效與加非印同、惟不易消化、必用化法使與鈉柳礬相合、變成易化之礬方可、西歷一千八百八十九年、有著名醫者、查明揸古律印、

1 Cardiac or renal dropsy

療效 此藥之大用、乃激陰陽尿徑之洇膜、白濁[1]之晚程、洇膜受阻、此藥有效、尿脘久炎[2]兼血虧而虛弱者、良方如左。

哥拜巴	℞-Oleoresinæ copaibæ	一量錢	(4.0)
畢澄茄脂桶	Oleoresinæ cubebæ	二十量滴	(1.3)
鐵錏檸礬	Ferri et ammonii citratis	二十英厘	(1.3) —M.

置於十藥壳內、日服三次、每餐後服一壳。

Pone in capsulas No.X. S.— One t. i. d. after meals.

延纏之氣脘炎[3]、服此藥有袪痰之效、腎總漏炎[4]、胱炎[5]、肛炎[6]等之中程、有效、如因腎久炎、以致痳腫[7]者、服之有激腎而利小便之功。

藥製與分劑

哥拜巴 Copaibæ, 五至二十量滴、(0.3-1.3) 置於藥壳內、或製成勻藥、服之俱可。

哥拜巴油 Oleum Copaibæ, 十至二十量滴、(0.6-1.3) 置於藥壳內、日服二至四次、滴於白糖上服之亦可。

1 Gonorrhœa
2 Chronic urethritis
3 Subacute bronchitis
4 Pyelitis
5 Cystitis
6 Dysentery
7 Dropsy

水 Aquæ 十量兩 (300.0) —M.

射時宜搖動其瓶、以免沉澱、有醫氣臌之效、且有利大便乾燥之功。

S.—To be injected as an enema for the relief of tympanites and to aid in the removal of hardened feces. Stir thoroughly before using.

又有射肛藥類、乃以阿魏勻藥六量兩、(180.0) 加松節油一至二量錢、(4.0-8.0) 調勻射之。

松節油擦藥 Linimentum Terebinthinæ, 節扭[1]與節腫[2]之患、常以此藥擦之、有外惹內效之功、患錢癬[3]者、以此藥敷之、有效。

松節油抹膏 (Unguentum Terebinthinæ) 此膏有外惹內效之功、並有激力。

松節油醋擦藥 Linimentum Terebinthinæ Aceticum, B. P.

哥拜巴 COPAIBA, 此藥乃一類樹之脂楠、產於巴西、色淺黃、似油、別具一種氣息、內含一油類、名哥拜巴油、Oleum Copaibæ, 其用無甚緊要。

祛 此藥由腎而祛、服時如以氰強酸試溺之法試之、則有含脂之勢、或亦有生團癜者、然止而不服、其患即瘉。

1 Sprains
2 Enlarged joints
3 Ringworm

松節油勻藥 Emulsum Olei Terebinthinæ, U. S. 半至二量錢、(2.0-8.0) 又有良方如左。

松節油	℞-Olei terebinthinæ	一量錢	(4.0)
洋苦杏仁油	Olei amygdal. expres.	半量兩	(16.0)
鴉片酒	Tinctura opii	二量錢	(8.0)
非菻漿	Mucil. acaciæ	五量錢	(20.0)
郁李桂水	Aquæ laurocerasi	半量兩	(16.0) —M.

每四句鐘宜服一量錢、(4.0) 腸熱症之氣臌者、忌用。

S.— A teaspoonful every four hours for tympanites.

射肛藥類、良方如左。

松節油	℞-Olei terebinthinæ	一量兩	(30.0)
洋橄欖油	Olei olivæ	一量兩半	(45.0)
樟腦	Camphoræ	二十英厘	(1.3)
非菻漿	Mucil. acaciæ	半量兩	(16.0)

乾、當熱時敷之、至病者不能忍受、則即揭去、恐有生皰之患也、成人或孩童之氣脘炎[1]、以此油與洋橄欖油等分、或以此油一分、加洋橄欖油二分半、搓其胸前有效、低熱症[2]、服之可爲激力之藥、如病者有腸胃氣脹[3]或腸瘍[4]等患、其效尤妙、腸熱症[5]之氣臌、最妙之法、乃服此油、或熱袱敷於腹上、或用之製成射肛藥射之、俱效、腸熱症者、至第十四五日、其舌紅而乾、甚至破裂、且牙滿穢物、並有氣臌者、以此油製成勻藥、日服三次、每服五至十量滴、(0.3-0.6) 有效、腸熱症至漸愈時、因腸集瘢未愈、致常有反復、與瀉腹之患、此爲最妙之劑、便血[6]、溺血[7]、經旺[8]等患、此油常效、患帶虫[9]（俗名寸白虫）者、如以此油半至一量兩、(15.0-30.0) 與蓖麻油一量兩 (30.0) 兼服有效、然不爲無險、因其大有惹腎之力也、腎久炎[10]之晚程、有時須用利小便藥之大有力者、否則必致尿閉、服此油或效、若腎炎之初程、則不宜用、恐有尿閉之處、正與腎久炎之晚程相反也、育道新炎、亦不宜用、腰痺[11]或言服二量滴 (0.12) 有效、氣脘久炎[12]、以此油置於滾水內吸之有效、白濁久症[13]、與瘀斑重症[14]、服之皆效、腸胃氣脹症、可以此油五量滴、(0.3) 滴於白糖上服之、或製成勻藥類服之亦可。

藥製與分劑

1 Bronchitis
2 Exhausting fevers
3 Flatulence
4 Ulceration of the bowel
5 Typhoid fever
6 Intestinal hemorrhage
7 Hæmaturia
8 Menorrhagia
9 Tape-worm
10 Chronic Bright's disease
11 Lumbago
12 Bronchitis
13 Gleet
14 Purpura hæmorrhagica

療效　此藥有激泗膜復原之功、故醫者常用之以醫白濁久症[1]、胱久炎症[2]、有補其泗膜之效、氣管炎症[3]久不見愈、且痰凝結、不易吐出者、服之有效、有醫者云、氣管泗膜炎之哮症[4]、服之最妙、痒症後而嗽不止者[5]、亦效、分劑五至二十量滴(0.3-1.3)宜置於藥殼內服之、常用之分劑、乃五量滴、(0.3)或有惹胃之力、但較哥拜把畢澄茄之惹力爲小。

松節油 OLEUM TEREBINTHINÆ, 堪阿大脂欄 TEREBINTHINA CANIDENSIS,

此油乃由松樹而得、入藥者係蒸過二次、名煉松節油。Oleum Terebinthinæ Rectificatum, U. S. 別具一種氣息、淸而無色、最易燃燒、故宜遠避燈火、如加於濃硫酸類之內、必致燃著、若敷於皮或泗膜上、則有惹力。

體功效　服此藥者、胃與皮膚覺煖、脉與呼吸畧速、過分劑、或有醉人之力、畧有增血壓之能、其脉亦速、服過大之分劑、先則覺系受阻、後則動系亦然、因其由肺腎而袪、故服之者尿內必含香味、毒分劑令人有尿血、腎炎、瞳散、皮紫、育道發炎等患、有此藥癖忌者、無論服敷、或有瘕瘢皰瘡等患。

療效　如某處自內有發炎[6]之狀、以熱袱敷之、有外惹內效之功、製熱袱之法、以藥置於盃內、置盃於熱水內、蓋恐其近火燃著也、先以絨布蘸於熱水內擰乾、再蘸於藥內擰

1 Chronic Gonorrhœa
2 Chronic Cystitis
3 Bronchitis
4 Asthma
5 Excessive cough
6 Inflammation

杜松雜浮酒 Spiritus Juniperi Compositus, U. S.　一至四量錢、(4.0-16.0) 此以杜松大茴、小茴等藥之油、並醇酒、與水等製成。

荷蘭酒 (Gin)　詳見醇酒篇。

杜松冲藥 (Infusum Juniperi)　以杜松子一兩、(30.0) 加滾水一量磅、(480.0) 置於煖處、一句鐘之久、一日均服、若醫痰腫[1]症、宜加鉀醋礬、或鉀氰菓礬一兩、(30.0)

杜松浮酒 Spiritus Juniperi,　半至一量錢 (2.0-4.0)

杜松油 Oleum Juniperi,　半至三量滴 (0.03-0.2)

以利準油

OLEUM ERIGERONTIS, U. S.　此藥係黃色之油、其氣易散、由堪阿大一類草、蒸之而得、嘗之似松節油、醫微流血症[2]、服之最妙、鼻衄[3]、或他等輕流血之患、亦效、白濁[4]之晚程、此藥可代哥拜把、或畢澄茄之用。

服法　滴於白糖上、或置於藥殼內、飯後服之最妙、分劑十至三十量滴。(0.6-2.0)

檀香油

OLEUM SANTALI　此油乃由印度一種樹而得、味辣、氣香、有用為香料者、若服過分劑、陰陽尿徑甚受其惹。

1 Dropsy
2 Uterine oozing
3 Epistaxis
4 Gonorrhœa

服之有效、且有補胃之功、痳腫症[1]、如胃失功用而厭食者、醫者常以此藥治之、亦畧有改症之效、故素有癧症而患皮瘍者[2]、或謂服之有效。

藥製與分劑

愛冬冲藥 (Decoctum Chimaphilæ,) 一至三量兩 (30.0-90.0)

愛冬流膏 Fluidextractum Chimaphilæ, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0)

杜松 JUNIPERUS, U. S. 此乃一類松子、產於歐美二洲、北方寒冷之地、內含一氣易散之油、名杜松油、Oleum Juniperi, U. S. Juniperi Oleum, B. P. 亦含一無定形之晶、名杜松精。

體功效 此藥有激胃補胃之功、如與酒同服、畧有發表之力、且頗有利小便之能、由腎而祛。

療效 陰陽尿徑之洄膜被阻、如腎總漏炎[3]、腎炎[4]、胱炎[5]等久症服此藥有效、腎經積血[6]、如因絡部虛弱而致、非因腎新炎所起者、服之有效、腎新炎症方愈而小便未利者、服之亦效、若仍有發炎之勢、則無益而有損、紅熱症之晚程、其可服與否、與上腎新炎症同、年邁者、腎經畧失功用、致覺腰痛、服之神效。

藥製與分劑

1 Dropsy
2 Ulcers of the skin due to struma
3 Chronic pyelitis
4 Chronic nephritis
5 Chronic catarrh of the bladder
6 Congestion of the kidneys

藥製與分劑

沛利拉冲藥 (Infusum Pareiræ,) 一量兩 (30.0)

沛利拉流膏 Fluidextractum Pareiræ, U. S. Extractum Pareiræ Liquidum, B. P. 一量錢 (4.0) 日服三次。

烏伐 UVA URSI, U. S. UVÆ URSI FOLIA, B. P.

此乃一類長春樹葉、產於歐美北方寒冷之地、內含一精、名阿布田。

療效 此藥於陰陽尿經有改症之能、且畧有利小便之功、常以之醫腎總漏炎[1]、膀炎[2]、久白濁[3]等症、此藥由腎而祛、服過分劑者、尿必變黑。

藥製與分劑

阿布田 (Arbutin) 三至五厘 (0.2-0.3)

烏伐膏 (Extractum Uvæ Ursi,) 一至四厘 (0.06-0.25)

烏伐流膏 Fluidextractum Uvæ Ursi, U. S. 二至四量錢 (8.0-16.0) 日服三次。

烏伐冲藥 Infusum Uvæ Ursi, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

愛冬葉 CHIMAPHILA, U. S.

此乃一類長春樹葉、產於亞美利加歐羅巴亞西亞等處。

療效 此藥能激腎經而利小便、並能使陰陽尿經之泗膜復原、腎經虛弱而失功用者[4]、

1 Pyelitis
2 Cystitis
3 Chronic gonorrhœa
4 Atonic renal conditions

毛地黃酒 Tincturæ digitalis 三十量滴 (2.0)

布球冲藥 Infusi buchu 加至八量兩 (240.0) —M.

相合置於瓶內、日服三次、每服一量兩、(30.0) 未服之先、宜搖撼其瓶、以免藥力沉澱。S.—Two tablespoonfuls three times a day. Shake the bottle before using.

若小便過酸、且渾而不清、多含雜礬、致胱受惹而遺尿者、如以布球流膏、與燄氰弱浮酒各一量錢、(4.0) 鈥醋礬二十厘 (1.3) 同服、日服三次、大效、胱新炎症忌用。

藥製與分劑

布球流膏 Fluidextractum Buchu, U. S. 一量錢、(4.0) 日服三次、宜多以水送下、孩童十至三十量滴、(0.6-2.0)

布球冲藥、 Infusum Buchu, B. P. 一至四量兩、 (30.0-120.0)

布球酒 Tinctura Buchu, B. P. 一至二量錢、 (4.0-8.0)

沛利拉 PAREIRA, U. S. PAREIRÆ RADIX, B. P.

此乃一類草根、產於皮路巴西等處、能醫陰陽尿徑久炎症、即腎總漏炎[1]、胱炎[2]等類。

1 Pyelitis
2 Cystitis

氣盐醫之腎久炎者[1]、以鋏乳礬醫之常效、尿脜者[2]、此礬不增其尿、只減其中所含之脜、故腎炎致腦中毒者、或腎新炎而大作燒者、俱不宜用、如因癲或痺等症、以致腎久炎者、此礬甚效、但服時尿脜即止、不服則仍反復、是此礬與該症無甚功效矣、乃有謂其效甚妙者、殊不可解也、分劑每日六十至一百厘、(4.0-6.6) 鋏柳礬、較鈉柳礬易服、且其惹胃之力、較柳酸或他柳礬爲小、故此礬爲緊要之劑、痺症[3]、如服他類柳礬而不受、服此柳礬、亦有不能受者、但宜置於藥壳內服後必多飲水或牛乳方可、分劑與鈉柳礬同、且無毒力、雖服過分劑、亦無乖效、然鋏若不純、微含鋇質、則有毒力矣。

布球 BUCHU, U. S. BUCHU FOLIA, B. P.

此藥乃一類草葉、產於亞非利加洲、內含一油、其氣易散、功效多在此油。

療效 此藥無增尿之功、而有激尿徑泗膜之力、故醫陰陽尿徑泗膜之久炎症、乃其大用、腎總漏炎[4]、脁炎[5]、脁惹[6]等久症、常以此藥醫之、良方如左。

鋏檸礬	℞-Potassii citratis	四英錢	(16.0)
哥羅芳浮酒	Spt. chloroformi	三量錢	(12.0)

1 Chronic Bright's disease.
2 Albuminuria.
3 Rheumatism.
4 Pyelitis.
5 Cystitis.
6 Vesical irritation.

醫者云此藥無效、亦有云服足分劑、或有微顫、虛幻、陣抽等患。

烏羅透品 HEXAMETHYLENAMINA, U. S. (UROTROPIN) 此藥乃以錏沘、與裌毛地海、相合製成結晶、無色、無味、以試紙試之、則有鹼效、七十二度熱水一分半、可化藥一分、[1]小便含鹼過多、並多含[2]硃礬等類、與[3]無形之尿礬、且含[4]膿者、或小便含[5]錏晶而胱受惹者、服之俱效、[6]腸熱症服之可滅尿中之穫、且有免食物釀壞之功、滅尿中之穫、其益有二、一免胱受累、二免染他人、分劑五至十釐、(0.3-0.6) 以水八量兩 (240.0) 化開、日服二或三次、有醫者謂、久服足分劑、每有尿血或尿閉之患、近之醫者謂、服此藥之大分劑、有由膽液而祛者、亦有由膽囊而祛者、故患腸熱症者、服之可免膽囊發炎之患、有醫者謂、人服此藥越一句鐘、即運至顱腦脊腦之液中、故顱腦脊腦受傷者、服之可防瘴毒、分劑五至三十釐。(0.3-2.0)

鋉 (STRONTIUM,) 此係金類原質、不入藥用、入藥者、乃其塩礬數類、即鋉氯塩、Strontii Bromidum, U. S. 鋉碘塩、Strontii Iodidum, U. S. 鋉柳礬、Strontii Salicylas, U. S. 鋉乳礬、鋉硫礬等是也、鋉氯塩之用、與鋏氯塩同、有醫者云、鋉有育身之功、故此塩較鋏氯塩尤妙、其分劑三十至六十釐、(2.0-4.0) [7]胃存酸液、兼疼痛而失功用者、有著名醫者、曾以鋉

1 Alkaline urine
2 Phosphates
3 Amorphous urates,
4 Purulent urine,
5 Ammoniacal crystals
6 Typhoid fever,
7 Gastric acidity,

純錳安息礬九十八分、其利小便之功、乃在所含之安息香酸也、患胱炎者[1]、如小便多含硫礬類、服之乃為上品、因藥中含有安息香酸與錳質、被祛時、安息香酸變成馬溺酸、錳質變成氰強酸、病者小便中既大有酸力、則所含之硫礬類自化、而功效大顯矣、肌痺症[2]、有時服此藥亦效、分劑十至三十厘、(0.6-2.0) 置於水或藥殼內服之。

派怕拉辛 (PIPERAZINA) 此乃化學中新入藥者、其大用乃醫易犯之尿酸症、如置於過空氣處、則水氣與碳氰強洽俱被攝入、故宜貯於瓶內、嚴密塞之方可、若製成消水、嘗之無味、以試紙試之、大有鹼效、此藥化尿酸之能、較鋰碳強礬多至十二倍、但鋰碳強礬、水不能化、此藥水易化之、服之者、其體質有在身內被氰改變者、亦有祛身時而不變者、醫者以為在人身內、與尿酸成一易化之新礬、由腎而祛、故小便中多含尿腥基、而尿酸減少、此乃有功效之証據也。

療效 易犯尿酸者[3]、服之可免腎石胱石之患、如病者小便多含尿酸、致胱被惹、服之有效、胱被惹[4]之患、有醫者以此藥一分、加水百分、射於胱內有效、其分劑日服十五厘、(1.0) 服法、乃將以上之分劑、加水一量磅 (480.0) 一日勻開服之最妙、因空氣能改其體質、故不宜以紙包之、亦不宜製丸服之、惟製成消水、即於一日內服訖方可、有著名

1 Catarrh of the bladder
2 Muscular rheumatism
3 Uric-acid diathesis
4 Irritation of the bladder

鋰檸礬之製法、以熱蒸水一量兩、(30.0) 先加結晶之檸酸九十厘、(6.0) 再加鋰碳强礬五十厘、(3.3) 以火熱之、或滾水燉之、藥必自沸、至沸止爲度、有醫者謂糖尿症[1]、如因癪症而致、以鋰碳强礬、或鋰檸礬十厘、(0.6) 與鈉砒弱礬一厘之三十分之一 (0.002) 同服、日服三次、乃爲妙劑、但服鋰檸礬、偶有惹胃而嘔吐者。

鈉檸礬 SODII CITRAS, U. S. 此藥可代鉀檸礬之用、但其力較小、必食牛乳之嬰孩[2]、如將牛乳一量兩、(30.0) 加此藥一厘、(0.06) 可免胃中結成硬塊、不易消化、且乳中不必多加水也、嬰孩用此藥、可防癧症[3]、成人之胃瘍[4]、胃炎、或腸熱[5]等症、食牛乳不易消化、亦可加此藥於其內、分劑十至二十厘、(0.6-1.3)

錏醋礬 (AMMONII ACETAS) 此礬之入藥者、爲製錏醋礬消水 Liquor Ammonii Acetatis, 之用、此消水有敀酸之能、且畧有發表之力、但其力較燐氰弱礬雜浮酒爲小、分劑一至二量錢、(4.0-8.0)

錏安息礬 AMMONII BENZOAS, 此礬乃用化法而得、色白、結晶、形如鱗片、臭之無味、或畧有安息香酸之味、嘗之先似鎂硫强礬類、後則畧辣、水十分、或醇酒二十五分、能化藥一分、如置於過空氣處、錏質漸失、必貯於瓶內、嚴密塞之方可、按此藥每百分內、宜含

1 Diabetes Mellitus
2 Bottle fedbabies.
3 Infantile scurvy
4 Gastric ulcer
5 Typhoid fever

肛被惹者、可以此消水與轆水各半射之、因轆水亦有平肛之功也、痔[1]症、亦可以此法醫之、若加鴉片酒數滴尤妙。

鉀氯强礬餅 Trochisci Potassii Chloratis, 分劑一至六餅、每餅內有此礬五厘、(0.3) 但宜噙於口內、以醫口涸膜炎症、如多用之、恐胃受惹、以其易於下咽也。

鋰 (LITHIUM) 此係金類原質、不入藥用、入藥者乃所製之礬、此礬分二類、第一類之功用、乃在本原質、第二類之功用、乃在成此礬之酸。

第一類

鋰碳强礬 Lithii Carbonas, 分劑二至十厘 (0.12-0.6)

鋰檸礬 Lithii Citras, 分劑五至二十厘 (0.3-1.3)

沸鋰檸礬 Lithii Citras Effervescens, 分劑一至四錢 (4.0-16.0)

第二類

鋰安息礬 Lithii Benzoas, U. S. 分劑五至三十厘 (0.3-2.0)

鋰氣盐 Lithii Bromidum, U. S. 分劑十至四十厘 (0.6-2.5)

鋰柳礬 Lithii Salicylas, U. S. 分劑十至三十厘 (0.6-2.0)

1 Hemorrhoids

此礬被祛、多由涎液、少由腎經、故患口白瘍者服之、口內之洄膜、常受其感、倘病者之胃或腎、有被惹之患、則不宜服、只以筆蘸其消水、敷之可也、有醫者以之醫癆症、但甚危險、蓋患癆症而殞命者、多因腎經發炎之故、如服此藥、非但無益、反增腎經之患、故醫此症、宜製成消水、用筆蘸敷、庶免意外之虞、喉微欄新炎[1]、若製成漱藥漱之、有效良方如左。

鉀氯强礬	R-Potassii chloratis	一英錢	(4.0)
陽葛流膏	Fluidextracti rhois glabræ	半量兩	(16.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	加至三量兩	(90.0) —M.

置於瓶內、加水等分、每二句鐘漱喉一次、漱時必搖動其瓶、方免沉澱之虞。

S.—To be added to an equal quantity of water in a glass and used as a gargle every two hours, after stirring.

肛洄膜新炎[2]、兼有瀉洄液[3]並肛急[4]之患者、可以此礬製成消水、每二十厘 (1.3) 加水一量兩 (30.0) 以四量兩 (120.0) 射於肛內、使存二十分鐘之久、射一二次、病者或可痊癒、

1 Acute follicular pharyngitis
2 Acute rectal catarrh
3 Mucous diarrhœa
4 Tenesmus

鉀氯強礬 POTASSII CHLORAS,

此礬與他鉀礬迥異、其毒力惟小於鉀藍洽、如敷於酒膜、則有惹力服過分劑、血則大受其毒、腎經且有發炎之患、與植礬類同置於臼內研之、則有崩炸之險。

體功效 嘗有醫者以此礬醫痰氣之患、如人患肺炎重症、乃因其肺經積痰過多、所入之空氣過少也、以此礬醫之者、以為於身內能發氯氣、而補助肺經、然決無此理、若欲令此礬發氯、必置於火上熱之方可、而身之熱度、決不足以至此、此礬被祛時、體質不盡改變、服過分劑者、則有惡心、頭痛、腹痛、腰痛、氣促、皮紫、心失功用、全身無力等患、毒分劑、血變絳紫、似寇寇之色然。

療效 口白瘍[1]或中汞毒而涎盛者[2]、服此礬、或用以漱口俱效、良方如左。

鉀氯強礬	℞-Potassii chlorat.	四十八英厘	(3.2)
沒藥酒	Tincturæ myrrhæ	三十量滴	(2.0)
黃辛寇那香酒	Elixir calisayæ	加至三量兩	(90.0) —M.

每五句鐘服一小匙、(4.0) 或用以漱口亦可。

S.—Teaspoonful every five hours, or use as a mouth wash.

1 Stomatitis
2 Mercurial salvation

易化之、昔常以此醫新痺[1]症、今多以柳礬代之、如醫痺症、每日宜服半至一兩、(15.0-30.0)延纏之痺症[2]、以此礬三十厘、(2.0) 鉀氫塩十厘、(0.6) 日服三次或效、肝失功用[3]、如服此礬則多生膽液、且有利小便之功、易犯尿酸者[4]、服之可去其酸、分劑二十厘至二兩、(1.3-60.0) 服至二兩、則有瀉效、但不如他瀉劑之妙。

鉀氫菓礬 POTASSII BITARTRAS, U. S. POTASSII TARTRAS ACIDUS, B. P.

此礬色白、多係細粉、或謂其於腹內不改體質。

療效　鉀礬之中、惟此礬最利小便、腎久炎[5]致成痳腫[6]者、與荷蘭酒、或杜松子冲藥同服、有效、此礬一兩、(30.0) 杜松子冲藥一量磅、(480.0) 足爲二十四句鐘之用、但宜均開服之、腎新炎[7]者、宜專用此礬、忌用杜松子冲藥、以其惹力過大也、按此藥有令人瀉水之功、分劑半兩、(15.0) 但不常用、尿少而含鹼[8]者、服三十厘、(2.0) 尿即如常。

鉀硝強礬 POTASSII NITRAS,

此礬結晶似針、無色、嘗之大有塩味、服過分劑則中毒、且有育道發炎之患、今不常用、多以鈉植礬代之、以其少有毒力也、痺症[9]以此礬二十分、蒸水八十分、以無礬紙蘸之、作成紙捲、燃而吸之、此乃妙法、或燃此紙於盤內、吸其烟亦可、如氣脂酒膜有被惹之患、可以此紙蘸以上之消水、後則再蘸安息香雜酒、乾時吸之、可免此患、倘多製此紙、必置於嚴密之玻璃瓶內、否則失其功用。

1 Rheumatism
2 Subacute rheumatism
3 Hepatic torpor
4 Uric acid diathesis
5 Chronic nephritis
6 Dropsy
7 Acute renal disease
8 Urine scant and alkaline
9 Asthma

(960.0)化開、分數次服之、如尿中無胉、其效尤妙、若置此糖於牛乳內、使孩童食之、則尿較常必多。

鉀碳強礬 POTASSII CARBONAS, 此藥味惡、服之者少、常用者、乃以化法製成他藥也。

鉀輕碳強礬 POTASSII BICARBONAS, 此藥之用、與鉀醋鉀檸等礬同、其味較二礬尤惡、故不常用、分劑五至四十厘、(0.3-2.6) 鉀檸消水、乃以此礬一百二十厘、(8.0) 檸酸九十厘、(6.0) 水十量兩、(300.0) 製成。

鉀沘消水 LIQUOR POTASSII HYDROXIDI, U. S. LIQUOR POTASSÆ, B. P. 此消水內含鉀沘百分之五、清而無色、嗅之無味、嘗之則澁、以試紙試之、大有鹼效、常用之爲改酸藥、如病者之尿過酸[1]、服之有效、分劑五至三十量滴、(0.3-2.0) 多以水送下、趾甲入肉[2]、以此消水敷於甲上、使甲變輭、則易塞棉於其下、亦易以刀剔之。

鉀檸礬 POTASSII CITRAS, 此礬色白、結晶、形如砂粒、易攝水氣、以試紙試之、其色不變、鉀礬中、惟此礬味佳、水易化之、氣脘新炎[3]、與衣必格同服、乃爲上品、尿少而過酸者、服之有利小便[4]之功、若孩童因尿酸過多、以致遺尿[5]者、服之有效、分劑二十厘、(1.3)

鉀醋礬 POTASSII ACETAS, 此礬色白、易攝水氣、以試紙試之、其色不變、嘗之署有鹽味、水

1 Acidity of the urine
2 Ingrowing toe-nail
3 Bronchitis
4 Diuretic
5 Incontinence of urine

發炎、育道發炎等患、過十至二十句鐘、每致殞命。

金雀花 SCOPARIUS, U. S. SCOPARII CACUMINA, B. P. 詳見本篇

錸氯弱鹽 HYDRARGYRI CHLORIDUM MITE, U. S. HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM, B. P. 詳見本篇

淡氣弱浮酒 SPIRITUS ÆTHERIS, NITROSI. 詳見本篇

毛地黃 DIGITALIS, U. S. DIGITALIS FOLIA, B. P. 詳見本篇

乍波蘭的 PILOCARPUS, U. S. JABORANDI FOLIA, B. P. 詳見本篇

康畀箭毒 STROPHANTHUS, U. S. STROPHANTHI SEMINA, B. P. 詳見本篇

加非印 CAFFEINA 詳見本篇

乳糖 SACCHARUM LACTIS, 此糖乃用化法由牛乳而得、其味不及蔗糖之甘、如置於嬰孩所食之牛乳內、較白糖尤妙、因其不易變釀、且育道消化、較易於白糖也、乳糖散類、乃以此糖製成、蓋因其粒堅而且小、與他藥研成細末、日久不致成塊、入服錸氯弱鹽或獨脚蓮橘、因其分劑微小、常以此糖置於其內、襯大其分劑、可以盡服無遺也、近數年有醫者查明、此糖之足分劑、大有利小便之功、其感只行於腎內、無激阻他經之患、腎經被阻[1]、或由腎病而致痳腫者[2]、用此糖大效、分劑每日以二至四錢、(8.0-16.0) 加水一二磅

1 Renal inactivity
2 Renal dropsy

海葱醋 Acetum Scillæ, 十至三十量滴 (0.6-2.0)

海葱雜糖漿 (Syrupus Scillæ Compositus,) 二十量滴 (1.3) 爲成人平肺之劑、一量錢 (4.0) 爲孩童嘔吐之劑、此漿內有海葱流膏、辛伊加流膏、銨鍊菓礬、燦銕砂强礬、糖水等類、一至五歲之孩童氣脘發炎、如至中程時、良方如左。

衣必格葡酒	℞-Vini ipecacuanhæ	一量錢 (4.0)
海葱酒	Tincturæ scillæ	二量錢 (8.0)
透路脂楠糖漿	Syrupi tolutani	五量錢 (20.0)
水	Aquæ	一量兩 (30.0) —M.

每三四句鐘服一量錢。 S.—Teaspoonful every three or four hours.

海葱糖漿 Syrupus Scillæ, 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

海葱醋蜜 Oxymel Scillæ, B. P. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

海葱雜丸 Pilula Scillæ Composita, B. P. 五至十厘 (0.3-0.6)

毒力 服毒分劑者、先則嘔瀉、後則昏迷、兼有間癱之患、再後瘈瘲、或有尿血、尿閉、腎經

第十九章 論利小便藥類

海葱 SCILLA, 此藥乃一類植物、狀似葱頭、產於歐洲附近地中海之處、故名之曰海葱。

療效 如因心病、以致腎久炎[1]、或腎經被阻者、此藥可作利小便之劑、如因心病以致痰[2]腫、與毛地黃同服、乃爲常用之劑、心統膜胸統膜或腹統膜有積液之患[3]、此藥有效、醫痰腫[4]之良方如左。

海葱散	R-Pulveris scillæ	十英厘	(0.6)
毛地黃葉散	Pulveris digitalis foliorum	二十英厘	(1.3) —M

製成十丸、日服三次、每次一丸。 Fiant pilulæ No. X. S.—One t. i. d. after meals.

氣管發炎[5]、多有醫者、以此藥醫之、然此法不可泥爲常理、因其有惹胃腎之力也、倘胃腎失其功用、則不宜服。

藥製與分劑

海葱流膏	Fluidextractum Scillæ, U. S.	一至五量滴	(0.06-0.3)
海葱酒	Tinctura Scillæ,	五至三十量滴	(0.3-2.0)

1 Chronic Bright's disease.
2 Dropsy
3 Effusions in the pericardium, pleura or abdomen
4 Dropsy
5 Bronchitis

量滴、(0.06)加洋橄欖油少許、置於舌上、或製成勻藥類、或成丸服之俱可、腸胃被惹者忌用、系幹[1]痛、或氣管炎[2]等症、加洋橄欖油等分、敷於患處、有外惹內效之功、倘藥被嗽、必致有瀉腹之虞、服此藥過度者、則以醫育道發炎之藥治之。

巴豆油擦藥 Linimentum Crotonis, B. P.　筋扭、或肌痺等症、擦之有效。

栝樓 BRYONIA

此藥係一類之草、產於歐洲、入藥者乃其根。

體功效　服此藥之過分劑、則大見水瀉、育道受惹、服毒分劑、則有惹潤膜之力、亦有時腦衣顯發炎之狀、服中分劑、面貌或署顯紅色、並有頭痛之患。

療效　此藥有激腸胃液腺之力、故腸胃署失功用、以致食滯[3]者、服之有效、孩童大便乾燥[4]者、如因腸液缺少所致、此藥為上品、孩童大便乾燥色白而硬者、服之有效、但以栝樓酒為合宜、分劑十至三十量滴、(0.6-2.0)有醫者云、痺症、胸統膜炎、此藥大有醫之之功、然用之者少、以其無醫此類症之確據也。

藥製與分劑

栝樓酒 Tinctura Bryoniae　一至二量錢、(4.0-8.0)為輕瀉之劑、五至四十量滴、(0.3-2.6)為醫食滯之劑、病重者酌增。

---

1 Sensitive nerve
2 Bronchitis
3 Dyspepsia
4 Constipation

血或積液等、此藥有袪之之效、服過分劑之形狀、與育道發炎者同、醫之亦同。

藥製與分劑

洋苦瓜汁 Elaterium, B. P. 一厘之六分之一、(0.01) 成丸服之、久存者不宜用。

洋苦瓜汁精 Elaterinum, 一厘之二十分之一、至十分之一、(0.003-0.006) 服法、以洋苦瓜汁精四英厘、(0.25) 加醇酒四量兩、(120.0) 置於火上溫之、至化開爲止、日服半小匙、(2.0) 即爲足分劑。

洋苦瓜汁精乳糖散 Trituratio Elaterini, U. S. 半至一厘 (0.03-0.06) 此以洋苦瓜汁精一分、乳糖九分製成。

洋苦瓜汁精雜散 Pulvis Elaterini Compositus, B. P. 一至五厘 (0.06-0.3) 此以洋苦瓜汁精一分、乳糖三十分製成。

巴豆油 OLEUM TIGLII, U. S. OLEUM CROTONIS, B. P. 此藥乃由一類樹子取出之油、產於印度中國等處、其色淡黃、敷於皮上、有生皰之力、如以此油一量滴、(0.06) 與洋橄欖油五量滴、(0.3) 置於舌上、過一句鐘、大有瀉水之效、顱腦積血、如不省人事、服之最妙、因其分劑無多、功效甚速也、昏譫者亦可用之、顛狂者、兼有顱腦積血、及大便乾燥等患、此爲最妙之劑、分劑一

1 Cerebral effusion
2 Cerebral congestion
3 Delirium

吐、服此藥之小分劑有效、若因胃被惹或發炎所致忌用。

藥製與分劑

獨脚蓮膏 (Extractum Podophylli) 一至五厘 (0.06-0.3)

獨脚蓮流膏 Fluidextractum Podophylli, U. S. 一至二十量滴 (0.12-1.3)

獨脚蓮脂 Resina Podophylli. U. S. Podophylli Resina, B. P. 一厘之二十分之一、至十分之一、(0.003-0.006) 為輕瀉之劑、一厘之十分之一、至二分之一、(0.006-0.03) 為重瀉之劑、

獨脚蓮酒 Tinctura Podophylli, B. P. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

洋苦瓜汁 ELATERIUM, B. P.

此藥乃洋苦瓜汁所沉澱者、形如鱗片、色灰而綠、嘗之味苦、雖為常用之藥、但不入美揀藥册、入之者惟洋苦瓜汁精。

體功效　此藥甚有惹洄膜之力、製藥者之手、亦多被惹、服之大有瀉水之功、獸類則否、其故尚未能知。

療效　此藥為最妙瀉水之劑、如不多服、則少有痱患、故心統膜胸統膜[1]發炎等症、有積液[2]之患者、此為祛液之妙劑、痳腫[3]、腹腫[4]等症亦效、虛弱者不宜服、常人服此藥、瀉後如飲酒少許、可補其力、腎炎腦中毒[5]、兼有痳腫者、此藥能由大便祛毒、服之有效、顱腦積[6]

1 Pericarditis and pleurisy
2 Effusions
3 Dropsy
4 Ascites
5 Uræmia
6 Cerebral congestion

療效　此藥於揀藥冊中爲最緩之瀉劑、小分劑、有輕瀉之效、足分劑、有重瀉之功、過分劑、或有育道發炎之患、且有感肝祛膽之能、大便淡黃者服錄氯弱塩最妙、色黑者、此藥最妙、胃不消化[1]、腸脹並大便不通[2]等症、良方如左。

獨脚蓮樜	B-Podophyllin.	五英厘	(0.3)
洋杜仲樜	Euonymin.	五英厘	(0.3)
利炭大樜	Leptandrin.	五英厘	(0.3)
印度龍膽草膏	Ext. chiratæ	四十五英厘	(3.0)
幾阿蘇	Creosotæ	十量滴	(0.6) —M.

製作二十丸、酌病服之。 Fiant pilulæ No. XX.

一二月之嬰孩、若大便甚燥[3]、以獨脚蓮樜一厘、(0.06) 加醇酒一量錢、(4.0) 日服一或二次、每次以二量滴、(0.12) 加白糖服之有效、孩童暑瀉症[4]、如所瀉者似水、並有霉氣之味、用他藥無效者、以此藥一厘之六十分之一、至五十分之一、(0.001-0.0012) 每數句鐘服一次、常效、成人之久瀉症[5]、如上服之亦效、然必增其分劑方可、如因肝胃被阻、致患嘔[6]

1 Indigestion
2 Intestinal flatulence with constipation
3 Hard stony stools
4 Summer diarrhœa
5 Chronic diarrhœa
6 Vomiting

B.P. 內有哥羅新、阿羅、士金無年、鋏硫强礬、丁香油等藥、分劑五至十厘、(0.3-0.6) 二哥羅新鬧羊花丸、Pilula Colocynthidis et Hyoscyami, B. P 分劑五至十厘、(0.3-0.6)

士金無年 SCAMMONIUM, U. S. SCAMMONIÆ RADIX, B. P. 此乃一類蔓草、入藥者乃草根之泗楠、產於小亞西亞敘利亞等處、頗有瀉水之力、並祛膽之效。

療效 此藥大有惹力、服之常有痔患育道發炎者忌服、倘服過分劑而腸受惹者、宜以平育道之藥醫之。

藥製與分劑

士金無年 Scammoniæ Radix, B. P. 二至五厘 (0.12-0.3) 常與哥羅新、或他類瀉劑同服。

士金無年楠 Resina Scammonii. U. S, Scammoniæ Resinæ. B. P. 三至八厘 (0.2-0.5)

士金無年雜丸 Pilula Scammonii Composita, B. P. 五厘 (0.3)

士金無年雜散 Pulvis Scammonii Compositus, B. P. 十至二十厘 (0.6-1.3)

獨脚蓮 PODOPHYLLUM, U. S. PODOPHYLLI RHIZOMA, B. P. 此乃一類之草、入藥者乃其根、內含一楠、產於美國堪阿大等處。

(500.0) 士金無年楠、(140.0) 豆蔻、(60.0) 鹼、(140.0) 製成、重瀉之分劑、五至二十厘、(0.3-1.3) 輕瀉之分劑、一至三厘、(0.06-0.2)

哥羅新膏 Extractum Colocynthidis U. S. 分劑二至五厘、(0.12-0.3) 與他瀉藥同服、其良方如左。

哥羅新膏	℞-Extracti colocynth.	三十英厘	(2.0)
顛茄膏	Extracti belladonnæ	二英厘	(0.12)
馬前子膏	Extracti nucis vomicæ	二英厘	(0.12) —M.

製成十丸、每早服一丸。Fiant pilulæ No. X. S.—One each morning.

雜瀉丸 Pilulæ Catharticæ Compositæ, U. S. 每丸內有哥羅新雜膏一厘零三分之一、(0.08) 渣笠楠一厘之三分之一、(0.02) 銾氯弱盌一厘、(0.06) 籐黃一厘之四分之一、(0.015) 大便乾結久症、不可逐日服之、恐使其症加重也、美揀藥冊有植瀉丸、Pilulæ Catharticæ Vegetabiles, U. S. 內有哥羅新雜膏、鬧羊花膏、渣笠楠、利炭大膏、獨脚蓮楠、薄荷油等藥、分劑一至二丸、英揀藥冊之哥羅新丸有二、一、哥羅新雜丸、Pilula Colocynthidis Composita,

療效 此藥常用爲瀉水之劑、痳症[1]、血過多[2]或顱腦積血[3]之患、服之有效、因其無味、故孩童易服、分劑乃一至二厘、(0.06-0.12) 與大黃糖漿半量兩 (15.0) 同服最妙、肝失功用[4]與鉥氣弱薀同服最妙、若病者虛弱、不宜服足分劑、育道被惹者、忌用。

藥製與分劑

渣笠雜散 Pulvis Jalapæ Compositus, 十五至四十厘、(1.0-2.6) 此散內有渣笠散三十五分、鉥氣菓礬六十五分。

渣笠樠 Resina Jalapæ, 成人二至四厘、(0.12-0.25) 孩童一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.03)

渣笠酒 Tinctura Jalapæ, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

渣笠膏 Extractum Jalapæ, B. P. 五至十五厘 (0.3-1.0)

哥羅新 COLOCYNTHIS, U. S. COLOCYNTHIDIS PULPA, B. P.

此乃瓜類、入藥者乃瓜瓤、內含一嫄一樠、均無藥力、惟本藥有瀉水之功、服之過多、必致育道發炎、再多則殞命。

療效 此藥不宜單用、常與他類瀉藥同服、痳腫久症[5]、或某處之潤膜存液、(一名滲出) 服哥羅新雜膏、Extractum Colocynthidis Compositum, 有效、此膏乃以哥羅新、(100.0) 純阿羅、

1 Dropsy
2 Plethora
3 Cerebral congestion
4 Torpid liver
5 Chronic dropsy

次、因病酌用、最妙之法、乃以滾水化開。

藥製與分劑

沸鈉硫强礬 Sodii Phosphas Effervescens, 二至四錢 (8.0-16.0)

枯鈉硫强礬 Sodii Phosphas Exsiccatus, U. S. 半至一錢 (2.0-4.0)

鈉硫强礬雜消水 Liquor Sodii Phosphatis Compositus, 二十至六十量滴 (1.3-4.0) 每量錢內含此礬一錢。

鉀鈉菓礬 POTASSII ET SODII TARTRAS, U. S. SODA TARTARATA, B. P. 此礬之味較鎂硫强礬最佳、故人多喜服、然藥力較鎂硫强礬尤大、分劑半兩。(15.0)

雜沸散 PULVIS EFFERVESCENS COMPOSITUS, U. S. PULVIS SODÆ TARTARATÆ EFFERVESCENS, B. P. 此藥乃以鉀鈉菓礬一百二十厘、(8.0) 與鈉氫碳强礬四十厘、(2.6) 用藍紙合爲一包、再以菓酸三十五厘、(2.3) 以白紙包之、服時將此二包之藥、各以半盃水化開、合於一盃內、乘沸服之、如欲重瀉、可服二劑、輕瀉則一劑足矣、惡心而兼大便乾結者、此爲妙劑、如一次不能服盡、可分爲四分、每刻鐘服一分、常有平胃瀉腹之效。

渣笠 JALAPA, 此乃一類樹根、產於莫西革、內含二樠、皆不單用、必合他藥用之方可。

水大有沸力、宜用新製者、嘔吐之頭痛[1]服之有效、因其惹力過大、故育道發炎者忌用。

沸鎂檸礬 (Magnesii Citras Efferverscens) 一至三錢 (4.0-12.0) 宜貯於嚴密瓶內、用時加水、乘沸服之。

鈉硫强礬 SODII SULPHAS 此礬在瀉藥中為最有惹力者、故以之醫人者少、而醫畜類者多、人服之分劑、半至一兩、(15.0-30.0) 育道發炎者忌用服此藥者、必致水瀉、並有腹痛之患、喀婁巴水 (Carlsbad Water,) 昏亞地亞奴水 (Hunyadi Janos,) 昏亞地阿帕水 (Hunyadi Arpad,) 俱含此礬、近有著名醫者云、微管或他類血管流血之患[2]、每句鐘服此礬二厘、(0.12) 或射於盂內大效、若射於皮內無效。

沸鈉硫强礬 Sodii Sulphas Efferverscens, B. P. 分劑二至四錢、(8.0-16.0)

鈉硄强礬 SODII PHOSPHAS, 此礬本無硄之功效、曾有醫者、以此礬代硄之用謬矣、食牛乳之嬰孩、大便燥瀉無常者[3]、每食時將此礬二至四厘、(0.12-0.25) 加於乳內有效、嬰骨輭[4]症、服之可免大便乾燥之患、用此礬之小分劑、則略有瀉效、足分劑、則大有瀉效、或言肝變硬[5]與癀[6]等症、服之最為妙劑、成人之分劑、乃二十厘至二錢、(1.3-8.0) 日服一至三

1 Sick headache
2 Capillary hemorrhages
3 Diarrhœa and constipation
4 Rickets
5 Hepatic cirrhosis
5 Jaundice

鎂硫強礬	β-Magnesii sulphatis	二英兩	(60.0)
甘油	Glycerini	一量兩	(30.0)
水	Aquæ	四量兩	(120.0) —M.

化開射之。S.—Use as enema.

近有醫者、以此礬每二十五厘、(1.6) 加水百量滴、(6.6) 製成消水、射於腦潤衣間、以醫痙症[1]、有效、用法、如病者身重百磅、可射七十五量滴、(5.0) 總之每二十磅、射十五量滴。(1.0)

藥製與分劑

鎂硫強礬 Magnesii Sulphas 半至一兩 (16.0-30.0)

沸鎂硫強礬 Magnesii Sulphas Effervescens, 四至八錢 (16.0-32.0)

鎂檸礬 (MAGNESII CITRAS,) 此礬之味較鎂硫強礬稍佳、但其惹力較大。

藥製與分劑

鎂檸礬消水 Liquor Magnesii Citratis, U. S. 六至十二兩 (180.0-360.0) 此消

[1] Tetanus

鎂硫强礬

MAGNESII SULPHAS, 此藥色白、結微晶、嘗之有鹽味、水易化之、以試紙試之、其色不變、有瀉腹之能、其故有三、一有從腸血脘取盟之功、二有激腸蠕動之功、三本藥之消水不易被陳、能潤其腸、緣此三者、故服之必致瀉腹、以此藥七分、加水千分、服之能袪膶內之水、如欲多袪其水、則藥內少加水可也、胸統膜積液[1]、或腎炎症、服此藥之膿消水、有瀉水之功、瘀腫[2]者、於早餐前以一至二兩、(30.0-60.0) 加僅能化開之水、服之或效、若分為小分劑、每刻鐘服一次尤妙、腸炎[3]或腹統膜炎[4]等症、如宜袪其血盟、此藥大效、或謂醫熱道之痢症[5]、每二句鐘以一錢 (4.0) 與香硫强酸十至十五量滴、(0.6-1.0) 加水少許服之、較衣必格尤妙、此藥在腸內並無惹力、雖腹有炎症時、亦可服之、各國之泉水多有含瀉力者、緣其畧含鎂硫强礬、不易被陳、故可免大便乾結之患、年壯者、因患沙淋[6]以致腎痛、尿中必含有錏養晶、若以此礬與鋏檸礬各半至一錢 (2.0-4.0) 日服三次有效、但必久服方可、如某處發炎[7]、以此礬製成濃消水、用布蘸而敷之、大有止痛之能、且有痲效、如陽腺炎[8]、腦系痛[9]、瘀症[10]、新痺症[11]、敷之俱效、足系炎症、如以布蘸此消水裹其小腿亦效、此礬亦可為射肛之用、其益有二、一瀉腹、二取腸內血脘之盟、頁方如左。

1 Pleuritic effusion
2 Dropsy
3 Enteritis
4 Peritonitis
5 Tropical dysentery
6 Gravel
7 Inflammation
8 Orchitis
9 Neuralgic nerves
10 Erysipelas
11 Acute inflammatory rheumatism

洋鼠李流膏 Fluidextracti rhamni purshianæ 一量兩 (30.0) —M.

相合調勻、每晚服一小勺、(4.0) 如其力不足早晚各服一小勺可也。

S.—Teaspoonful at night, or night and morning.

若服此方有腸痔之患、宜每服加顛茄流膏半至一量滴。(0.03-0.06)

辛那雜冲藥 Infusum Sennæ Compositum, U. S. 四量兩、(120.0) 內有辛那、甘露、小茴香、鎂硫強礬等藥、有瞻瀉之功。

辛那糖漿 Syrupus Sennæ, 一至四量錢 (4.0-16.0)

甘草雜散 Pulvis Glycyrrhizæ Compositus, 二十至三十釐 (1.3-2.0) 內有辛那、甘草、小茴香油、淨硫等藥。

辛那冲藥 Infusum Sennæ, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

辛那雜調水 Mistura Sennæ Composita, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

辛那雜酒 Tinctura Sennæ Composita. B. P. 一至四量錢 (4.0-16.0)

辛那濃消水 Liquor Sennæ Concentratus, B. P. 一量錢 (4.0)

服辛那者、尿內含鹼、則色必紅、含酸則色必黃、未服之前、醫者當明示之、以免其驚懼。

辛那 SENNA, U. S. SENNA INDICA, B. P., SENNA ALEXANDRINA, B. P.

此藥乃一類樹葉、產於印度伊及等處、乃瀉藥類中大有力者。

體功效　服此藥者、必大有瀉效、單服之、每有腸痛[1]之患、或謂此藥有感肝生膽液之功、然用爲膽瀉劑者少、亦有謂此藥能增腸蠕動而成瀉效者、乳婦不宜多服、以其由乳而祛、嬰孩食之、恐有瀉腹之患。

藥製與分劑　大便乾結、專服此藥有效、如與他藥兼服尤妙。

辛那流膏　Fluidextractum Sennæ, U. S.　一至二量錢、(4.0-8.0) 爲孩童之劑、四量錢、(16.0) 爲成人之劑。

辛那糖菓　Confectio Sennæ,　三十厘、(2.0) 爲孩童之劑、一至二錢、(4.0-8.0) 爲成人之劑、孩童服之最妙、但内含糖類、易令孩童之胃失其功用、不宜常服、孕婦之大便乾結、多有醫者以此藥爲妙劑、或以洋鼠李爲尤妙、若此二藥單用而無效者、良方如左。

辛那流膏　℞-Fluidextracti sennæ　二量兩　(60.0)

1 Habitual constipation

一厘、(0.06)以上各藥每服一至二丸。

阿羅膏 Extractum Aloes, U. S. 一至二厘、(0.06-0.12)

輕瀉雜丸 Pilulæ Laxativæ Compositæ, U. S. 此丸內有阿羅、顛茄膏、士的年、衣必格等藥。

阿羅酒 Tinctura Aloes, 一至二量錢、(4.0-8.0)

阿羅沒藥酒 Tinctura Aloes et Myrrhæ, U. S. 一至二量錢、(4.0-8.0)

阿羅雜煮水 Decoctum Aloes Compositum, B. P. 半至二量兩、(15.0-60.0)

巴阿羅膏 Extractum Aloes Barbadensis, B. P. 二至六厘 (0.12-0.36)

禁用之狀 體胖而大便乾結或腸洄膜炎者、俱不宜服、肝炎或肝積血者、與肛炎或患熱症者、亦不宜服、孕婦服之、最宜謹慎、恐有小產之虞。

炥他林 (PHENOLPHTHALEIN) 此藥乃為試酸鹼之用、近代醫者、多用之醫大便久燥之患[1]、單用之、或合阿羅製丸用之俱可、如服尋常之分劑、即一至二厘、(0.06-0.12) 能令病者大便如常、且腹無疴痛、亦不損其精神、久服亦然。

祛 此藥由大便而祛。

1 Chronic constipation

蒲膏 Extracti taraxici 酌用 一M.

製成六十丸、早晚各服二丸。 Ft. pil No. LX. S.—One pill, morning and evening.

如因血虧、或大便乾結、以致經閉症[1]、此藥大有調經之效、新久之肛裂[2]、或臥瘡[3]、如敷阿羅甘油有效、製法以阿羅酒八分、置於火上、令其滾沸、漸次加甘油三十分、即成此油。

藥製與分劑

阿羅 Aloe Barbadensis, B. P. Aloe Socotrina, B. P. 輕瀉一至五厘、(0.06-0.3) 重瀉十厘、(0.6) 常與顛茄、香藥等製丸服之。

純阿羅 Aloe Purificata, U. S. 此為常用者。

阿羅丸 Pilulæ Aloes, U. S. Pilula Aloes Barbadensis, B. P. Pilula Aloes Socotrinæ, B. P. 每丸內有阿羅與鹼各二厘 (0.12)

阿羅沒藥丸 Pilulæ Aloes et Myrrhæ. U. S. Pilula Aloes et Myrrhæ, B. P. 每丸內有阿羅沒藥各二厘、(0.12)


阿羅乳脂丸 Pilulæ Aloes et Mastiches, U. S. 每丸內有阿羅二厘、(0.12)

("Lady Webster dinner Pill")

阿羅鐵丸 Pilulæ Aloes et Ferri, U. S. Pilula Aloes et Ferri, B. P. 每丸內有阿羅、與枯低鐵硫强礬各

1 Amenorrhœa
2 Old or recent fissure of the rectum
3 Bed-sores

第五十四圖



此圖表明阿羅大有感胴之力如A

二句鐘、瀉效方顯、其大感、乃行於胴肛等處、服十至二十釐 (0.6-1.3) 之大分劑、必有水瀉、服二或三釐 (0.12-0.2) 之中分劑、必有濇瀉。

療效　此藥欲用之爲瀉劑、以祛某處積血、（如某處生瀉發炎等）毫無功效、其正感、乃緩增腸蠕動之功、新久之大便乾結症[1]、此藥乃常用之品、然用之過久、其效反失、並減腸內生液之功、因其味苦、故能補胃、醫者常與鐵類同用、其效尤妙、蓋鐵類原有斂力、易令大便結燥、故二者並用、大有輔佐之功、服足分劑者、大有瀉效、瀉後有覺腹內脹墜者、亦有肛洇膜發炎者、如專服此藥、常有腸痔之患、故宜與免腸抽搐藥同服、患痔[2]者、如身體虛弱、與低鐵硫强礬兼服有效、良方如左。

低鐵硫强礬	B-Ferri sulphatis	二十英釐	(1.3)
阿羅膏	Extracti aloes	一英錢	(4.0)

1 Chronic and subacute constipation
2 Hemorrhoids

大黃糖漿 Syrupus Rhei 一量錢(4.0)爲孩童之劑、四量錢、(16.0)爲成人之劑、然成人少用之。

大黃香糖漿 Syrupus Rhei Aromaticus, U. S. 一量錢 (4.0) 乃爲孩童而製者。

大黃酒 Tinctura Rhei, U. S. 半至二量錢 (2.0-8.0)

大黃香酒 Tinctura Rhei Aromatica, U. S. 半量錢 (2.0)

大黃雜酒 Tinctura Rhei Composita, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

大黃冲藥 Infusum Rhei, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

大黃鈉氫碳調水 Mistura Rhei et Sodæ, U. S. 一量錢 (4.0)

大黃濃消水 Liquor Rhei Concentratus, B. P. 一量錢 (4.0)

阿羅 ALOE, U. S. ALOE BARBADENSIS, B. P. ALOE SOCOTRINA, B. P. 此藥乃由一類草葉之汁、曝乾而成、產於巴貝豆搜叩他二海島、故有巴阿羅與搜阿羅之分、內含一精、名阿羅精、藥力即由於此精、如係純淨體、必結晶、然常售者乃藥散、其味極苦。

體功效 此藥敷於舌上、苦味常存、有醫者謂以此藥灌犬、其肝大受其激、而多生膽液、人則無此效、想該醫灌犬者、必過分劑、尋常之分劑、恐無此效、人不服過分劑、必越十

薄荷油 Olei menthæ piperitæ 一量滴 (0.06) —M.

製成二十丸、每飯後可服一或二丸。 Fiant pil No. XX. S.—After each meal take one or two pills

孩童大便乾結[1]服他類瀉劑、易成瀉症、此藥有斂力、庶免此患、若孩童暑瀉[2]先以此藥瀉出腸內釀壞之物、後施以斂藥、此乃常法、服此藥者、其尿若含酸色必黃、尿若含鹼色必紅。

藥製與分劑

大黃散 (Pulveris Rhei) 二十釐 (1.3)

大黃膏 Extractum Rhei, 五至十釐 (0.3-0.6) 成丸服之最妙。

大黃雜丸 Pilulæ Rhei Compositæ, U.S. Pilula Rhei Composita, B.P. 一至三丸、每丸內有大黃二釐 (0.12) 阿羅一釐半、(0.09) 乃為成人而製者。

大黃雜散 Pulvis Rhei Compositus, 二十至四十釐 (1.3-2.6) 乃以大黃、鎂養、薑等藥製成。

大黃流膏 Fluidextractum Rhei, U.S. 二十至三十量滴 (1.3-2.0)

1 Constipation
2 Summer diarrhœa

滴、(1.0-4.0) 置於輭藥壳內服之、但必服數壳、方能見效、未服之前、宜將藥壳蘸水、爲其易於下咽也。

銾氯弱塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM MIT, U. S. HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM, B. P. 詳見銾篇

銾丸塊 MASSA HYDRARGYRI, U. S PILULA HYDRARGYRI, B. P 詳見銾篇

大黃 RHEUM. U. S. RHEI RADIX, B. P. 此係一類植物、產於中華西藏美國等處、入藥者乃其根、內含數壙一酸、惟此酸可入藥用。

體功效 有醫者云、此藥感膽液之能無常、亦有醫者云服後必增其膽液、究之此藥原有斂力、故無重瀉之能、然有令人思食、助消化、補育道等功、常服者、反致大便乾結。

療效 如欲輕瀉、兼激胃經、此爲妙劑、良方如左。

大黃散	℞-Pulveris rhei	二十英厘	(1.3)
衣必格散	Pulveris ipecacuanhæ	二英厘半	(0.15)
鈉氯碳强礬	Sodii bicarbonatis	一百英厘	(6.6)
馬前子膏	Extracti nucis vomicæ	二英厘	(0.12)

分劑、亦可見效、因服之者易患腸痒、故加鴉片酒、或顛茄酒少許方可、如此二酒不便、可加丁香油一量滴、(0.06) 亦免此患。

蓖麻油調水 Mistura Olei Ricini, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

服法 此藥如係純淨、惡味畧輕、然過純則功效反減、服法甚多、無庸細述、只以常用者論之、如服時加洋苦杏仁油一或二滴、(0.06-0.12) 可解其味、若製成勻類用之、不但惡味不甚改變、且阻其瀉效、又法先食薄荷糖一枚、服後再食一枚、可解其味、如以肉湯多加胡椒、或他類之味料、後將此油置於湯內、服之亦可、有著名醫者之良方如左。

蓖麻油	℞-Olei ricini	半量兩	(16.0)
非薊糖漿	Syrupi acaciæ	三量錢	(12.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	五量錢	(20.0)
薄荷油	Olei menthæ piperitæ	一量滴	(0.06) —M.

合勻一次服之。 Sig. To be taken in one dose.

更有服法、以此藥與甘油各半、加冬綠油少許服之、最善者、乃以此油十五至六十量

療效　此藥爲最和平之瀉劑、與鎂硫强礬同、然鎂硫强礬之效較速、且多祛血鹽、空腹服之、半至一句鐘、其效即顯、此藥必四至五句鐘、方能見效、入食爛菓、或腐肉、或他不潔之物、以致胃經不安、服之最爲妙劑、如致胃經甚覺發炎、服之亦可、若人誤吞杏核、櫻核、桃核等硬物、以致育道被惹、此藥有潤腸、與護洇膜之功、較鎂硫强礬尤妙、孩童瀉症[1]、常有洇液積於腸內、如先用斂藥、必致有損、宜先服此油、將積液瀉出、後服斂藥、方能有效、孕婦將產時、如先服此藥、瀉凈腸內之糞、亦與分娩[2]有所輔助、人患熱症後常有大便乾燥[3]者、服之有效、嬰孩或幼童大便乾燥者、常以此油醫之、論此藥不合人意之處、一因氣味不美、二因係油類、三因常用易患痔症、四因必日增其分劑、方能見效、如因食物惹育道致患瀉症[4]、此藥瀉後有斂效、故爲妙劑、如兼服鈉氫碳强礬、瀉效尤大、近有醫者云、患似系痛之頭痛[5]、如日服小分劑、常效、其效之所以然、人不得而知、或因此油有免血中毒[6]之能耳。

藥製與分劑

蓖麻油 Olei Ricini　一至二量錢、(4.0-8.0) 爲孩童之劑、半至一量兩、(15.0-30.0) 爲成人之劑、以上雖係常用之分劑、然遇腸內積有惹力之物、欲令其瀉腹者、雖服尤小之

1 Diarrhœa
2 Parturition
3 Constipation
4 Irritative diarrhœa
5 Neuralgic headache
6 Toxæmia

藥製與分劑

硫 Sulphur 十至二十厘 (0.6-1.3) 爲改症之劑一至二錢、(4.0-8.0) 爲輕瀉之劑、夜晚服之、内加糖漿最妙。

硫糖果 Confectio Sulphuris, B. P. 十厘至二錢 (0.6-8.0)

硫餅 Trochiscus Sulphuris, B. P.

鍻硫粉 CALX SULPHURATA, 此藥有阻炎之功、亦有速於生膿之效、分劑一厘之十分之一、至二分之一、(0.006-0.03) 膿皰瘡[1]、或他類皮生膿之患、此藥大效、生癤[2]不止者有效、如此藥不易得、可以明皮烤焦、研成細末、日服一錢 (4.0) 亦效。

鍻硫粉糖消水 Liquor Calcis Saccharatus, B. P. 分劑十五至六十量滴、(1.0-4.0)

鍻泚 Calcii Hydras, B. P. 此乃石灰之末、

蓖麻油 OLEUM RICINI, 此藥乃由蓖麻子所出、内含一酸、名蓖麻酸。

體功效 此藥令人瀉腹之故、人不盡知、或因其内所含之酸、或因油類原有瀉腹之力、如服洋橄欖油之大分劑、亦有輕瀉之效。

1 Acne pustulosa
2 Crops of boils.

於皮上、或洄膜上、有改症之效。

療效 此藥可用爲輕瀉劑、不可用爲重瀉劑、腸狹[1]患服之、可使腸內之糞柔輭易過、患處大便乾結[2]、他瀉劑所不能醫者、此藥或可醫之、若兼有痔症[3]、服之尤妙、有醫者云、此藥能醫久痺[4]、或髀大系痛[5]等症、然未必盡效、氣脘炎[6]而痰盛者、日服三次、每服五至十厘、(0.3-0.6) 有祛痰之效、皮科用爲敷藥、較服尤妙、如將乾硫散敷於皮上少效、必以此散製成抹膏敷之、其效乃顯、但久用之、或有惹力、硫抹膏 Unguentum Sulphuris, 患疥[7]症者敷之、乃爲最妙之劑、夫疥蟲本分公母、公者寄於皮外、母者寄於皮內、公者易滅、母者難殺、病者必先沐浴其身、以鹼洗淨患處、用粗布擦乾、再敷此藥、方能滅盡、用畢之布、煮以滾水、免染他人、且用此法、宜在晚間、爲使此藥終夜存於患處、如此不過三次、則痊瘉矣、幼婦行經時、常有䐈腺炎[8]、患面顯黃色者、良方如左。

澱硫	℞-Sulphuris præcipitati	一英錢	(4.0)
濕羊毛脂	Adipis lanæ hydrosi	一英兩	(30.0) —M.

製成抹膏、日敷患處一或二次。 S.—Apply once or twice daily.

1 Stricture of the bowel
2 Constipation
3 Hemorrhoids
4 Chronic rheumatism
5 Sciatica
6 Bronchitis
7 Scabies
8 Acne

黑根膏 Extractum Leptandræ, U. S. 一至八厘 (0.06-0.5)

黑根流膏 Fluidextractum Leptandræ, U. S. 五至四十量滴 (0.3-2.6)

黑根楠 (Leptandrin) 二至五厘 (0.12-0.3)

鎂碳強礬 MAGNESII CARBONAS, U. S. MAGNESIA PONDEROSA, B. P. MAGNESIA LEVIS, B. P. 此藥雖輕重不同、而其功效無別、輕者常作外敷之用、若作服劑、必須非常之多、方能有效、如對磨瘢[1]皮症、或生汗過多者、敷之有效、重者常用爲攺酸藥、昔日醫者謂其有瀉效、然實無瀉力、蓋因病者有胃酸之患、此藥與胃中之酸、化成一類之新礬、致有輕瀉之效也、若因胃存酸液、以致嘔吐[2]之頭痛者、服之有效、分劑五至六十厘、(0.3-4.0) 但不宜常服、恐積於腸內也。

鎂碳強礬消水 Liquor Magnesii Carbonatis, B. P. 分劑一至二量兩、(30.0-60.0)

硫 (SULPHUR.) 此質入藥者有三種、一升硫、Sulphur Sublimatum, 二淨硫、Sulphur Lotum, U. S. 三澱硫、Sulphur Præcipitatum, 此三類之硫、醫者多不能分淸、升硫乃以硫用升法而得、淨硫乃將已升者以水洗之而得、(爲去淨所含之硫强酸也) 澱硫乃以升過之硫、置於鍋內、加白灰氣氯酸與水等煮之、後用化法沉澱而得、三者之中、此爲最純。

體功效 此藥於身內無甚顯效、服之者、能使大便成爲稀糜、且有非常之臭、若用之敷

1 Intertrigo
2 Sick headache

色不正之孩童、或因血虧、或因癧症、或不思飲食、或中耳有病、或身體無力者、此藥俱效、但宜久服。

洋澤漆流膏 Fluidextractum Stillingiæ, U. S. 十至六十量滴、(0.6-4.0) 製此藥時、宜用鮮根、乾者恐力不足也、

黑根 LEPTANDRA, U. S.

此藥係一類草根、產於美國。

體功效 有二醫者詳查此藥之體功效、謂服中分劑、必致肝液增多、過分劑、則腹瀉甚重。

療效 常用此藥之醫者、謂其於腸不消化症[1]、大有醫之之能、(或謂此類症乃因腸首段虛弱之故) 良方如左、

印度龍膽草膏 R-Extracti chiratæ 二十英厘 (1.3)
黑根膏 Extracti leptandræ 二十英厘 (1.3) —M.
共成十丸、每餐後服一丸。 Fiant pilulæ No. X. S.—One pill after each meal.

藥製與分劑

1 Intestinal indigestion

或臨睡時食此果、可免大便乾結之患。

洋澤漆 STILLINGIA, U. S. 此乃一類草根、產於美國。

體功效 此藥有速緩二效、其速效有使腸液頓增之力、緩效乃漸有改症之能、如服過分劑、有瀉膽液之力、心之跳動甚速、氣館之涸膜生液亦多。

療效 此藥有增腸液之力、故大便乾燥者、服之有效、如肝失功用、且腸虛弱以致痔[2]症、此爲特藥、其良方如左。

洋澤漆流膏	℞-Fluidextracti stillingiæ	五量錢	(20.0)
顛茄葉酒	Tincturæ belladonnæ foliorum	一量錢	(4.0)
馬前子酒	Tincturæ nucis vomicæ	一量錢	(4.0)
加拉巴豆酒	Tincturæ physostigmatis	一量錢	(4.0) —M.

每飯前以二十量滴、(1.3) 加水服之。

S.—20 drops in water t. i. d. before meals.

如兼大便乾燥、方內加阿羅少許亦可、重癧[3]症類、如與敵癧藥兼服、則可增其功效、面

1 Constipation
2 Hemorrhoids
3 Syphilis

藥製與分劑

洋鼠李流膏 Fluidextractum Rhamni Purshianæ U. S., Extractum Cascaræ Sagradæ Liquidum, B. P. 十至二十量滴、(0.6-1.3) 每晚服之、或早晚服之亦可、若用二十量滴 (1.3) 無效、宜用三十、(2.0) 若猶無效、與他瀉劑同服亦可、然分劑不可再增、恐有惹腸之患也、此藥味苦、人不喜服、如以流膏一分、加陳皮糖漿二分、庶能畧減其苦味。

洋鼠李香糖漿 Syrupus Cascaræ Aromaticus, B. P. 一至四量錢 (4.0-16.0)

洋鼠李膏 Extractum Rhamni Purshianæ, U. S. Extractum Cascaræ Sagradæ B. P. 二至八厘 (0.12-0.5)

洋杜仲 EUONYMUS, U. S. EUONYMI CORTEX, B. P. 此藥乃一類之草、產於美國、入藥者乃其根之皮、其效甚緩、不令人腹痛、有醫者謂、其效多行於肝經、故肝經畧失功用[1]者、服之有效。

藥製與分劑

洋杜仲膏 Extractum Euonymi, U. S. 三至十厘 (0.2-0.6)

洋杜仲乾膏 Extractum Euonymi Siccum, B. P. 半至一厘 (0.03-0.06)

菴弭羅 TAMARINDUS, 此藥係一類樹果、產於東西印度、伊及、亞拉伯等處、入藥者乃其瓤、常置於糖內用之、味苦而甜、瀉力無多、與他果品同、可入辛那糖果內、有人於飯後

1 Hepatic torpor

第十八章　論瀉藥類

甘露 MANNA, U. S. 此藥產於歐洲、係一類樹汁、曝乾而成者、其形與灰色非茜相類、味甜、亦有畧苦者。

療效　此藥爲輕瀉藥類中之最輕者、但服後或有腸胃發脹之虞、若食牛乳之嬰孩、大便乾燥[1]、可於每食牛乳時、加甜甘露一或二錢、(4.0-8.0) 則免此患、無論孩童成人、欲使瀉腹、必與他類有力之瀉藥同服、此藥不過爲藥引而已、故常與大黃、辛那合用、辛那雜冲藥內、Infusum Sennæ Compositum, U. S. 亦有此藥、分劑一至四量兩、(30.0-120.0)

槐花莢 CASSIA FISTULA, U. S. CASSIÆ PULPA, B. P. 此藥乃係槐角、產於東西印度羣島、及中國廣西等處、入藥者乃角中之瓤、不宜單用、恐服之者有腸疛之患、辛那糖菓內亦含此藥、輕瀉之分劑、半至一錢、(2.0-4.0) 重瀉之分劑、半兩 (15.0)

洋鼠李 RHAMNUS PURSHIANA, U. S. CASCARA SAGRADA, B. P. 此藥係一類矮樹、產於美國。

療效　此藥只可用之爲輕瀉劑、大便乾結[2]、而無他症者、服此藥之中分劑最妙、蓋用中分劑、不但無惹腸之患、且有補腸之功、不似他類瀉劑、令病者服後、大便猶易乾結也、故醫者每用之以醫大便久燥之患。

1 Constipation
2 Constipation

炎、並無他症、服無定體之阿甫莫非一厘之十五分之一、(0.004) 竟至殞命。

芥 SINAPIS ALBA, U. S. SINAPIS, B. P. 此藥乃一類之菜、各洲皆有、入藥者乃此菜之子、研成細末、以此末一兩、(30.0) 加溫水一杯、(180.0) 服之有惹胃嘔吐之效、如分劑過大、則有胃炎之患、若以鋅硫強礬三十厘、(2.0) 加水二量兩、(60.0) 服之亦有吐效、見鋅硫強礬篇

瑪替開拉 MATRICARIA, U. S. 此藥係一類之草、入藥者乃帶花之梢、產於歐洲、其中分劑、有苦補藥之效、足分劑有嘔吐殺蟲之功、曾有醫者以此藥一至二兩、(30.0-60.0) 加水一量磅、(480.0) 製成沖藥服之、大分劑有發表之功、微分劑能醫孩童生牙之痳患。

過分劑、有阻此部之力。

呼吸部　服中分劑、與本部毫無關涉、毒分劑、乃令呼吸短而不勻。

嘔吐　此藥令人嘔吐者、與胃中並無感力、緣其有感延腦嘔吐司所也、故名曰腦吐藥。

療效　此藥有令人嘔吐之效、中某藥之毒者、如形狀不甚危險、亦可用爲吐藥、然宜謹慎、胃炎與氣管洄膜炎、[1] 無論中程、或日久不愈者、如用足分劑、所積之洄液、必能吐出、氣管新炎而乾嗽者、[2] 服小分劑、有平氣管洄膜之能、且有止嗽之效、酒狂者、或將成酒狂者、[3] 以一厘之三十分之一、(0.002) 每三句鐘服一次、有平腦部之效、用如此小分劑者、爲免其嘔吐也。

用法　此藥用爲吐劑、宜以水化開、用空針射之、但當臨射時化開、早化者不宜用、其分劑、一厘之十分之一、(0.006) 健壯者、或可用一厘之五分之一、(0.01) 如用之祛痰、可服一厘之四十分之一、至二十五分之一、(0.0015-0.003) 此分劑爲免惡心之患也、孩童用之、多顯乖效、故不常用、所常用者、乃阿甫莫非鹽。

乖效　此藥少有乖效、然亦有用中分劑、而遍體被阻、腦力脫失者、曾有一婦人、氣管發

1 Catarrh of the stomach and air passages
2 Acute bronchitis
3 Delirium tremens

衣必格海葱丸 Pilula Ipecacuanhæ cum Scilla, B. P. 五至十厘 (0.3-0.6)

衣必格醋 Acetum Ipecacuanhæ, B. P. 五至三十量滴 (0.3-2.0) 爲祛痰之用。

阿甫莫非 (APOMORPHINA)

此藥乃以莫非與鹽氣酸置於嚴密鐵管內燒之而成、色白或淺灰、結微晶、遇空氣則成細粉、宜置於黑色瓶內、嚴密塞之、如以此藥製成消水、存之日久、最易改其體質、則不宜用、以其內含毒力也、醫者當切記之、按此藥之體質常有改變之時、如欲試之、可將此藥一分、加水百分搖之、越數分鐘、色如深綠、則不宜用、若所用之水含鐵少許、雖體質未改、亦顯綠色、故所用之水、務宜純淨、此藥原分二種、一結晶體、二無定體、所常用者乃結晶體、如服結晶者之過分劑、則有惹力、以致有抽搐痙狀、頭暈覺系過度等患、若服無定體者之過分劑、則腦力脫失、身熱減少、遍體痲木、絡與呼吸二部、亦皆衰弱。

體功效 腦部 服中分劑、與本部毫無感能、大分劑、有激動腦之力、毒分劑、必致脊腦被惹、令人抽搐。

絡部 服中分劑、乃使脈速而有力、血壓加增、因此藥有激速心系、並司絡腦所之能、

增重、然其癢必漸瘉、不越數日、喉與咳嗽等患、俱見功效矣、或謂以衣必格散加水、調之成糊、以敷螫[1]傷、可減其痛、且免紅腫。

藥製與分劑

衣必格糖漿 Syrupus Ipecacuanhæ, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0) 爲祛痰與孩童嘔吐之劑。

衣必格葡酒 Vinum Ipecacuanhæ, 半至一量錢 (2.0-4.0)

衣必格流膏 Fluidextractum Ipecacuanhæ, U. S. Extractum Ipecacuanhæ Liquidum, B. P. 三十量滴 (2.0) 爲成人嘔吐之劑。

衣必格餅 Trochiscus Ipecacuanhæ, B. P. 每餅內有莫非一釐之三十六分之一、(0.002) 衣必格一釐之十二分之一、(0.005) 喉[2]炎症、可噙於口內。

衣必格雜散 Pulvis Ipecacuanhæ et Opii, U. S. Pulvis Ipecacuanhæ Compositus, B. P. 五至十五釐 (0.3-1.0) 可爲尋常之劑、此散內有衣必格一分、鴉片一分、乳糖八分。

厄米汀 (Emetina) 一釐之十分之一、至六分之一、(0.005-0.01) 乃爲嘔吐之劑。

1 Stings of bees
2 Sore throat

效、若宿醉[1]而晨吐者、服之有效、然不若砒與氫氯酸爲妙、或言分娩時、宮[2]之縮力不足、每二三句鐘服衣必格葡酒十至十五量滴、(0.6-1.0) 其縮宮之效、與貴林同、新痢[3]症、此乃最妙之品、大便過多、且多帶血、似熱道之痢症者、空腹服無臭鴉片酒三十量滴、(2.0) 後服衣必格散三十厘、(2.0) 有效、蓋因鴉片酒有阻此藥嘔吐之力也、但宜躺臥、否則難以見效、越數句鐘、如見灰色之大便、乃痊癒之兆、其疼痛作燒便血等患、必皆減少、倘大便不見灰色、病勢必至加重、有著名醫者謂、患痢症者、雖身體甚弱、嘔吐昏瞶、以上之方亦可用之、倘服後嘔吐、越二三句鐘、仍可依前再服、且於腹皮上用外惹內效之藥、然當兼服激藥類、免其過於被阻也、似霍亂[4]症、有醫者云、每二句鐘服衣必格散三厘、(0.2) 有效、但須兼服無臭鴉片酒五量滴、(0.3) 以免嘔吐之患、咳血[5]症、此藥之微分劑有效、無論何處微血管[6]流血、此藥有止之之效、氣管新炎[7]症、能平氣管洒膜、且能激之生液、若與錸檸礬並服、其效尤妙、有著名醫者云、冬季氣管發炎[8]、兼有瘵症者、可將衣必格葡酒、以噴霧具噴於口內、常效、但初用時宜用力小者、即此藥之葡酒、加水與醇酒各等分、且不宜用之過三或四分鐘之久、後漸加此藥之葡酒、以增其力、用時病者每數分鐘、宜以水漱口、以免其藥下咽、否則必有嘔吐之患、初次用之、嗓中或見

1 Morning vomiting of drunkards
2 Uterine inertia
3 Acute dysentery
4 Cholera morbus
5 Hæmoptysis
6 Capillary hemorrhage
7 Acute bronchitis
8 Winter bronchitis

第十七章 論吐藥類

衣必格 IPECACUANHA, U. S. IPECACUANHÆ RADIX, B. P.

此藥係一類小樹之根、產於巴西國、內含一蟔一酸、蟔名厄米汀、酸名衣必格酸。

體功效 此藥敷於洇膜、則有惹力、敷於皮上、久必起皰、服微分劑無效、大分劑、則有惡心、嘔吐、疲倦、氣脘生液、口涎過多等患、其嘔吐之故有二、一 因有惹胃之力、二 因有激延腦中嘔吐司所之能、且此藥並有阻脊腦之力、如不嘔吐而被唻者、亦有阻心之患、試將其蟔之毒分劑、令禽獸食之、必致呼吸停止、因而殞命。

祛 此藥由腎經、大便、洇膜、皮膚而祛。

療效 此藥嘔吐之效較速、嬰孩飲食過度、乃爲上品、中毒者服之、不爲妙劑、緣錊硫强礬、或芥末等吐藥、較此藥尤速也、嬰孩氣脘炎[1]症、痰不能外吐而下咽者、以致胃經常失功用、若服衣必格糖漿二至三量錢、(8.0-12.0) 可使其痰吐出、且有醫肺之功、如所服之分劑、不足使之嘔吐、則有瀉效、胃中之痰、即由大便而祛、胃經被阻而嘔吐不止者[2]、每半句鐘服一厘之八分之一、至四分之一、(0.008-0.016) 至六七次爲止、其惹力可使胃經復原、而止其嘔吐、如因胃經發炎、或被惹之故、此藥毫無功效、孕吐者[3]、如上服之、或

1 Bronchitis
2 Obstinate vomiting
3 Vomiting of pregnancy

馬兜鈴酒 Tinctura Serpentariæ, 三十至六十量滴 (2.0-4.0) 此藥亦入於辛寇那雜酒內。 Tinctura Cinchonæ Composita

馬兜鈴冲藥 Infusum Serpentariæ, B. P. 半至一量兩 (15.0-30.0)

蘭草 EUPATORIUM, U. S.

此乃一類之草、入藥者乃其葉與帶花之梢、產於美國、世人常以此作激胃、或發表之用、人虛弱而厭食者、以此草製成冲藥、乘熱服之有效、因傷風而經閉[1]者、服之亦效、按此藥之味甚惡、故有人製成冲藥、俟冷服之、作爲吐劑、但必至十六量兩 (480.0) 之多、方能奏效。

蘭草流膏 Fluidextractum Eupatorii, U. S. 分劑三十至六十量滴 (2.0-4.0)

1 Arrested menstruation

辣椒脂油 Oleoresina Capsici, U. S. 一厘之四分之一、至四分之二、 (0.015-0.025)

辣椒流膏 Fluidextractum Capsici, U. S. 一至三量滴 (0.06-0.2)

辣椒貼膏 **Emplastrum Capsici, U. S.**

辣椒抹膏 Unguentum Capsici, B. P.

白柴油 OLEUM CAJUPUTI, 此藥產於謀勒克羣島、係一類所含之精油、其氣易散、中分劑、有激洄膜之能、過分劑、有惹洄膜之力、其效與祛風藥同、並有殺寄生之功、髮錢癬[1]、以此藥敷之有效、但宜加謹慎、恐有惹皮之患、用之殺虱[2]亦可、盟瀉症[3]、服之有效、分劑十至二十量滴。(0.6-1.3)

白柴浮酒 Spirtus Cajuputi, **B. P.** 分劑三十至六十量滴 (2.0-4.0)

馬兜鈴 SERPENTARIA, U. S. SERPENTARIÆ RHIZOMA, B. P. 此乃一類之草、產於美國、入藥者係此草之根。

療效 因此藥味美而燥、故常用為引藥、且有補藥之力、胃經虛弱、食物不化者、多以此藥醫之、或言此藥有激陰陽之力、然不甚確、如服過分劑、惹力甚大、必有吐瀉之患。

藥製與分劑

馬兜鈴流膏 Fluidextractum Serpentariæ, U. S. 十至四十量滴 (0.6-2.6)

1 Tinea tonsurans
2 Pediculi
3 Serous diarrhœa

症、有免尿胎[1]之功、腎新炎症忌用、如腎經被阻而無他患者、服辣椒酒五至二十量滴、(0.3-1.3) 則有利小便之功、嗓痛[2]或咽門栱炎[3]等症、以此酒與甘油各半、用棉蘸之、敷患處有效、腭垂鬆輭[4]者、用以上之方加水作爲漱藥有效、育道被阻時、服他藥而不被㖦者、如兼服此藥以激育道、可助其㖦藥之功、若敷於皮上、其處必紅、而有外惹內效之力、最妙之用法、乃將食水紙蘸辣椒酒、俟乾再蘸、如此數次、末後當潮潤時敷患處、用布捲裹之有效、痹[5]或腰痹[6]症、用此藥之貼膏有效、頭痛[7]、如貼項上亦效、患凍瘃[8]者、如皮未破、以此酒敷之或效、有著名醫者、醫凍瘃之法如左、以辣椒一分、加煉酒二分、置於溫暖處數日、再以非蒞加水、製成糖漿之形、與所備之辣椒酒各一分、合勻刷於薄紙上、俟乾再刷、至有光而爲止、用時蘸水敷患處、不但止癢、且有大效、於扭傷[9]或骨節痹[10]、如法用之亦效。

藥製與分劑

辣椒散 (Pulvis Capsici) 一至二厘 (0.06-0.12) 加於飯內、或成丸服之。

辣椒酒 Tinctura Capsici, 五至十量滴 (0.3-0.6)

1 Albuminuria
2 Sore throat
3 Tonsillitis
4 Relaxed uvula
5 Rheumatism
6 Lumbago
7 Headache
8 Chilblains
9 Sprains
10 Rheumatic joints

經亦痛、若服過大之分劑、腎則發炎、尿脘淋漓刺痛、服中分劑者、或謂其有激絡部之能。

療效　胃弱症[1]、或因週身衰憊、或因食物不當、或因飲酒過度[2]、此藥爲上品、惟酒後嘔吐者忌服、緣其胃經已被酒惹、如再服此藥、是益增其惹力也、倘宿食不化、服之有效、飲[3]酒未成重癮者、服此藥胃經必煖、或可爲戒酒之助、每四五句鐘、宜服辣椒酒三至五量滴、(0.2-0.3) 或以辣椒脂楠半至一厘、(0.03-0.06) 成丸服之均可、並有良方如左。

辣椒酒	℞-Tincturæ capsici	九十量滴	(6.0)
無臭鴉片酒	Tincturæ opii deodorati	二量錢	(8.0)
燄氰弱浮酒	Spiriti ætheris nitrosi	四量錢	(15.0)
拉芬大雜酒	Tincturæ lavandulæ compositæ, q. s-ad	加至四量兩	(120.0) —M.

每四五句鐘服二量錢 (8.0) S.—Dessertspoonful every four or five hours.

年老或年壯者之腸胃氣痛症[4]、此藥非只有散氣之效、且有免腸內積氣之功、低熱症[5]、有醫者用之爲激藥、然果否有效、不得而知、如病勢漸愈、不思飲食、服之有效、腎久炎[6]

1 Atony of the stomach
2 Alcoholism
3 Subacute alcoholism
4 Flatulent colic
5 Low fevers
6 Chronic nephritis

蜜玫瑰 Mel Rosæ, U. S. 此藥能解藥之惡味、且有激胃之功、如加於常服之藥內、則胃反受其阻、故不常用。

胡椒 PIPER, U. S. PIPER NIGRUM, B. P.

此乃一類樹所結之子、產於印度加拉巴玻羅遲羅等處、內含一精、名胡椒精。

療效 此藥可敷於皮上、作外惹內效之用、亦可為祛風、或激育道之用、胱與尿脘之洒膜虛弱者、服之有效、然有白濁新症者忌服、服之必增其患、腸氣脹[1]者、服之大效。

藥製與分劑

胡椒精 Piperina, U. S. 一至五厘 (0.06-0.3)

胡椒脂楠 Oleoresina Piperis, U. S. 一量滴之四分之一至二量滴 (0.015-0.1)

常以此藥加於輕瀉丸內用之、以免腸疖之患。

胡椒糖菓 Confectio Piperis, B. P. 一至二錢 (4.0-8.0)

辣椒 CAPSICUM, U. S. CAPSICI FRUCTUS, B. P.

此藥乃一類草所結之角、產於亞非利加之熱道、與中亞美利加等處、入藥者形似羊角、其色甚紅、嘗之味辣、內含一紅色流質之精。

體功效 此藥敷於皮上、其處必紅、如敷於洒膜、則必起皰、久服過分劑者、胃炎作痛、肝

1 Intestinal flatulence

水送下方可。

薑酒 Tinctura Zingiberis, 二十至百二十量滴 (1.3-8.0)

薑糖漿 Syrupus Zingiberis, 三十至百二十量滴 (2.0-8.0)

薑脂膏 Oleoresina Zingiberis, U. S. 半至一量滴 (0.03-0.06)

必多加水送下、或成丸服之方可。

薑藥餅 (Trochisci Zingiberis) 此餅乃爲激口內涎腺之用。

蜜 MEL, U. S. 此乃蜜蜂釀成之物、入藥者、原爲解藥之惡味、如蜂只由一類花採取、則此蜜即有該花之味、且服之者、或顯出該花之體功效、亦或有因之中毒者。

療效 咳嗽[1]而喉口發乾者、以蜜與水各半合勻、漱之有效、蓋能使泗膜生液甚多、而積血之患減少也。

藥製

醋蜜 Oxymel, B. P. 此乃以蜜八分、加醋酸與水各一分所成、爲漱喉之用、但常有加有力之斂藥而用之者、若加袪痰藥類、以爲袪痰之用、亦可。

煉蜜 Mel Depuratum, 此乃以冷布過濾、加甘油少許而成、

1 Cough

豆蔻雜酒 Tinct. cardamomi comp. 加至六量兩 (180.0) —M.

每飯後、服二量錢、(8.0) S.—Dessertspoonful after each meal.

此方酸與酒並用、與常理不合、然所用之酸甚少、故所成之伊打無多。

藥製與分劑

豆蔻酒 Tinctura Cardamomi, U. S. 一至二量錢 (4.0-8.0)

豆蔻雜酒 Tinctura Cardamomi Composita. 同上

香散 Pulvis Aromaticus. U. S. 此散內有豆蔻。

薑 ZINGIBER, 此藥乃一類草根、產於中華印度與乍美喀海島等處、帶皮者色黑。去皮者色白、內含一類精油、其氣易散、且有一種香樠、泰西常用之爲祛風補胃之藥、婦人行經、痞轉筋[1]之患、常用此藥醫之、如因受風而經閉者、服之大效、亦常加於瀉劑內用之、因其原有醫瀉[2]症、免腸疞之力、並有改味之能也。

藥製與分劑

薑流膏 Fluidextractum Zingiberis, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0) 必多用

1 Menstrual cramps
2 Diarrhœa

藥製與分劑

肉蔻油 Oleum Myristicæ, 一至三量滴 (0.06-0.2)

肉蔻酒 Spiritus Myristicæ, B. P. 一至二量錢 (4.0-8.0)

毒力 服過分劑者、必致中毒、其形狀與中印度麻者同。

派門他 PIMENTA, 此藥係本樹所結之菓、產於西印度羣島、內含一類精油、其氣易散、係香料、有改味之功、加於香料貼膏內亦可、如加於瀉劑內、可免腸痺之患。

藥製與分劑

派門他油 Oleum Pimentæ, 一至五量滴 (0.06-0.3)

派門他水 Aqua Pimentæ, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

豆蔻 CARDAMOMUM, U. S. CARDAMOMI SEMINA, B. P. 此藥乃一類草子、有苦補藥之力、且有香味、胃與小腸虛弱者[1]、服之有效、如與金酸類、或龍膽草等苦補藥類並用、其效尤妙、腸虛弱並缺少腸液者、良方如左。

淡氰強酸 B. Acid. nitric. dil. 一量錢 (4.0)

1 Atony of stomach and small intestines

療效　丁香油有祛風之效、瀉腹[1]者、或服瀉劑者、如服此油少許、可免腸疴之患、有改味之功、亦有外惹內效之能、並有痲效、與殺寄生之力、肺癆[2]症。飯後以此油五量滴、(0.3) 置於藥殼內服之、並以此油五量滴、(0.3) 加減穉之洋橄欖油二十五量滴、(1.6) 日射腹皮一次、雖受疼痛、而其效最妙、因其有滅穉之能也、陰虱[3]之患、以此油敷患處、有殺之之能、與他精油類同、牙痛[4]者、以此油一量滴、(0.06) 滴於棉上、塞入牙竅內、則有痲效、肌痺[5]症、以此油製成擦藥類擦之、有外惹內效之功、嘔吐不止[6]者、若以此油半至一量滴、(0.03-0.06) 加水服之、或效。

藥制與分劑

丁香油	Oleum Caryoph-lli,	一至五量滴	(0.06-0.3)
丁香冲藥	Infusum Caryophylli, B. P.	一至二量兩	(30.0-60.0)

毒力　服毒分劑者、先則睏睡、後則育道甚炎、終則呼吸被癱而死。

肉蔻 MYRISTICA,

此藥係本樹所結之菓、產於東西印度羣島、有平腦系部之能、與安睡之效、亦有改味之功、盟瀉[7]症、若與他藥同服有效。內含一類精油、其氣易散、名肉蔻油、Oleum Myristicæ, 此菓之外皮、名肉蔻花。

1 Diarrhœa
2 Tuberculosis
3 Pediculus pubis
4 Toothache
5 Myalgia
6 Excessive vomiting
7 Serous diarrhœa

而不止者、服此油有效、此油大有免腐之力、以一至三量滴、(0.06-0.2) 加水一量兩、(30.0) 敷傷處有效、白濁[1]症、可射於尿管內、初患時用之尤妙、洋桂酸、乃以化法由洋桂油而得、曾有醫者以之醫肺癆[2]症、用法以此酸二量滴、(0.12) 射於皮內、病者雖覺疼痛、越片時即止、後有身倦、頭暈、顱腦積血等患、此患已過、可再射之、並遞加其分劑、至十五量滴 (1.0) 爲止、越三四十日、咳嗽減輕、身體增重、但射時多受疼痛、故用之者少。

藥製與分劑

洋桂油 Oleum Cinnamomi, 一至五量滴 (0.06-0.3)

洋桂水 Aquae Cinnamomi, 一至二量兩 (30.0-60.0)

洋桂浮酒 Spiritus Cinnamomi, 五至三十量滴 (0.3-2.0)

洋桂香散 Pulvis Aromaticus, U. S. Pulvis Cinnamomi Compositus, B. P. 成人三十厘 (2.0) 孩童十厘 (0.6) 乃以洋桂 (35.0) 肉蔻 (15.0) 豆蔻 (15.0) 薑 (35.0) 等藥相合製成、在英揀藥册內無肉蔻、孩童成人之腸胃脹患、皆可服之。

丁香 CARYOPHYLLUS, U. S. CARYOPHYLLUM, B. P. 此乃一類樹之花蕾、產於東西印度羣島、當鮮俱有香味、初採者色黃、後則漸變爲深灰、內含一類之精油、其氣易散、名丁香油。

1 Gonorrhœa.
2 Tuberculosis.

藥製與分劑

甘洋杏仁匀藥 Emulsum Amygdalæ, U.S. Mistura Amygdalæ, B.P. 半至一量兩 (15.0-30.0)

甘洋杏仁糖漿 Syrupus Amygdalæ, U.S. 一量錢至二量兩 (8.0-60.0)

甘洋杏仁散 Pulvis Amygdalæ Compositus, B.P. 一至二錢 (4.0-8.0)

洋杏仁油 Oleum Amygdalæ Expressum, U.S. Oleum Amygdalæ B.P. 一至四量錢 (4.0-16.0) 此油無論將甘或苦杏仁用壓力而得、實無毒力。

苦洋杏仁油 Oleum Amygdalæ Amaræ, U.S. 半量滴 (0.03) 此油乃用烝法而得、大有毒力。

苦洋杏仁消水 Aqua Amygdalæ Amaræ U.S. 三十至六十量滴 (2.0-4.0) 此消水乃以苦杏仁油製成。

洋桂 CINNAMOMUM SAIGONICUM, U.S. CINNAMOMUM ZEYLANICUM, U.S. CINNAMOMI CORTEX, B.P. 此藥乃一類樹之內皮、產於西倫島與中華等處、內含一類精油、其氣易散、並含炭匿酸、服毒分劑而殞命者、以其癱人之呼吸也。

療效 此藥之大用有三、一味香、二祛風、三激腸、盟瀉症[1]、服之以激其腸有效、瘔流血[2]緩

1 Serous diarrhœa
2 Uterine hemorrhage

藥製與分劑

洋郁李沖藥 Infusum Pruni Virginianæ, U. S. 半至一量兩 (15.0-30.0)

洋郁李流膏 Fluidextractum Pruni Virginianæ, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0)

洋郁李糖漿 Syrupus Pruni Virginianæ, 半至一量錢 (2.0-4.0)

洋郁李酒 Tinctura Pruni Virginianæ, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

洋杏仁 AMYGDALA AMARA AMYGDALA DULCIS

此藥有甘苦二種、如以苦杏仁加水、即釀出氰藍酸少許、甘杏仁則不然、如以甘杏仁加水搗勻、其味甘美、可作引藥之用、患糖尿者[1]、可以甘杏仁數兩、去淨其中之油糖類、製成面包用之、因其內無糖也、詳見備病者飲食章 腸胃受惹[2]或氣管[3]與喉受惹者[4]、以甘杏仁製成勻藥服之、有平涸膜之功、製法、以甘杏仁半兩、(16.0) 非蔴三十釐、(2.0) 白糖二錢、(8.0) 相合搗爛、加蒸水八量兩、(240.0) 調勻隔渣而成、苦杏仁內含一類之油、油內有氰藍酸百分之二至四不等、故大有毒力、如以一量滴 (0.06) 毒貓可使之立死、曾有服十七量滴 (1.12) 而殞命者、按苦杏仁之功用、乃醫咳嗽症、但不常用、因其毒力甚大也、如製成勻藥、可作藥引之用、患白濁症者、用之最妙、因其兼能醫小便燒痛也、其製法與甘杏仁勻藥之製法同。

1 Diabetes mellitus
2 Irritation of stomach and intestines
3 Irritation of air-passages
4 Irritation of pharynx

加林啤酒 Tinctura Calumbæ, 半至二量錢 (2.0-8.0)

加林啤冲藥 Infusum Calumbæ, B. P. 半至一量兩 (16.0-30.0)

加林啤濃消水 Liquor Calumbæ Concentratus, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

印度龍膽草 CHIRATA, 此草產於印度、亦係苦補藥類、因無炭匱酸含於其中、故可與鐵類同用、頗有感肝之能、如因肝失功用[1]、以致胃不消化[2]、亦不思食、並大便乾燥者、此藥有效。

藥製與分劑

印度龍膽草散	(Pulvis Chiratæ,)	二十釐	(1.3)
印度龍膽草流膏	Fluidextractum Chiratæ	半至一量錢	(2.0-4.0)
印度龍膽草酒	Tinctura Chiratæ, B. P.	半至一量錢	(2.0-4.0)
印度龍膽草膏	(Extractum Chiratæ)	二至四釐	(0.12-0.25)
印度龍膽草冲藥	Infusum Chiratæ, B. P.	一量兩	(30.0)
印度龍膽草濃消水	Liquor Chiratæ Concentratus, B. P.	一量錢	(4.0)

洋郁李 PRUNUS VIRGINIANA, U. S. PRUNI VIRGINIANÆ CORTEX, B. P. 此樹產於美國、入藥者乃該樹之皮。

療效 泰西人常以此皮製成冲藥、為補身之用、如製成糖漿、乃祛痰藥類之引藥也。

1 Torpid liver
2 Dyspepsia

加林啤根 CALUMBA, U. S. CALUMBÆ RADIX, B. P.

此藥乃一類樹根、嘗之味苦、齅之畧香、內含二鹼、一名昇耳昇林、(Berberina) 一名加林啤印、(Calumbina) 此外又有加林啤酸。(Calumbic Acid)

療效 此藥乃補藥中之上品、無炭匿酸含於其中、故無斂力、可與鐵藥並用、熱症後腸胃失其功用[1]、或暑瀉盟瀉等症後、而身體輭弱者、此藥有效、有著名醫者、治腸失功用之良方如左。

加林啤散	℞ Pulveris calumbæ	半英兩	(16.0)
薑散	Pulveris zingiberis	半英兩	(16.0)
辛那葉	Sennæ foliori	一英錢	(4.0)
滾水	Aquæ bullientis	十六量兩	(480.0) —M.

製成冲藥、日服三次、每服二英兩。(60.0)
Fiat infusum. S.—A wineglassful t. i. d.

藥製與分劑

加林啤流膏 Fluidextractum Calumbæ, U. S. 十五至六十量滴 (1.0-4.0)

1 Gastro-intestinal atony

療效　各類苦補藥中、此爲上品、患熱症後而厭食者[1]、癲症[2]、及染瘴症[3]而精神久失者、胃不消化者[4]、服之俱效、孩童育道洏膜炎症[5]、與鈉氯礦强礬並服、大效。

藥製與分劑

龍膽草雜酒	Tinctura Gentianæ Composita,	一至二量錢	(4.0-8.0)
龍膽草流膏	Fluidextractum Gentianæ, U. S.	半至一量錢	(2.0-4.0)
龍膽草膏	Extractum Gentianæ,	一至八厘	(0.06-0.5)
龍膽草雜冲藥	Infusum Gentianæ Compositum, B. P.	一至二量兩	(30.0-60.0)

熱症後厭食者、良方如左。

淡皇强酸	R-Acid. nitro-hydrochlor. dil.	一或二量錢	(4.0-8.0)
馬前子酒	Tinct. nucis vomicæ	一量錢	(4.0)
豆蔻雜酒	Tinct. cardamomi comp.	二量兩	(60.0)
龍膽草雜酒	Tinct. gentianæ comp.	加至四量兩	(120.0) —M.

每飯後服一小勺、(4.0)以水送下。

S.—Teaspoonful in water after meals.

1 Anorexia
2 Gout
3 Malarial poisoning
4 Dyspepsia
5 Catarrh of the alimentary canal

第十六章　論激胃藥類

瓜沙 QUASSIA.　此藥乃係瓜沙樹之木、產於西印度羣島、有苦補藥之效、患瘴熱症後而厭食者[1]、醫者常用此藥大效、或謂其能醫瘴熱症、然不足爲憑、胃不消化、飯後有噫噎之患者、如因胃經被阻[2]、服之有效、將此藥製成冲藥、射於肛內、有殺蟯蟲[3]之能、但先以吊水筒洗淨肛內、後以此藥一至二兩、(30.0-60.0) 加水十六兩、(500.0) 射之、存至十分鐘之久、如此數次、蟲必殺盡矣。

藥製與分劑

瓜沙酒　Tinctura Quassiæ,　半至一量錢　(2.0-4.0)

瓜沙流膏　Fluidextractum Quassiæ, U. S.　半量錢　(2.0)

瓜沙膏　Extractum Quassiæ, U. S.　一至三厘　(0.06-0.2)

瓜沙冲藥　Infusum Quassiæ, B. P.　半至二量兩　(16.0-60.0)

製法、乃以瓜沙一錢、(4.0) 加水十量兩、(300.0) 泡至一日、方可用之。

瓜沙濃消水　Liquor quassiæ concentratus, B. P.　一量錢　(4.0)

龍膽草 GENTIANA, U. S. GENTIANÆ RADIX, B. P.　此草產於歐洲、入藥者乃該草之根、嘗之味苦。

1 Anorexia
2 Dyspepsia
3 Oxyuris vermicularis

早晚服半量兩、(16.0)

S.—A tablespoonful morning and evening.

又方

厄司阿金 R-Exalgini 二十英厘 (2.0)

葡蒸酒 Spirit. frumenti 半量兩 (16.0) —M

化後加 Fiat solutio et adde

糖漿 R-Syrupi simplicis 一量兩 (30.0)

蒸水 Aquae destillatæ 四量兩 (120.0) —M.

早晚服半量兩、(16.0)

S.—Tablespoonful night and morning.

延纏之痺[1]、或痒[2]症之腰痛[3]、如日服此藥四厘、(0.25) 撒婁五厘、(0.3) 三或四次、有效。更有乳寇吞 ("Lactophenin") 與錫托芬 ("Citrophen") 二藥、其體質與此藥相同、分劑亦同、乃五至十厘、(0.3-0.6) 宜日服三次。

芬歐蔻纖塩 (PHENOCOLL) 此藥之功用與體質、皆與芬阿西呑相似、分劑五至八厘、(0.3-0.5) 日服二至五次。

厄司阿金 (EXALGINE) 此藥之效與阿司炭尼利相同、但無退熱之力、脊腦後柱硬之疼痛[4]、此藥有效、初用之分劑、乃二至四厘、(0.12-0.25) 久服者、一日不宜過十五厘、(1.0) 早晚分服、有醫者云、作燒者不宜服、醫系痛症[5]之良方如左。

厄司阿金	℞-Exalgini	三十英厘	(2.0)
甘陳酒	Tincturæ aurantii dulcis	二量錢	(8.0) 一M.
化後加	Fiat solutio et adde		
陳糖漿	℞-Syrupi aurantii	半量兩	(16.0)
薄荷水	Aquæ menthæ piperitæ	加至四量兩	(120.0) 一M.

1 Subacute rheumatism
2 Influenza
3 Lumbago
4 Pain of locomotor ataxia
5 Neuralgia

服過分劑者、於血無甚關係、否則血色混黑、尿色深黃、如將此尿置於非合消水內、似有含糖之狀。

療效 此藥之大用有二、一退熱[1]、一止痛、因醫者初用爲退熱、故先論其退熱之效、作燒者、如服三至八厘、(0.2-0.5) 越半句鐘、其效即顯、並能存至四至八句鐘之久、尋常之燒症、服之則無生汗過多之弊、但肺癆症、與腸熱症之晚程服之、或有汗生不止、或熱度過減者、故雖有退熱之效、不宜多用、以其易於致損也、患熱症者、以海絨蘸冷水擦其身最妙、其止痛之效、凡頭痛[2]、偏頭痛[3]、過用眼力之頭痛[4]、脊髓後柱硬症之痛[5]、脅間系痛[6]、及痹[7]等症、此藥皆效、此等症、安替派林所不能醫者、此藥或可醫之、醫系痛[8]之良方如左。

芬阿錫吞	℞ Acetphenetidini, U. S. Phenacetini, B. P.	十英厘	(0.6)
加非印檸礬	Caffeinæ citratæ	五英厘	(0.3)
錶氣塩	Strontii bromidi	二十英厘	(1.3) —M

分作五包、每二句鐘服一或二包、至痛止爲度。

Pone in capsulas, No. V. S. One or two capsules every hour while the pain lasts.

1 Fever
2 Headache
3 Migraine
4 Eye-strain
5 Pains of tabes
6 Intercostal neuralgia
7 Rheumatism
8 Neuralgia

因分劑過大之故、亦有敷乾散而中毒者、然不多見。

毒力　服毒分劑者、唇藍而紫、先則額與頰生汗、後則遍滿全身、脉弱而緩、後必甚微、至此則呼吸短速、其解法、宜服顛茄、以增其血壓之力、服士的年、以激其呼吸之功、如其皮色甚紫、則宜用吸氣與焌身之法。

積毒　或謂久服足分劑、並無乖效、此言殊謬、蓋久服足分劑者、毒力存於肝腎脾等經、以致有積血之患、且其血紅脒愈久愈減。

芬阿錫吞

ACETPHENETIDINUM, U. S.
PHENACETINUM, B. P.

此藥由煤滷用化法而得、結晶、形如鱗片而發光、臭嘗俱無味、水畧能化之、製藥者如不精心泡製、於腎經甚有惹力、且有他類之乖效、藥行以其價昂、每以阿司炭尼利、或安替派林充售、欲知其眞僞、可以氰強酸加於藥內合勻、至變黃色、置於火上熱之、黃色不改者乃眞、若考驗其純否、可以哥拉五厘(0.3)置於試物筒內、於火上熱之、僅至化開爲止、再以此藥一厘(0.06)加於其內、如係純者、先有紫色、後變紅色、終變藍色、不然則不能有此三等改變。

體功效　此藥有平腦系部之效、其正感乃行於脊腦覺徑、且有減身熱度之力、無論健壯或作燒者、俱能減之、緣有阻身內生熱之力、且有佐祛熱之效也、如服之不久、並不

檀腦氣塩 Camphoræ monobromatæ 六英厘 (0.4) —M.

製成六丸、或分成六包、每半句鐘服其一、以冷水送下。

Fiant pilulæ vel chartulæ, No. VI

S.—Wash down with a little cold water.

此方不但止嘔、且有補心之能、瘡[1]症、以此藥散敷患處有效、破傷[2]亦可敷之、或單用此藥、或與硼酸各等分合用、有免腐之功、鼽[3]患以此藥製成消水洗之有效、咳血[4]症、亦有用之者、但服此藥易於傷風、故患系痛者、冬令遠游、不宜服之。

藥製與分劑

阿司炭尼利 Acetanilidi 二至十厘、(0.12-0.6) 然常以十厘 (0.6) 為過分劑、因此藥水不易化、故宜製之成丸、或置於藥殼內服之、其退熱之效、必至服後一句鐘方顯、各類系痛症、每服加檀腦氣塩半厘 (0.03) 其效尤妙。

阿司炭尼利雜散 Pulvis Acetanilidi Compositus, U. S 五厘、(0.3) 如病者腎經積血、忌服。

免腐 此藥有免腐之效、而無減瘴毒之功。

乖效 此藥如謹慎用之、少有乖效、有醫者查明、顯乖效者、三十八人中、殞命者三人、皆

1 Chancroids
2 Wounds
3 Epistaxis
4 Hæmoptysia

汗、而其退熱之功仍在也。

腎　每有醫者、謂服此藥者、尿中必多含酸質。

祛　此藥藉腎而祛、服後約二十四句鐘祛盡。

療效　此藥用爲退熱之劑、宜先查明病勢、倘身體甚弱、不爲妙劑、腸熱症、雖有退熱之效、然有時服後精神減少、或腦力脫失者、可知此藥之力、但能退熱、不能醫該症也、肺癆症、服之亦然、且生汗更甚、皮膚多有變紫者、健壯者猝然作燒[1]、此藥有效、且不致生汗過甚、故少有腦力脫失之處、肺炎症、用之退熱、又爲妙劑、故近來用爲退熱者、歷年減少矣、系痛症[2]、此藥有止痛之效、失和動之胃痛[3]、髖大系痛[4]、頭痛[5]等症、常效、癇症[6]亦效、痺症[7]、不但退熱止痛、且有醫症之功、必用四至六厘 (0.25-0.36) 之大分劑、日服三次方可、延纏之肌痺症[8]、此藥大效、因用蒙藥而嘔吐者[9]、服之有效、用法、每半句鐘服一厘 (0.06) 至六厘 (0.36) 爲止、並有良方如左。

阿司炭尼利	℞-Acetanilidi	六英厘	(0.4)
加非印檸礬	Caffeinæ citrat.	三英厘	(0.2)

1 Sthenic fever
2 Neuralgia
3 Gastralgia of ataxia
4 Sciatica
5 Headache
6 Epilepsy
7 Rheumotism
8 Subacute muscular rheumatism
9 Vomiting after an anæsthetic

有漸次而顯者、所顯之時、乃一至三句鐘、最久不過三日、有醫者查明、服此藥而顯乖效者、百二十一人內殞命者六人、然究非因乖效、乃因有他病也、故服之者雖有險狀、亦不必過慮、但易致傷風、故冬令出游者不宜服。

毒力　中此藥之毒者、宜用阿刀便等激藥類、且用煖身之法、若皮甚變紫、宜用吸氣之法。

阿司炭尼利 ACETANILIDUM,

此藥乃以冰醋酸、與安呢林、相合製成、色白、結晶、形如砂粒、水畧能化之、醇酒伊打、最易化之、若敷於舌上、畧覺熱力。

體功效　腦部　此藥有平腦部之效、而多受其效者、乃脊腦之覺桂、與其覺系耳、服毒分劑者、全身痳木、失其激反應之功、且動覺二系亦俱被癱。

絡部　如未至毒分劑、於此部無甚關係。

呼吸部　中分劑、與此部無涉、毒分劑、呼吸必速而促、至呼吸司所被癱、則必殞命。

身熱度・服足分劑者、以常理論之、身之熱度必減、究不盡然、毒分劑、則熱度大爲減少、並有腦力脫失而寒顫者、如作燒者服之、因其有阻身內生熱之力、且有助其祛熱之功、故大有退熱之效也、夫熱之所以退者、非因發汗之故、曾有人用阿刀便、止其發

嗓喉炎症[1]、亦可以此法醫之、倘不先用寇卡印、必致重㾦、若用此藥一或二分、加水百分、以代寇卡印噴之亦可、按此藥有止血之效、如以四分加水百分、製成消水、敷患處、或置於噴霧具內噴之有效、非因其有凝血之力、乃因其有縮小血管之能也、如內加炭匿酸消水、二藥即相合而成澱、刷此藥於患處、其效尤妙、流血之痔症[2]、以此藥與寇卡印製成肛彈、用之有效、若不用寇卡印、射後必作痛片時。

分劑　此藥因水易化、故常以水送下、分劑二至二十厘、(0.12-1.3) 初用之分劑、三至五厘、(0.2-0.3) 最爲合宜。

不符之藥　此藥與鐵礬類、錶氯弱鹽、錶氯强鹽、㶳醇、鈉柳礬、哥拉衲透、炭匿酸、氯酒、俱不可合用、如以此藥加於燐氰弱酒內、初變藍色、後變深綠、故此二藥不宜合用、如欲試燐氰弱酒之力存否、可將此藥加於其內、倘不如上變色、則不宜用。

免腐　此藥之淡消水、有免腐阻釀之效、濃消水、有滅穉之功。

乖效　此藥最輕之乖效、手臉之皮色變紫、手生凉汗、足或至冰冷、亦有遍體生汗者、更有皮膚作癢、恍若蟻行者、然常顯之乖效、皮膚生癍、或起大皰也、婦人服之、其乖效較多於男子、若在中年者尤甚、四至十五厘 (0.25-1.0 之中分劑、易顯乖效、有忽然而顯、亦

1 Laryngitis
2 Bleeding hemorrhoids

則可用此藥、惟肺癆症、此藥不爲妙劑、因其常令病者生汗過多、精神短少、有時似無退熱之效、亦有時其退熱效過大、病者至有腦力脫失之處、中暍者、其退熱之效較少、故不宜用、總之無論何等熱症、此藥有暫時減燒之功、究無醫症之力其止痛之效、雖不及鴉片所治之廣、然有數類重症、其效與鴉片同、且無鴉片之乖效、故較鴉片尤妙、系痛[1]症、如因痺癩二症所致、此藥爲上品、若因過用腦力、或因患他症而身弱所致、如與加非印及鋏氣盐同服、其效尤妙、患痺[2]症者、服之而見效者亦頗有之、非但有退燒止痛之效、且有醫症之功、然有時致生汗過度之患、曾有醫者、謂產婦服之、可免產痛之患、然此論未確、如產時疼痛過甚、服十五厘 (1.0) 或效、脊腦後柱硬[3]症、若覺刺痛、且胃嗓兼有夾雜病、此藥爲上品、有醫者謂、糖尿[4]症服之大效、然其所以見效者、必因病者易犯癲症也、柳酸類亦能醫之、系幹痛[5]、射此藥於患處、則有痲效、其效可存數日之久、但射之之處、必作痛片時耳、癇[6]症有效、患啼嗽[7]症者服之、較用他藥尤有確效、分劑、五歲之孩童、每四句鐘服二厘、(0.12) 如皮變紫色則止而不服、然此藥僅能減其咳嗽之遍數、而病之輕重、與未服藥者無甚差別、瘧[8]症、此藥有退熱之效、無醫症之功、新鼻嚏[9]之患、如先將寇卡印消水、置於噴霧具內噴之、再以此藥四分、加水百分噴之、大效、

1 Neuralgia
2 Rheumatism
3 Locomotor ataxia
4 Diabetes mellitus
5 Hypersensitive nerve
6 Epilepsy
7 Whoopingcough
8 Malaria
9 Acute coryza

絡部　多有醫者、研究此藥於禽獸之絡部、毫無關係、然人之絡部、如有虛弱之勢、醫者宜愼用之、有此藥之僻忌者、服之必致血壓之力減少、有暈仆之患、服毒分劑者、如不瘈瘲、則血壓之力亦減、如有瘈瘲、則血壓之力必增、醫者查明、服此藥而顯乖效者、每因分劑過大也。

呼吸部　服毒分劑而死者、因此部被癱之故、中分劑、於此部毫無關係、過分劑、則呼吸較常加速。

身熱度　人或獸如無他症、服中分劑、於身之熱度、無甚減少、如因作燒而服者、則熱度減少、緣其有阻司熱腦系之功、非因生汗之故、即不生汗、熱度亦減耳。

腎　服此藥者、其尿較常爲少、且有護膶之功、故尿中少含氰渣。（即肌膶之渣）

祛　此藥由腎而祛、且甚速。

療效　此藥之用有二、一退熱、二止痛、止痛之用爲最要、其退熱之效、必服足分劑數次方可、若小分劑、雖勤服亦無效、倘用過分劑、必致熱度大減、或有腦力脫失之虞、低熱症忌用、肺炎[1]症、如甚作燒者、可用此藥、或以海絨蘸冷水擦其身尤妙、因冷水較此藥少有危險、而功效尤準、且腎力不廢、心經亦不受阻、紅熱[2]、痘[3]熱二症、如不能用冷水者、

1 Pneumonia
2 Scarlet fever
3 Smallpox

安息香酒 Tinctura Benzoini, U. S. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

安息香雜酒 Tinctura Benzoini Composita, 一至二量錢 (4.0-8.0)

安息香酸餅 Trochiscus Acidi Benzoici, B. P.

鯨頭油抹膏 Unguentum Cetacei, B. P. 此膏乃以安息香鯨頭油等藥製成。

安息香猪脂 Adeps Benzoinatus, U. S. Adeps Benzoatus, B. P. 此猪脂不易改味、製各種抹膏常用之。

安替派林 ANTIPYRINUM, U. S. PHENAZONUM, B. P.

此藥色白、其質細粉、由煤滷用化法而得、嘗之畧苦、臭之無味、水最易化之、醇酒、伊打、哥羅芳、亦能化之、服足分劑者、自覺耳鳴、頭脹、與服貴林同、身熱或減半度、但無異狀、服大分劑、或有惡心嘔吐之患、服過分劑、唇與指甲、畧變紫色、初覺寒冷、後則全身生汗、若原有作燒之症、汗出尤多。

體功效　試以此藥甚大之毒分劑、灌於禽獸、必致全身之肌鬆軟、激反應之功盡失、不能動轉、以至殞命、若僅灌毒分劑、有甚重痙癎二類之瘈瘲、惟知覺尚存、其故因藥力行於大腦、而惹激反應之司所耳、蓋最大之毒分劑、則阻激反應、毒分劑、則增激反應也、然人服中分劑、因覺系與脊腦之覺所被阻、故激反應之能、亦大受其阻、如製成消水、射於皮內、或敷於泗膜、則甚顯痳效、且其效可存數日之久。

體質、故服他類柳礬、如顯煮胃之勢、可以此藥與撒叓或阿匹林、互相遞用、其惹力較阿匹林為小、如醫瘁症[1]、喉門欄炎[2]、腸釀[3]、系痛[4]、肌痺[5]、新痺[6]等症、功用與撒叓阿匹林同、尋常之分劑、八至十五厘、(0.5-1.0) 成人之痺症、有能一日服至六十或八十厘 (4.0-5.6) 者。

安息香 BENZOINUM

此藥乃樹之脂𣗥、產於俗門大拉玻羅加拉巴等處、內含一酸、名安息香酸、此酸有由他藥用升法而得者、但其惹力過大、不宜入藥。

體功效　如以安息香酸之濃消水、敷於涸膜、則有惹力、服過分劑者、畧覺胃內燒熱、有免腐滅穢之力、亦有服之而生團癥者、此酸由腎而祛、成為馬尿酸。

療效　胱久炎症[7]、尿中如含鹼類、且內含硫礬者、服之有效、白濁[8]之晚程、安息香酸、與印度麻同服、有效、有著名醫者云、新痺症[9]、如日服二至三錢 (8.0-12.0) 乃為特藥、其效與柳酸同、但宜用鈉安息香礬、因其易於消化耳、嗓新炎[10]而瘖啞者、以安息香雜酒半兩、(16.0) 置於滾水內、吸其氣、大效、用時宜以布蒙頭、以免藥力散失也、但不可用噴霧具噴之、蓋因易塞其孔也、氣管久炎症[11]、安息香酸有效、日服三次、每服十厘。(0.6)

藥製與分劑

安息香酸 Acidum Benzoicum,　十至四十厘 (0.6-2.6)

1 Influenza
2 Tonsillitis
3 Intestinal fermentation
4 Neuralgia
5 Muscular rheumatism
6 Acute articular rheumatism
7 Chronic cystitis
8 Gonorrhœa
9 Acute rheumatism
10 Acute laryngitis
11 Chronic bronchitis

撒斐分（SALOPHENUM）此藥色白、結晶、形如鱗片、水畧能化之、所以入藥者、因其較撒斐少有毒力、可代撒斐之用、於腸內被陳、與撒斐同、但含柳酸較少、每百分內含五十一分。

療效 此藥之用、與撒斐同、系痺症[1]、如與芬阿錫吞同服、乃爲妙劑、延纏之痺症[2]有效、分劑五至二十厘、(0.3-1.3) 日服三次。

阿匹林（ASPIRIN）此藥亦柳酸礬類之一、色白、結晶似針、水百分、能化藥一分、鹼類之水最易化之、所以入藥者、以其能代柳酸之用、在腸內消化、且在腸內被陳、故可用爲腸內之免腐藥、或謂此藥無惹胃之力、然服時不多用水送之、服後必有胃痛之患、其味較他柳酸礬類畧輕、人易服之、且服者少有耳鳴之患、新痺症[3]、服之有效、分劑十至十五厘、(0.6-1.0 日服三次、喉門梆炎[4]症、初起時、以濕絮蘸此藥末敷之、每六句鐘一次、有效。

服法 可製之成丸、或置於藥壳內、或加非湎糖漿服之、但服時必先搖動其瓶。

耨阿匹林 NOVASPIRIN 此藥色白、形如細粉、齅之無味、嘗之畧酸、水不能化、醇酒易化、每百分含柳酸六十二分、在入腸內能分成柳酸、並他類之酸、人以爲在胃中不改其

1 Neuralgia
2 Subacute rheumatism
3 Rheumatism
4 Tonsillitis

效、喉炎[1]症、日服三次、每服五厘 (0.3) 有效、喉炎[2]久症、倘因血中含尿酸之故、如上服之、則有神效、腸首段洄炎[3]或癀洄炎[4]等症、因其能免腸內食物作釀、故此藥爲上品、白濁[5]症、無論何程服之有效、因其由腎而祛、故尿時可滅尿脘之穢也、腸不消化或腸內食物作釀[6]等患、服之大效、若因食物於腸內變爲毒類、以致血虧或血虧惡症[7]、此藥有效、如因食物變毒而致瀉症[8]、亦爲妙品、因其有免腐之效、且不令大便乾燥、則毒不能存積、與服鴉片不同、似癨症[9]之良方如左。

撒婁	一英錢	℞ Phenylis salicylatis, U. S. / Salol, B. P.	(4.0)
鉍氰下礬	二英錢	Bismuthi subnitratis	(8.0)
錯礹强礬調藥	加至三量兩	Misturæ cretæ	(90.0) —M.

每二句鐘服二量錢、(8.0) 必先搖動其瓶。

S.—Two teaspoonfuls every two hours. Shake well

癨症[10]、近數年來、多以此藥爲上品、但宜置於藥壳內、或成丸服之、分劑五至七厘、(0.3-0.5)

1 Sore throat
2 Chronic sore throat
3 Duodenal catarrh
4 Jaundice
5 Gonorrhœa
6 Intestinal indigestion
7 Mild or pernicious anæmia
8 Diarrhœa
9 Cholera morbus
10 Cholera

益多有服過三十量滴、(2.0) 致胃失其功用者、有著名醫者云、痺症[1]以此油滴於絨布上覆於骨節、再以油布裹之、不使藥力散失、有效又謂此效雖速、或有脫皻之患。

冬綠浮酒 Spiritus Gaultheriæ, U. S. 分劑十至二十量滴、(0.6-1.3)

柳精 SALICINUM, 此精由柳皮用化法而得、結晶、嘗之覺苦、齅之無味、水二十八分、或醇酒三十分、俱能化藥一分、多有醫者醫痺症[2]、以代柳酸之用、且有以之醫痻[3]症者、分劑每四句鐘、服五至四十厘、(0.3-2.6) 置於藥殼內、以水或牛乳送下、飯後服之尤妙。

撒妻 PHENYLIS SALICYLAS, U. S. SALOL, B. P. 此藥色白、結晶、形如砂粒、嘗之無味、齅之畧香、水不能化、醇酒能化、如以酒化後、傾於水內、則成勻藥之形、哥拜把檀香油、松節油、亦能化之、醫白濁症[4]、每與以上三藥之一同用有效、此藥每百分內、含柳酸六十分、𤊷醇四十分、服之藥至小腸、一經脛腺之液、二藥必分、故服過分劑者、有中𤊷醇毒之形狀、如人日服五次、每次二十厘、(1.3) 即服𤊷醇四十厘、(2.6) 是爲過分劑也、有醫者查明、服足分劑者、有惹腎之患、故腎有新炎症者、忌服、然因服此藥而生患者卒鮮、痺症[5]若服柳酸、有惹胃之勢、則宜改服此藥、蓋因其於腸內被喫、胃經毫不受惹、有醫者令人每句鐘服五厘、(0.3) 此係過分劑、若常服之、恐有傷腎之虞、若因傷風[6]而致肌痺[7]系痛[8]等症、此藥有

1 Rheumatism
2 Rheumatism
3 Influenza
4 Gonorrhœa
5 Rheumatism
6 "Cold"
7 Muscular rheumatism
8 Neuralgia

毒力 服毒分劑者、生汗不止、耳鳴且聾、目矇頭暈、熱度減少、大異尋常、脈微、瞼垂、二目內對、後則全身被癱、便溺不覺、尿如青菓之色、先則呼吸畧速而有力、後則甚速而微、及至呼吸被癱、則殞命矣。

鈉柳礬 SODII SALICYLAS, 此礬易化、惹力較柳酸為小、且其味不似柳酸之惡、體功效療效與分劑、俱與柳酸同。有醫者以此藥置於牛乳內、加胃凝糗少許、乳即凝結成塊、藥則含於乳內、人服之胃不受惹、並免其惡味、有醫者常以鋰柳礬代之、以其功效尤妙也。

⿰火益柳礬 (ETHYLIS SALICYLAS. 此藥乃無色之流質、其氣易散、臭嘗俱有香味、功效與他柳礬同、有醫者謂其少有乖效、分劑五至十量滴、(0.3-0.6) 置於藥殼內服之。

冬綠 (GAULTHERIA) 此藥係一類之草、產於美國、內含一油、名冬綠油、其氣易散、別具一種氣息、嘗之味香而熱、每百分中含⿰火米替柳礬。Methyl Salicylas, 九十六分

體功效 因此油含⿰火米替柳礬甚多、故其體功效與柳酸同。

療效 此油之用有二、一改藥味、二醫痹症[1]、可代柳礬類之用、置於藥殼內、或滴於糖上、飯後服之、分劑十至百量滴、(0.6-6.6) 若服至六十滴、(4.0) 而不見效、雖再多服、恐亦無

[1] Rheumatism

柳酸	R-Acidi salicylici	二十英厘	(1.3)
醇酒	Alcoholis	四十五量滴	(3.0)
安息香猪脂	Adipis benzoinati	二英兩	(60.0) —M.

藥散之良方如左。

柳酸	R-Acidi salicylici	十五英厘	(1.0)
粳散	Pulveris amyli	二英錢	(8.0) —M.

醫者欲驗病者之尿、若不得暇、可以此酸少許、置於尿內、免其體質改變、如驗尿含糖與否、則不可用、因此藥能使無糖之尿、形似有糖也。

乖效　服此藥者、或致頭痛耳鳴之患、故有中耳症、不宜輕服、恐使耳聾之患更重也、有服之皮膚生癍、或皮膜腺炎者、亦有服之因眼視衣流血以致目盲者、有醫者云、幼女服之、易有昏譫之勢、又有醫者云、常小產之孕婦忌用、服足分劑者、有時閉目則見異狀、其乖效難以盡述、然少有服之而殞命者。

凡癩症若日久不痊、每兩內宜加此藥二十至三十釐、(1.3-2.0)

藥製與分劑　此藥之氣味、易令人惡心、且有惹胃之力、故常與他藥同服、良方如左。

柳　酸	℞ Acidi salicylici	二英錢	(8.0)
拉芬大雜酒	Tincturæ lavindulæ compositæ	六量兩	(180.0)
甘　油	Glycerini	二量兩	(60.0) —M.

每四句鐘服半量兩。(16.0)　S.—A tablespoonful every four hours.

宜將此酸製之成丸、或置於藥殼內、以水或牛乳送下、否則必有惹胃之患、且宜飯後服之、服後如患耳鳴、可服鈉氣塩二十釐。(1.3)

柳酸抹膏 Unguentum Acidi Salicylici, B. P.　癎皮症、可以此膏敷之。

禁用之狀　腦衣炎、或腦衣積血、中耳炎、尿胞、腎經被阻等症、禁用。

免腐　此藥敷於傷口、有免腐之效、若傷處過大、不宜用之、恐藥被嗽而中毒也、如燙傷[1]不甚大、以此藥一錢、(4.0) 加洋橄欖油八兩、(240.0) 敷之有效、癘瘡[2]與癯瘡[3]類、有醫者以此酸製成抹膏、或研成藥散、敷之、抹膏之良方如左。

1 Burn
2 Soft chancres
3 Venereal sores

以火溫之、射入肛內、孩童減半用之。

S.—Warm and inject into the bowels. For a child reduce this one-half in all its parts.

足生臭汗[1]者、可以此藥撒之、並有良方如左。

柳酸 ℞-Acidi salicylici 半英兩 (16.0)

糡散 Pulveris amyli 半英兩 (16.0) —M.

撒於足上。S.—Apply to the feet.

手臉胞癩[2]症、良方如左。

柳酸 ℞-Acidi salicylici 五至十英厘 (0.3-0.6)

糡散 Pulveris amyli 二英錢 (8.0)

鉦養散 Pulveris zinci oxidi 二英錢 (8.0)

軟煤油蠟 Petrolati, U. S., Paraffini molis, B. P. 半英兩 (16.0) —M.

敷於患處、S.—Apply locally.

1 Bromidrosis of the feet
2 Eczema

越數日、則釘胼脫落矣、但未敷之前、以熱水洗之方可、鞍磨傷[1]之良方如左。

柳酸	R-Acidi salicylici	十英厘	(0.6)
安息香猪脂	Adipis benzoinati	一英兩	(30.0)

敷於患處。S.—Apply to sore part.

痺症[2]之骨節炎、可以鈉柳礬、或鈉氰碳强礬、製成消水、以絨布蘸之、裹患處有效、或用柳酸抹膏敷之亦可、此法不但有益於患處、且有益於全身、蓋因此藥能睞入皮內也、胃鬆大[3]、或胃凋炎[4]等症、病者如有嘔吐之患、所吐者並含立方圓種[5]、此藥有敵該種之效、成人腸內有蛔虫[6]者、每句鐘服此酸八厘 (0.5) 至四十厘 (2.6) 爲止、後服瀉劑、有效、醫蟯虫[7]之良方如左。

柳酸	R-Acidi salicylici	三十英厘	(2.0)
鈉硼烘礬	Sodii boratis	三十英厘	(2.0)
水	Aquæ	十六量兩	(480.0) —M.

1 Soreness from horseback riding
2 Inflamed rheumatic joints
3 Gastric dilatation
4 Gastric catarrh
5 Sarcinæ
6 Ascaris lumbricoides
7 Oxyuris vermicularis

十分、瀫之有效。陰門或肛門作癢[1]之良方如左。

柳　酸	R-Acidi salicylici	二英錢	(8.0)
蔻蔻脂	Olei theobromatis	五英錢	(20.0)
鯨頭油	Cetaceæ	三英錢	(12.0)
肉蔻油	Olei myristicæ	九十量滴	(6.0) —M.

敷於患處。S.—Apply locally.

患釘胼[2]（俗名雞眼）者、以此藥一錢、(4.0) 加水一量兩、(30.0) 用絨布蘸敷、乃爲妙藥、又有良方如左、

柳　酸	R-Acidi salicylici	三十英厘	(2.0)
印度麻膏	Extracti cannabis indicæ	五英厘	(0.3)
火棉酒	Collodii	半量兩	(15.0) —M.

以刷敷數層於患處。S.—Apply with a brush until a good coat is formed.

1 Pruritus of anus or vulva
2 Corns

療效　此藥之力、與貴林相類、醫者初用爲解瘧退熱之劑、未幾查明此酸於瘧疾或退熱、並無大效、惟於痺症甚效、且可止痛、但不能免此症之夾雜病、然服此藥、較不服者、少有夾雜病、蓋因其效甚速、則夾雜病無暇發作、（夾雜病乃心經與骨節帶累之患）非因其有免之之能也、且此藥於痺症、雖不能減作燒之熱度、而能減作燒之日期、患新痺症者、每四句鐘服藥十五至二十厘、(1.0-1.3) 至見功效爲止、若與鈉氰碳强礬十至十五厘、(0.6-1.0) 兼服、可免惹胃之患、而其效尤妙、更有服法、每晚七與九句鐘、服三十至四十厘、(2.0-2.6) 以牛乳送之、爲使病者在寢睡之時、藥力可行於遍身、如病見瘉、不可止而不用、恐其病反復也、此藥於痺症雖有大效、然亦有服之頭痛生汗、而無效者、服此藥既無效、雖用他藥、亦難見效矣、有著名醫者查明、凡此類藥、俱有佐祛尿酸之能、其醫痺症之效亦緣於此、白濁之痺症少效、癘症無效、或有謂此藥於癲症有效者、亦有謂爲無效者、其果否有效、尚無確據、延纏痺症[3]、服此藥而不見瘉者、可以鋏醋礬、或鋏檸礬代之、腰痺[4]骶大系痛症[5]、此藥大效、其醫系痛[6]之能、雖遜於芬阿錫吞、然常患痺症之偏頭痛[7]者、乃有神效、喉門棚炎症[8]、曾有醫者以此爲特藥、如因痺癲等症而致、此藥尤有神效、但宜服小分劑、每句鐘用三厘、(0.2) 口白瘍症[9]、如至皰破之時、以此藥一分、加水二百五

1 Rheumatism
2 Gout
3 Subacute rheumatism
4 Lumbago
5 Sciatica
6 Neuralgia
7 Migraine
8 Tonsillitis
9 Stomatitis

胃瘍症[1]、近數年來、醫者常以此藥醫之、因其有止痛免腐凝血之能也、分劑二至四厘、(0.12-0.25) 置於藥殼內飯前服之。

柳酸 ACIDUM SALICYLICUM,

此藥昔由柳木用化法而得、近乃以排醇、鈉氺、碳氣强洽三者、用化法而得、色白、或成細粉或結細晶、嘗之味甘而酸、色微紅者不宜用、因其不純也、水五百分、或醇酒四分、俱能化藥一分。

體功效 此藥之中分劑、畧有感臘部之力、並減激反應之能、且易使人有耳鳴之患、服毒分劑、有似癇之瘈瘲、因大腦被激也。

絡部 此藥畧有阻絡部之力、如病者虛弱、當慎用之。

呼吸部 尋常之分劑、與此部無甚感能、大分劑、畧有激此部司所之力、服毒分劑而殞命者、蓋因此部被癱也。

身熱度 此藥有退熱之效。

㬹 此藥於胃中變成鈉柳礬而被㬹。

祛 此藥由腎經大便及汗而祛、服後十至二十分鐘、以化法試其尿、則可見之、越三十六至四十六句鐘、則祛盡矣。

1 Gastric ulcer

面膚疽[1]以防浸淫之患、良方如左。

唎瑣辛 ℞-Resorcinolis 七十五英厘 (5.0)

黃蠟與松香 Ceræ flavi et pulveris resinæ 一英錢半 (6.0)

洋橄欖油 Olei olivæ 酌加 —M.

敷患處之四圍。S.—Apply around diseased area.

髮內乾膩過盛[2]者、良方如左。

唎瑣辛 ℞-Resorcinolis 一英錢 (4.0)

蓖麻油 Olei ricini 三十量滴 (2.0)

醇酒 Alcoholis 二量兩 (60.0)

月桂酒 Spiriti myrciæ 四量兩 (120.0) —M.

先以喀司替勃皂洗淨頭皮、擦之、

S.—Use as a lotion to the scalp, after washing with castile soap and water, once a day.

[1] Epithelioma of the face
[2] Seborrhœa capitis

之劑、但其力無多、故今少用之、其大用乃醫皮膚各症、癩[1]疥[2]等病之中程、或久症、良方如左、

喇瑣辛	℞-Resorcinolis	一英錢	(4.0)
鋅養	Zinci oxidi	一英錢	(4.0)
玫瑰消水抹膏	Unguenti aquæ rosæ	十英錢	(40.0) —M.

研勻、置於火上熱之、至喇瑣辛融化爲止、以免皮膚受激、日敷二次。

S.—Apply twice a day to the part affected. After mixing the ointment heat it until the resorcinol crystals melt, to prevent any irritation of the skin.

瘢癩[3]症作癢之良方如左、

喇瑣辛	℞-Resorcinolis	十五英厘	(1.0)
甘油	Glycerini	十量滴	(0.6)
灰消水	Liquoris calcis	一量兩	(30.0) —M.

敷患處。 S.—Apply locally.

1 Eczema
2 Psoriasis
3 Erythematous eczema

洋蘇冰 R-Thymolis 十英厘 (0.6)
鈉硼烘礬 Sodii boratis 十五英厘 (1.0)
水 Aquæ 二量兩 (60.0) —M.

以一量錢、(4.0) 加水半玻璃盃漱之。
S.—Place a teaspoonful of this in half a tumblerful of water and use as a gargle.

嘗有醫者、以為敷傷之用、然藥價過昂、故鮮有用之者、且暑熱時不便用之、因其味引蠅也、分劑半至二厘、(0.03-0.12) 宜置於藥殼內、以水或牛乳送下、可免惹胃之患、嘗有患腸熱症者、一日服三十厘、(2.0) 若服至百厘、(7.0) 必顯中毒之狀矣。

喇瑣辛 RESORCINOL, U. S. 此藥之性、與栟醇相似、用化法而得、結晶透光、其色畧紅。

體功效 此藥有惹泗膜之力、服毒分劑者、耳聾頭暈、流涎、生汗、昏無知覺、且有似癇之瘈瘲、試將此藥射於犬皮內、其脉先緩後速、先緩者、乃因顱臟腑系之被激、後速者、乃緣此系被攤也。

療效 嗃嗽症、[1]以此藥二厘、(0.12) 加水百量滴、(6.6) 製成消水、每服十量滴、(0.6) 有效、置於噴霧具內、由口噴之、其效尤妙、草泗炎症、[2]噴之常有神效、嘗有醫者、以此藥為退熱

[1] Whooping-cough
[2] Hay-fever

薄荷冰	Menthol.	二十英厘	(1.3)
樟腦	Camphor.	二十英厘	(1.3)
洋桂油	Ol. cinnamomi	二量滴	(0.1)
流煤蠟	Petrolati liquidi U. S. Paraffini liquidi, B. P.	一英兩	(30.0) —M.

每三句鐘噴一次、每次十分鐘。

S.—Use in a vaporizer every three hours for a period of about ten minutes.

熏伊打時、以此藥五十分、加醇酒百分、置於吸具內吸之、可免伊打之惹力、哮吼症[1]、噴之有效、英揀藥册內、有薄荷冰貼膏、Emplastrum Menthol, B. P. 乃爲外惹內效之用、並有痳藥之功。


洋蘇冰 THYMOL.

此藥由洋蘇油而得、色白結晶、其形無定、水不能化、醇酒、伊打、油類、俱易化之、有免腐並滅痺毒之能、如多用之則有惹力、腸熱症[2]、有以之爲免腐藥者、服此藥則腸內之傷不至過於潰爛、如殺鉤虫[3]此藥爲上品、口洇炎[4]、或齦炎症、如因用錸藥過多所致、其方如左。

1 Spasmodic croup
2 Typhoid fever
3 Uncinariasis
4 Stomatitis

胃[1]痛症、此藥有祛風之效、分劑一至二厘、(0.06-0.12) 製成藥丸、日服三次、胃泗膜新炎者忌用、此藥於皮膚或泗膜、皆有痳效、故製成筆形之錠、於系[2]痛或頭[3]痛、抹之有效、若以此藥敷於嗓鼻之泗膜、其處之血脂、必至縮小、與敷寇卡印同、然藥效已過、血脂不至鬆大、則與敷寇卡印者不同、鼻嚔[4]新症、以此藥一厘、(0.06) 加烝水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內噴之、或以三厘、(0.2) 加流煤蠟一兩、(30.0) 噴之大效、更有妙法、乃以一玻璃管、口徑四分、長二寸半、內貯此冰、兩端以有孔之塞、下墊紗布、塞其兩端、自一端吸之、有效、用時宜加謹慎、毋令藥晶吸入口或鼻內、因其器有遺力也、如鼻外有皮破之處、

第三十五圖



此圖乃一類大噴霧具、以薄荷冰化開、置於其內、噴之最妙。

用此法過勤、恐成癖患、無論或服或吸、如用之過多、必致顱腦積血、有頭痛之患、更有以化開之薄荷冰、置於大噴霧具內噴之者、見第四十七圖 其方如左。

哥利吞 ℞ Chloreton. 二英厘 (0.12)

1 Gastralgia
2 Neuralgia
3 Headache
4 Acute coryza

將此油滴一滴於棉上、塞入牙孔、有效、按此藥之油、含薄荷冰多者、麻效必大、中國薄荷油所含之冰、較多於美國。

藥製與分劑

薄荷油 Oleum Menthæ Piperitæ, U. S. Menthæ piperitæ Oleum, B. P. 一至四量滴 (0.06-0.25)

薄荷浮酒 Spiritus Menthæ Piperitæ, 十至三十量滴 (0.6-2.0)

薄荷消水 Aqua Menthæ Piperitæ, 一至二量錢 (4.0-8.0)

薄荷餅 Trochisci Menthæ Piperitæ 可噙於口內用之。

薄荷冰 MENTHOL, 此藥乃由薄荷油而得、無色、結晶形成三角、嗅之似薄荷油、水畧能化、醇酒、伊打、油類、俱能化之、孕吐者服之常效、良方如左。

薄荷冰	℞-Mentholis	十五英厘	(1.0)
穀烝酒	Spiriti frumenti	六量錢	(24.0)
糖漿	Syrupi	一量兩	(30.0) —M.

每句鐘服一量錢。 (4.0) S.—One teaspoonful every hour.

薄荷 MENTHA PIPERITA, U. S. 此藥係一類草、入美揀藥冊者、乃此草之乾葉、及生花之梢、鼻嗅之嘗之、俱有香味、因其內含一類香油也、如以此油敷於皮上、不但有激力、且有痳效、其油含薄荷冰、形如樟腦、嘗之有辣味、亦大有痳效。

療效 此藥之用、常以醫腸胃氣脹[1]、及嬰孩痳症[2]、有醫者以此藥之油、加於瀉藥內用之、以免痳患、因此藥之油、香味甚濃、如加於惡味藥內、必易服之、六月至一正歲之嬰孩、患重痳症、且腦部受其牽累者、良方如左。

哥拉	℞ Chlorali hydrati, U. S. / Chloral hydratis, B. P.	十六英厘	(1.0)
鉀溴鹽	Potassii bromidi	三十二英厘	(2.0)
薄荷水	Aquæ menthæ piperitæ	二量兩	(60.0) —M.

每四句鐘以一小勺、(4.0) 加於熱水內服之。
S.—Teaspoonful in a little warm water every four hours.

患系痛[3]者、如用布一小方、滴此油數滴於其上、覆患處有效、切宜斟酌用之、恐有起皰之患、去布之後、如覆處甚作燒痛、可以煤腦或洋橄欖油敷之、其痛即止、患牙痛[4]者、若

1 Flatulence
2 Infantile colic
3 Neuralgia
4 Toothache

或腦部被阻之狀者、按此藥其力一過、熱度卽回、亦有先冷而後燒者、其退熱之效、大約與煤淄之藥類同、其險亦同、究不及浴法之妙、系[1]痛症、無論痛處之深淺、以此藥敷之有效、或以二量滴、(0.12) 加哥羅芳酒十量滴、(0.6) 深射於患處亦可、如以布浸於藥內、敷於皮上、以布捲裹之、痛處卽覺麻木、惟藥布不可久存於皮上、恐身之熱度被減、或受藥力之阻也、有著名醫者云、[2]陽腺炎症、以此藥十五量滴、(1.0) 加甘油四十五量滴、(3.0) 敷於陽囊、亦曰腎囊 則有神效、或以此藥一量錢、(4.0) 加羊毛脂四英錢、(16.0) 製成抹膏、隔日敷一次亦可、因此藥別有一種惡味、人多不喜敷之。

怪阿寇碳強洽 GUAIACOLIS CARCONAS, U. S.

此藥色白、結晶、形如砂粒、每百分內、含怪阿寇九十一分半、碳氣強洽八分半、水不能化、醇酒四十八分、或哥羅芳一分半、能化藥一分、以試紙試之、不改其色、或曰此藥被睞甚緩、祛之甚速、於胃中少有惹力、胃亦無睞之之能、於腸中則變爲怪阿寇、並碳氣強洽、故常用爲腸內免腐藥、瀉腹症[3]、若因腸內食物釀壞、此藥有效、腸熱症[4]、亦常以此藥醫之、分劑二厘、(0.12) 日服三次、癆症[5]服此藥有效、用法與怪阿寇同、但較怪阿寇少有惹胃之患、分劑二至十厘、(0.12-0.6) 常用者乃五厘、(0.3) 日服三次、或置於藥殼內、或製成丸、或研成散、服之俱可。

1 Neuralgia
2 Orchitis
3 Diarrhœa
4 Typhoid fever
5 Tuberculosis

而成、其質似油、其色杏黃、臭之嘗之、無甚氣味、水及淡酒、甘油、俱不能化、醇酒、伊打、哥羅芳、魚肝油、洋橄欖油、俱可化之、或謂此藥多於腸內被嗽惹胃之力、較幾阿蘇爲小、其用與幾阿蘇同、分劑亦同、常用爲祛痰藥、以醫肺癆[1]症、或用爲腸內免腐藥、最妙之服法、乃置於藥殼內服之。

怪阿寇 GUAIACOL, U. S.

此藥乃由椎木幾阿蘇、用化法而得、售之者雖自言甚純、然不純者亦多、水八十五分、能化藥一分、醇酒伊打、最易化之、如熱至八十三度半、則化流質、此流質乃人所常用者。

療效 肺癆[1]症、歐洲多有醫者、以此藥代幾阿蘇之用、分劑五至二十量滴、(0.3-1.3) 置於藥殼內、若與魚肝油、或洋橄欖油同服、最妙、若加伯蘭地亦可、氣脘炎[2]症之中程、或久症、以此藥五至十量滴、(0.3-0.6) 置於滾水內、每日吸其氣三或四次、有效、喉門櫥微核[3]新炎症、可以此藥用刷敷患處、乃最妙之法、患熱[4]症者、以此藥三十至四十量滴、(2.0-2.6) 敷於腹或胸或股上、片時即有退熱之效、約二三句鐘、藥力已至極處、宜視病者熱度何如、可再如法敷之、如欲見大效、敷藥後以油布裹之、不使藥力散失方可、有著名醫者云、敷此藥後、有身熱減七度、不顯乖效者、亦有醫者云、敷此藥後、遂顯心弱、

1 Tuberculosis
2 Bronchitis
3 Acute follicular tonsillitis
4 Fever

置於吸具之海絨上吸之。

S.—To be placed on the sponge of an inhaler and inhaled.

嗬嗽[1]症、如以白布浸此藥、掛於病室、或謂大效、孩童之腹統[2]癆或肺癆[3]等症、以此藥置於加脫梅之魚肝油內、射肛有效、分劑五至十五量滴、(0.3-1.0) 食滯[4]症、如因食肉不化、或因食糖過多、以致腸胃氣脹、每飯後以半至二量滴、(0.03-0.12) 置於藥売內服之、大效、牙痛[5]者、以絮浸藥、塞入牙孔、有效、緣其有痲覺系之力也、按此藥無乖效、或略有腹痛之患、然用大分劑、宜詳查其有中毒之勢否、倘其頭暈痛、心神恍惚、或尿色發黑、與中炸醇毒者相似、此皆中毒之兆、宜立減其分劑、或止而不服。

藥製與分劑

幾阿蘇水 Aqua Creosoti, U. S. 一至三量錢 (4.0-12.0)

幾阿蘇調水 Mistura Creosoti, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

幾阿蘇抹膏 Unguentum Creosoti, B. P.

毒力 此藥之毒力、與非醇同、解法亦同。

幾阿蘇碳強洽 (CREOSOTI CARBONAS,) 此洽乃幾阿蘇九分、與碳氯強洽一分、相合

1 Whooping-cough
2 Peritoneal tuberculosis
3 Pulmonary tuberculosis
4 Indigestion
5 Toothache

日服三次、每次以半量兩、(16.0) 加水二量兩、(60.0) 服之。
S.—A tablespoonful in a wineglassful of water three times a day.

有時病者、每日可服此藥六十量滴、(4.0) 然初服之分劑必小、後則日增、服此藥而見效者、多在增至大分劑之時、肺癆症[1]之晚程、服之可止其乾嗽、亦有潤喉祛痰之效、喉炎[2]之中程、良方如左。

椎木幾阿蘇	℞-Creosoti (beechwood)	一至二量滴	(0.06-0.12)
薄荷冰	Mentholis	四英厘	(0.25)
阿波冷	Alboleni	一量兩	(30.0)

置於噴霧具內、日噴喉數次、又方
S.—To be used in an atomizer several times a day.


椎木幾阿蘇	℞-Creosoti (beechwood)	十量滴	(0.6)
哥羅芳浮酒	Spiriti chloroformi	十量滴	(0.6)
煉酒	Spiriti vini rectificati	二十量滴	(1.3)

1 Advanced stage of phthisis
2 Subacute laryngitis

祛 此藥由腎而祛、亦畧有由肺而祛者、然不甚速、必越一日、方能祛淨。

療效 近數年來、多以此藥滴於海絨上、令病者吸之、以醫癆症[1]、或效、氣脘久炎症[2]、滴於滾水中、吸之大效、且可減口中之惡味、用爲服劑亦可、初服之分劑、二至五量滴、(0.12-0.3)有服此藥而胃失功用者、若再服之、不但無益、必致有損、病者如作燒、嘔血、乃爲禁用此藥之狀、若

第五十二圖



此圖乃一類熏幾阿蘇之具、係以鉦片穿微孔所成、具前置海絨、將藥滴於海絨上、合於口鼻、令病者吸之、

所吐之痰內多膿與涎液[3]、可以此藥置於藥殼內服之、或加牛乳半盃亦可、並有良方如左。

椎木幾阿蘇	℞-Creosoti (Beechwood)	三量錢	(12.0)
龍膽草雜酒	Tinct. gentian. comp.	一量兩	(30.0)
煉　酒	Spiriti vini rectificati	八量兩	(240.0)
白葡酒	Vini xerici	二量磅	(960.0)

1 Pulmonary tuberculosis
2 Chronic bronchitis
3 Mucopurulent expectoration

腤內似㾓症之狀、身內亦常有變脂之處、服過分劑者、每致喑啞非因藥挨近聲筋之故、乃因被喫後、藥力行於嗓內也、每有割症後、用絮蘸敷此藥、因被喫而中毒者、其中毒之先兆尿溷而不清、或腦部被阻而不安、且腎被惹而腰痛者、旣見此兆、宜速換他藥爲妙。

解毒法　化學中之解毒藥、乃鎂硫强礬與鈉硫强礬等、緣此二藥與本藥相合、成一不消化之礬、且有瀉腹之功、亦可服熱非酒水、並當用煖身之法、且將毛地黃士的年等、射於皮內、以激其絡與呼吸二部、並用莫非以止其痛、亦可用吐劑、若胃經之功用已失、用胃抽器抽之方可、此藥如染於手上、宜速浸於醇酒內、以解其毒、服過分劑者、若以酒解之、則少有效、緣無人能服純酒也。

幾阿蘇 CREOSOTUM, 此藥由櫸木 Beech Wood 乾蒸而得者、乃入藥用、色淺黃、與洋橄欖油相似、嘗之味辣、別具一種氣息、大有免腐之力、每百分內含怪阿寇六十分、幾蘇四十分、有時怪阿寇、亦可代此藥之用、見怪阿寇篇 分劑一至二量滴、(0.06-0.12) 常用者、多由煤滷而得、但其效較小、以化學而論、此藥與煤醇無甚分別、然其效迥乎不同。

體功效　與煤醇同。

藥製與分劑

炥醇抹膏 Unguentum Phenolis, U. S. Unguentum Acidi Carbolici, B. P.

炥醇甘油 Glyceritum Phenolis, U, S. Glycerini Acidi Carbolici. B. P.

流炥醇 Phenol Liquefactum U. S. Acidum Carbolicum Liquefactum, B. P. 一至二量滴 (0.06-0.12)

炥醇餅 Trochiscus Acidi Carbolici, B. P.

炥醇肛彈 Suppositorium Acidi Carbolici, B. P

乖效 以此藥三分、加水百分、用布蘸之、裹於手指、或足趾上、該處之血脈、必受其阻、或有成痳之患、若裹於他處則不然、乃因血脈不盡受阻也。

毒力 此藥之性甚烈、乃爲最毒之藥、但少有知之者、服毒分劑者、或立時而死、或延至數句鐘而死、其立時而死者、乃因呼吸司所停止之故、延至數句鐘而死者、必大顯胄道發炎之狀、以致嘔瀉甚重、腹痛如燒、且遍體生汗、面瘦容戚、呼吸短促、脈速而微、幾不能診、至腦力脫失而死、口內或無本藥之味、但令洇膜有縐摺之形、若服雜者、洇膜發黑、純者發白、且胄道之洇膜、有一定之形狀、藥挨洇膜之處、必成死塊、中有白點、點外圍紅、白點亦有變黑之時、如剖腹驗之、藥味仍存其內、腦、腎、肝、脾、俱積黑血、有時氣

薄荷冰	℞-Mentholis	五英厘 (0.3)
煤醇	Phenolis, U. S. Acidi carbolici, B. P.	十英厘 (0.6)
玫瑰水抹膏	Unguent aquæ rosæ	一英兩 (30.0) —M.

敷於患處。 S.—Apply locally.

有醫者云、痘[1]熱症生皰時、如每日以刷蘸此藥、遞次刷其一處、或以針蘸此藥、遞刺其皰、可免膿盛、並可減燒、亦可免其痘痕、瘰癧[2]過大症未生膿之前、以此藥二分、加蒸水九十八分、用五至十量滴、(0.3-0.6) 射於瘰內、大效、花柳瘰癧[3]炎症、先以噴霧具噴伊打於患處、令其麻木、後以此藥八厘、(0.5) 加蒸水一量兩、(30.0) 射十量滴、(0.6) 於瘰內、此法最妙、滑膜久炎[4]症、每三日如法用一次、有效、癤[5]癰[6]等症初起時、用此法醫之、可免生膿之患、近日少以此藥爲敷傷之用、惟常加洋橄欖油調和用之、若割開之癆瘻膿瘡[7]、醫者常以此藥之純者、敷於割口、以助其速於收斂、前數年醫者常以噴霧具噴此藥於傷口、近日查明、其益不敵其所損也、按此藥減瘴穢之能無多、若以一二分、加水百分、則穢與其菌亦可滅其多半。

1 Smallpox
2 Enlarged glands
3 Bubo
4 Chronic synovitis
5 Boils
6 Carbuncles
7 Tubercular sinus

常用。

祛　此藥由腎而祛、服毒分劑者、腎經被惹最甚、每致尿閉、或尿色黑紫、然非因尿含血也。

療效　此藥不常用爲服劑、但有數症、服之大效、如胃系被惹、食則嘔吐者[1]、可服半至二量滴、(0.03-0.12) 若腸失消化之功、合物釀壞、以致瀉症[2]、可服二至四量滴、(0.12-0.25) 如與鉍氰下礬十至二十厘、(0.6-1.3) 同服、其效尤妙、肺疳[3]或肺癆[4]等症、如以此藥五至十五厘、(0.3-1.0) 加水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內、由口細密噴之、庶能達於患處、且能止嗓內作癢、而能止嗽[5]、近多用幾阿蘇代之、因其功效尤大也、痳[6]、嗓瘍[7]、口白瘍[8]等症、可以此藥一分、加水七十五至一百分、漱之、或用噴霧具噴之有效、嗓炎症、亦可如法醫之、口白瘍症、如用木籤、蘸此藥之濃汁點之、有效、燙傷[9]、以此藥一量錢、(4.0) 加洋橄欖油一量兩、(30.0) 敷之最妙、按此藥本有麻效、故於趾甲入肉[10]、或指筋鞘炎[11]等、輕割症用之、可止其痛、癀症[12]作癢時、以此藥十厘、(0.6) 加洋橄欖油四量錢、(16.0) 敷之大效、皰癬[13]症、新炎已過時、以此藥十量滴、(0.6) 加硬煤油蠟一兩、(30.0) 敷之有效、癩[14]症作癢、皮癢、或扁癮[15]等症、良方如左。

1 Nervous vomiting
2 Diarrhœa
3 Gangrene of lung
4 Tuberculosis
5 Cough
6 Diphthēria
7 Ulcerated sore throat
8 Stomatitis
9 Burns
10 Ingrowing toe-nail
11 Felon
12 Itching of jaundice
13 Weeping eczema
14 Pruritus
15 Lichen planus

第十五章　論退熱藥類

炥醇 PHENOL. U.S. ACIDUM CARBOLICUM, B.P. 此藥由煤滿用蒸法而得、別具一種氣息、其色無常、純者清而淺黃、其體結晶、如以藥十五分加水一分、則變爲流質、宜貯於深黃瓶內、嚴密塞之、並當藏於暗處、如透空氣、則變爲流質、水、醇酒、伊打、哥羅芳、甘油與他油類、俱能化之、雜者濁而棕黑、本係流質。

體功效　此藥敷於皮上、初則色白而痛、後則麻木、覺系失其功用、如敷於洄膜、以上之狀尤顯、且有潰力、然因能凝胎、故潰力不能深入。

腦部　此藥敷於無恙之皮、該處之覺系必被癱、服毒分劑者、大腦司所、俱受其阻、以致昏迷、但少有痠癱之狀、若在獸類、則多有之、蓋因脊腦動系、與全身之肌、俱未受阻故也。

絡部　服毒分劑者、絡部被阻特甚、司絡腦所被癱、必於舒時停止、服中分劑、與本部毫無關係。

呼吸部　服大分劑者、呼吸較常粗而急、服毒分劑者、多因此部被癱、以致殞命。

身熱度　服中分劑、略有減熱度之能、無病者、與作燒者同、因其退熱之力不大、故不

洋桂油　Ol. Cinnamomi.　一量滴 (0.06) — M.

置於藥殼內、日服三殼。

S.—To be made in one capsule, three of which are to be taken each day.

如試人腎經之功用合宜與否、以此藥一釐、(0.06) 加水十量滴、(0.6) 製成消水、射於肌肉之內、合宜者、越十五至三十分鐘、尿中宜有藍色、且宜至三十六句鐘祛淨、否則不得謂腎經之功用合宜也、胸統膜或腹統膜有積液之患者、如腎經無恙、亦可用此藥、以查其液被暕否、用法以此藥一至三釐、(0.06-0.2) 製成消水、射於積液之中、後令病者服瀉劑、(瀉劑能激發各類之液速於被暕) 如於尿中不見藍色、則知其必因囊膪四圍發脹、塞而不通、以致液不被暕也。

乖效　服此藥者、常不甚顯乖效、即顯乖效、亦不過畧覺頭暈惡心、或尿脬澀滴刺痛、如兼服肉蔻散、則少有此等乖效也。

療效　惡癓[1]之患、有醫者曾以此藥製成消水射之、但未必定有功效、或謂疕[2]疽[3]等類之惡癓、以此藥半至二厘、(0.03-0.12) 加水少許化之、每日或隔日射一次、癓必不長、繼則縮小、後則脫落、終則速於收斂、但不可以此為驗案、只可於不可割之癓用之、能止其痛、而免其臭、如其癓可割、總以割治為宜、瘴症間熱者[4]、此藥減輕之功、雖不及貴林、但有人不能服貴林、或服之而無效者、此藥有效、推而言之、此藥不但能醫此類瘴症、即各類瘴症皆能醫之、然究不如醫此類症之功效為大也、孩童之瘴症、其效尤妙、但必在寒戰之先七至十句鐘、服之方可、即病退之後、仍宜服之、至血中無瘴蟲而止、不然恐病復發也、分劑、成人每四句鐘二至四厘、(0.12-0.25) 五歲之孩童、每五句鐘一至二厘、(0.06-0.12) 近有醫者、於偏頭痛曾以此藥醫之、分劑一至二厘、(0.06-0.12) 日服四次、或云日服十五厘、(1.0) 亦不為過多、用法以此藥與寇拉相和、置於藥殼內服之、白濁[5]之初程、有醫者謂以此藥醫之、能減其病期、且有良方如左。

脒藍替連	℞ Methyl thioninæ hydrochlorid	二英厘	(0.12)
檀香油	Olei santali	三量滴	(0.2)
哥拜把	Oleoresinæ cubebæ	三量滴	(0.2)

1 Malignant growths
2 Sarcoma
3 Carcinoma
4 Malarial fever
5 Gonorrhœa

烝水 Aquæ destillatæ 二疊磅 (960.0) —M.

先將傷內之污物取出、以紗布條、蘸此消水覆之、再將乾絮覆於其上、後以布條、輕輕裹之、紗布雖速於變乾、必越數日、方可以此消水溼而去之、如該處有皰、用針挑破、再如法用藥、此次之紗布、宜越七日再揭、甫敷藥時、略有疼痛、片時即止、不但免生膿之患、且使速於收斂、不結瘢痕、按此藥大有染黃之力、故醫者用時、宜著庫秋手套、如受傷甚重、兼有腎炎者、則宜謹慎敷之、以免中毒。

藍燦替連 METHYLTHIONINÆ HYDROCHLORIDUM, U S.

此藥色綠、結晶、形如砂粒、亦有時係古銅色、大於砂粒、形成三稜者、醇酒能化、水易化之、若製消水、其色深藍、因英文之名、與燦藍色相似、故多有將此二藥誤認者、誠爲可惜、蓋此藥可爲服劑、燦藍色不可爲服劑也、如欲分別此二藥、可各製成消水、以鈉洸分置於其內、果係此藥、即變成靑蓮之色、若係燦藍色、必變成紅紫之色、猶有分別之法、以此二藥之消水、各傾於試筒內、消水之面、與試筒四圍附着之處、色綠者即係此藥、色藍者乃係燦藍色、按此藥由腎而袪、故服者尿有藍色。

郁加列油 ℞-Olei eucalypti 一量錢 (4.0)

洋杏仁油 Olei amygdalæ expressi 一量錢 (4.0) —M.

分置十殼內、日服三次、每飯後服一殼。

Pone in capsulas No. X.

S—One t. i. d. after meals.

如因瘧或瘴症以致頭痛者[1]、此油大效、鼻洒膜炎症[2]、將郁加列托洗之、有效。

藥製與分劑

郁加列油 Oleum Eucalypti, 五量滴 (0.3)

郁加列托 Eucalyptol, U. S. 五厘 (0.3) 置於藥殼內服之。

匹克酸 (ACIDUM PICRICUM) 此藥結晶、不一其形、或如鱗片、或似針、其色淡黃、臭之無味、昔者嘗用之以醫瘧症、亦作染料之用、以其能使燙傷[3]收斂、故醫者常製成消水用之、良方如左。

匹克酸 ℞-Acidi picrici 七十五至百二十英厘 (5.0-8.0)

醇酒 Alcoholis 二量兩半 (75.0)

1 Rheumatic or malarial headache
2 Nasal catarrh
3 Burns

瘧者、亦有鼻或齦流血不止者、如以鈉溴鹽十厘、(0.6) 與麥奴之小分劑同服、可免耳鳴之患。

郁加列 EUCALYPTUS. U. S.

此乃一類之樹、原產於奧司大利亞、入藥者、係此樹之葉、葉內所含者、名郁加列油、Oleum Eucalypti, 有免腐之效、油內所含者、名郁加列托、Eucalyptol, U. S. 形似樟腦、製法將郁加列油與鋏沘同烝之而成、此油之用與郁加列托同、油類、醇酒、伊打、皆能化之、水不能化。

體功效 敷此油於皮上、則有惹力、如服十至二十量滴、(0.6-1.3) 先有激力、後有平胃之效、如服之過多、胃則失其功用、且有瀉腹之患、所瀉者有油味、脈則畧速而有力、或致甚重之頭痛、服毒分劑者、血壓熱度身力呼吸、一並減少、或腿之覺系失其功用、及呼吸停止、遂至殞命。

祛 此藥由皮腎腸肺而祛、中毒者、尿中或含香味。

療效 瘧熱症[1]、若貴林不便、或病者有服此藥之癖忌、可以郁加列油代之、氣脆炎[2]之晚程、因此油由肺而祛、故大有效、置於藥壳內、或成匀藥、服之皆可、白濁[3]之晚程、服之亦效、良方如左。

1 Malarial fever
2 Bronchitis
3 Gonorrhœa

貴尼甸硫强礬 (Quinidinæ Sulphas)

三礬之分劑、俱較貴林多一倍。

辛寇那冲藥 (Infusum Cinchonæ,)　一量兩 (30.0)

辛寇那酒 Tinctura Cinchonæ,　一至二量錢 (4.0-8.0)

辛寇那雜酒 Tinctura Cinchonæ Composita,　一至四量錢 (4.0-16.0)

此酒大有補力、因其內含辛寇那鹻無幾、故醫瘧症無效。

辛寇那流膏 Fluidextractum Cinchonæ, U. S. Extractum Cinchonæ Liquidum, B. P.　五至十五量滴 (0.3-1.0)

辛寇那膏 (Extractum Cinchonæ)　五至十厘 (0.3-0.6)

辛寇那酸冲藥 Infusum Cinchonæ Acidum, B. P.　一至二量兩 (30.0-60.0)

禁用之狀　胃炎、胱炎、腦衣炎、癎腦炎、中耳炎等症、貴林忌用、因此藥每致積血、而惹患處也、有此藥之癖忌者、亦忌用。

乖效　如人無服藥之癖忌、鮮有中此藥之毒者、曾有一三十六歲婦人、一次服三百厘、(20.0) 而不殞命者、始則昏迷不醒、呼吸甚短、脉緩、耳聾、目矇、過半月、目始復原、有服貴林之小分劑、忽致腦力脫失、目暫失明者、或因中耳積血、致兩耳重聽者、且有全身發

貴林氯盐 ℞-Quininæ hydrochlor. 十五英厘 (1.0)

鈉氯盐 Sodii chloridi 十五英厘 (1.0)

烝水 Aquæ dest. 二量錢半 (10.0) —M.

用時宜加烝水一量兩、(30.0) 置於火上沸後隔渣、乘溫射之。

S.—This should be injected, after an ounce of distilled water has been added to it. The solution should be boiled and filtered, and used while warm.

貴林有阻心之力、故宜緩射、最妙之射處、乃小腿之盂。

辛寇泥甸 (Cinchonidina)

辛寇年 (Cinchonina)

貴尼甸 (Quinidina)

皆係辛寇那之鹻、俱有醫瘴症之功、然其力較貴林減半。

辛寇泥甸硫强礬 Cinchonidinæ Sulphas, 此藥之苦味、較貴林畧輕、或云服之者、無耳鳴頭脹之患。

辛寇年硫强礬 Cinchoninæ Sulphas, U, S.

甘油	Glycerini	三十量滴	(2.0)
蒸水	Aquæ dest.	三十量滴	(2.0) —M

熱而用之。
S—Warm solution before using it, and do not add acid.

又方

貴林氯鹽	R-Quininæ hydrochloridi	十五英厘	(1.0)
醇酒	Alcoholis	十五量滴	(1.0)
蒸水	Aquæ dest.	九十量滴	(6.0) —M

再加輕氯酸數滴、使藥化盡、而後射之。
S.—Add a few drops of hydrochloric acid to complete solution before using.

如用貴林雙硫強礬為射藥、化開時、宜加菓酸五分之一、或加硫強酸亦可、否則恐射後連膶之鹼液、使藥力沈澱而不被陳也、如以貴林硫強礬用為射藥、宜將此藥十厘、(0.6) 加水一量錢 (4.0) 後以硫強酸滴滴加之、至礬化盡為止、最妙之射處、乃臂大肌皮內、髖大凸、與髖凸之中、如射於腓處、則痛難忍、受重瘴症、義大利有某著名醫者、將貴林射於盂內、其方如左。

(0.25-4.0) 服時如無他故、不宜化開、因其味甚苦也、如必須化開服之、宜多加酸類、以減其苦味、或置於藥殼內服之亦可、平常之服法、乃製成丸、外裹糖衣、然須謹慎、恐日久糖衣堅硬、胃不能化、至化於腸內、則無功效矣、因其於鹼液中沉澱、而不被吸也、不能服丸藥之孩童、良方如左。

貴林氯盐	℞-Quininæ hydrochlor.	十六英厘	(1.0)
甘草流膏	Fluidextracti glycyrrhizæ U. S. Extracti glycyrrhizæ liquidi, B. P.	一量錢	(4.0)
陳皮糖漿	Syrupi aurantii cort.	二量兩	(60.0) —M

三正歲之孩童、日服三次、每服一量錢。(4.0)

S.—A teaspoonful t. i. d. for a child of three years.

亦可將貴林炭匿磬、加於寇寇內、以免惡味、如以上之法、用之不便、可將貴林氯盐、製成肛彈用之、每彈內含貴林氯盐二至三厘 (0.12-0.2) 切宜謹慎、毋使肛內之洇膜被惹、如用以射皮、貴林氯盐最妙、良方如左。

貴林氯盐	℞-Quininæ hydrochloridi	七英厘	(0.5)

近、或不至受其傳染喉炎[1]或鼻嚏[2]等症、以此法噴之有效、痢症[3]如因阿咪吧所致、可以貴林一分、加水三千分、射於肛內神效。

藥製與分劑

貴林氯塩 Quininæ Hydrochloridum, 一至十厘 (0.06-0.6) 此乃貴林中最妙者、水十分能化藥一分。

貴林雙氯塩 Quininæ Hydrochloricum Acidum, B. P. 一至十厘 (0.06-0.6)

貴林雙硫强礬 Quininæ Bisulphas, U S. 水八分能化藥一分、每厘 (0.06) 內含貴林一厘之三分之二、(0.04)

貴林甘松礬 (Quininæ Valeras)

貴林硫强礬 Quininæ Sulphas, 此藥最難消化、然為人所常用者、每厘 (0.06) 內含貴林一厘之四分之三、(0.045)

貴林炭匿礬 (Quininæ Tannas,) 此藥與貴林中苦味畧輕、每厘 (0.06) 內含貴林一厘之四分之一。(0.015)

以上諸礬塩、俱可用為補藥、分劑一至四厘、(0.06-0.25) 如醫瘴症、可服四至六十厘、

1 Sore throat
2 Colds
3 Amœbic dysentery

因其能滅血確所生之鼓也、如以貴林爲防瘴藥、宜日服三次、每服二至四厘、(0.12-0.25) 蘊患此症者、尿內含血、若在寒戰服之、有時不但無益、反致有損、因其有惹腎之力、無凝血之能、腎經被惹、流血必多、故醫此症、只宜在寒戰之前、寒戰既止、則積血可免、腎不積血、自無尿血之患矣、瘴熱惡症[1]、亦宜服之、且當以六十至七十厘、(4.0-4.6) 射於肛與皮內、亦有時可射於盂內、額痛之瘧症[2]、或瘴系痛症、大有功效、平常之系痛[3]、亦效、瘟熱腸熱二症、若以之爲退熱劑、無甚功效、惟瘴症之熱能退之、熱症見瘳、服之或能退熱、緣其有補效也、按其補效、不盡因其味苦、亦緣其能增血紅輪也、補藥之分劑、一至二厘、(0.06-0.12) 日服三次、[扌宮]弱難產者、服之可增[扌宮]力、近數年少用之、因更有他妙藥也、若孕婦服之、雖與孕無關、然易患小產者、或有小產之虞、如與鋏氣鹽或鴉片同服、則免此患、孩童肺葉炎症[4]、可製成肛彈用之、每彈內含貴林二厘、(0.12) 日用三次、有效、人遇耗腦力[5]或身力之事、如服貴林二至四厘、(0.12-0.25) 其力不致耗竭、孩童之啼嗽[6]症、服之有效、分劑、一正歲者一厘半、(0.09) 二正歲者三厘、(0.2) 每增一歲、加藥一厘半日服三次、由早六句鐘服起、後每隔八句鐘服一次、若以一至二厘、(0.06-0.12) 加水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內、每二三句鐘、噴於未患啼嗽孩童之口內、雖與患此症者相

1 Pernicious malarial fever
2 Brow ague or malarial neuralgia
3 Neuralgia
4 Lobar pneumonia
5 Mental or physical strain
6 Whooping-cough

呼吸部　服貴林之小分劑、畧有激此部之能、毒分劑、則大有阻此部之力。

身熱度　健壯者、若服貴林、於其熱度無甚關係、惟患瘧熱症者服之大有退熱之效、因其本有醫此症之能、非緣其有減身熱之力也。

㖦　貴林惟在胃中被㖦、不能被㖦於小腸、因小腸含有鹼液也、故服之者宜用藥散、或以藥殼最妙、如用藥丸、必用新製者、否則胃不易㖦。

祛　貴林多由腎而祛、亦有在肝經爲氣所變者、且祛之不見甚速、服後必待一刻鐘、於尿中用化法或可見之、過二十四句鐘、方能祛淨。

𦛗癈　貴林有阻𦛗癈之能。

育道　如以貴林一分、加水萬分、仍有苦味、有激胃之效、但服之過多、則胃反被阻、小分劑、則大便畧燥、大分劑、或致腹痛。

療效　貴林之入藥者、其大用有三、一解瘧、[1] 二退熱、三滋補、如患瘧症者、血內有一類之穉、貴林有滅之之力、若於未服之前、服祛膽瀉劑、其效尤妙、服法、每句鐘、可服貴林之小分劑、或每日服足分劑一二次、但宜在寒戰之先二句鐘服完、庶免其症復作、或寒戰將至、置於水內、加氫氯酸數滴、使之易化、服之或可免其寒戰、如已見汗亦可服之、

1 Malaria

第十四章 論解瘧藥類

辛寇那 CINCHONA, U. S., CINCHONA RUBRA, U. S. CINCHONA RUBRÆ CORTEX, B. P.

此係一類之樹、出於南亞美利加之皮路國、今印度、及印度羣島多種之原有三十一種、含貴林最多者只有數種、入藥者、乃此樹之皮、分黃紅淺灰三色、內含數種之鹻、貴林爲最要、黃辛寇那皮、所含貴林尤多。

體功效 服貴林過多者、則耳鳴、頭暈、口鼻失職、亦或有目失其功用者、越片時、則耳聾頭痛、而耳鳴之患、尤難忍受。

腦部 服貴林者、大腦被激、如仍服不止、則有積血之患、服毒分劑者、積血尤甚、終則靈性俱失。

絡部 患熱症者、服貴林有平此部之效、試將貴林驟射於犬之頸盂內、雖用小分劑、藥力必立時至心、心即被癱、惟入服之則有補效、血運畧速、血壓加增、全身皆得其補力、若服十五厘(1.0)之足分劑、血運之功、則受其阻。

血 用過分劑、凝血之能、越於尋常、中分劑則不然、貴林於紅白血胅、甚有關切、久服中分劑者、紅胅必增、膿腫將起時、如服貴林之足分劑、可免血白胅穿衊、而阻生膿之患。

液一量兩、(30.0)以此盟一量兩、(30.0)射於脊腦潤衣間、不但能使之痊癒、且能免其遺患、不用此盟、雖或不至死亡、而耳聾目盲、或他類之遺患、亦所不免、患此症時、脊腦之液必濁、及射此盟之後、則變清、且增白膆食罏之力、並雙點罏亦被阻而不長、及病癒後、不可止而不用、宜日射一次、以防復發、如已有復發之勢、仍宜如前射之。

⿸疒需[1]症、或因受傷與割症後、致患膿穫症、皆此穫之所致、用此盟最妙、心內衣瘍炎症、用此盟或係妙法、有時患癠症與紅熱等症、亦兼患膿穫症者、病者必有二類傳染、即本病傳染與此穫傳染也、按人所論此盟之效、宜與敵癠盟相等、但多有不及敵癠盟之時、其故或因病者所受之穫、非盡係鍊穫、必兼受他類之穫、既兼受他類之穫、則用此盟時、只阻此一類之穫、與他類穫毫無阻力也、醫者宜詳察病者果受此穫之染否、方可用之、其用法與用敵癠盟同、分劑每十二句鐘、射二量錢半至五量錢 (10.0-20.0) 酌病用之、宜由著名藥行中購用。

敵白濁點穫盟 (ANTIGONOCOCCIC SERUM) 此盟乃由羊血製成、其大用係醫白濁痺[2]症、用法、以半至一錢半、(2.0-6.0) 每二至六日、射於皮內、或肌內、有效、惟射於腹皮內最妙、射後該處常顯激力、或發炎、或生團瘢、並膝棚有腫脹之勢、全身亦常顯激力、身熱加增一或二度、且脉動畧速、以上受激之狀、越一二日退盡、若用之醫白濁之尿脘炎、或精腺冠炎、功效不甚顯然、其故尚未知也。

敵腦衣炎盟 (ANTIMENINGITIS SERUM) 此盟乃著名醫者、將腦衣炎雙點穫、射於馬蓋內、係後取出其血而成、患腦衣炎[3]者、如及早射之、多能復原、用法先以空針從脊腦取出腦

1 Erysipelas
2 Gonorrhœal rheumatism
3 Meningitis

力、若過一二日、豚鼠即死、則知毒力已足、再以此分劑之十倍、射於馬盂內、馬雖不易受此毒、因分劑過大、必患痧症、越十日則瘉、再十倍其分劑射之、因其分劑尤大、馬又患此症、如此射法、至所射之分劑、較初用時多數百倍、馬仍無恙、其血中大有敵毒之質、於是放出其血、使盟與脎分開、貯而存之、患痧症者、射於身內、神效、售盟者、當先試其所製之力如何、可以豚鼠死亡分劑十倍之痧毒、射於身內、後射盟一量滴半、(0.1)如能救其不死、則每十五量滴(1.0)能救獸類一百、必有如此敵毒之力、方爲一度也、此盟之一度不以分量論乃以力量論　如醫者所用之盟、每十五量滴、(1.0)只含一度之力、射於人身、必用大分劑、方能見效、故製盟者、宜多射痧毒於馬身內、以激其血、多生敵毒之質、至每十五量滴、(1.0)能含百度之力乃佳。

用法　痧[1]症初起時、射此盟三千度、則不至殞命、如病已至數日、必多射之、方能有效、若病勢甚重、亦有不能救之者、最妙之射處、乃二膊骨之中、病者且少受疼痛。

敵痙盟 (SERUM ANTITETANICUM) 此盟如用於受傷時、其效與敵痧盟相等、如病勢已顯、無效、因此症之毒穢、由傷口已入腦部、故不能救之。

敵鍊穢盟 (SERUM ANTISTREPTOCOCCUM) 此穢入血、則血一被染、必患膿[2]穢症、若產[3]後熱症與

1 Diphtheria
2 Septicæmia
3 Puerperal fever

第十三章　論敵症盟類

各類之敵症盟何以能醫病、其故人不盡知、所論者、不過醫家之臆度耳、謂人身各類之脒、與其宜用之育料、有連合之能、所以有此能者、因脒能發出數類之小囊、各囊有所應取之育料、不相紊亂、取足其所宜取者、脒則另發小囊、如必多用某類之囊、脒則多發之、倘脒被激所發者過其所用、不能用者、即脫於血中、凡各種傳染症所生之毒素、乃一類之腥、與育料相似、故脒囊取之、脒即消滅、而病勢顯矣、如痘熱紅熱等症、不必人皆患之、其不患者、亦不受傳染、因其脒所發之囊、不取此類症之毒素耳、有數類症、人生只患一次者、其故因脒多發取此毒素之囊、脫於血中、後若再受此毒、囊雖取之、因其不與脒連、脒則不受其害、故無二次之患。

第五十一圖



此圖表明敵穉毒之質、如何由脒分出、與毒素相敵、

敵痧盟 SERUM ANTIDIPHTHERICUM, U. S.

先以痧毒一量滴半、(0.1) 射於豚鼠身內、以試其毒

力耗竭嬰骨軟[1]突目[2]等症、服之有效、惟腦力耗竭與嬰骨軟症、不但有助受育之功、且有平腦部之力也、按藥中能增血內白脒者、大概以此藥爲最、故服之或能增加白脒至三倍之多、惜其味不美、人多惡之、置於酒內、或製丸服之、俱可、分劑三至五厘、(0.2-0.3)每餐後服一次、但服此藥時、必多飲牛乳爲宜、蓋牛乳有養身之功也、如病者胃失功用、宜先醫胃經、後服此藥。

乳腺膏 (EXTRACT MAMMARY GLAND) 此乃以羊乳腺製成、近之醫者、多以之醫產後瘖不復原[3]或他類瘖流血[4]及血癇[5]等症、有效、有醫者謂瘖生筋瘤[6]者、此藥雖不能療治、然能阻其生長、分劑五厘、(0.3) 日服三次、如流血甚多、考日服六次亦可、或謂服過分劑、則有心跳之患、然足分劑、或有助受育之功、按醫者所論、此藥醫瘖軟筋瘤流血、不如醫瘖硬筋瘤流血之功爲大也。

利沛年 (LIPANIN) 此藥乃以油酸六分、洋橄欖油百分製成、可代魚肝油之用、其擅長之處、乃在易成勻藥、不難消化、且無惡味也、初服之分劑一量錢、(4.0) 後可增至四量錢、(16.0) 凡各類耗膶之症服魚肝油有效者、服此藥亦每有效、如每日三次、兼服鈉硫下礬、鐵硫下礬等十厘、(0.6) 其效尤妙、若宜服改症藥類、兼服鋏氣盐亦可。

1 Rickets
2 Exophthalmic goitre
3 Subinvolution of the uterus
4 Uterine hemorrhage
5 Metrorrhagia
6 Uterine fibroids

射於患處、或距患處稍遠射之、射後藥與腡互感之效、如射瘰癧素然、但未射之先、宜查明病者、曾患骨癧肺癆瘰炎等症否、如果患之、雖痊瘉日久、用此藥亦不甚穩妥、恐患處復發也、亦有病者曾患發炎而非瘰炎者、雖炎勢已過、而腡終未復原、若用此藥或射或服、藉藥腡互感之效、該處亦能復原也、按射此藥者、越數句鐘、其效即顯、服之者其效稍緩、亦有服之不顯功效者、射後感腡之力、約存五句鐘之久、有醫者以此藥能使瘢瘕變軟、能祛瘢腡、故有時用之以祛瞭瘢之患、亦有醫者用之醫耳鼓變厚、或中骨不靈、以致耳聾[2]者、然雖有此效、而用之者少、其故尚未知之、近有醫者、以此藥與鈉砒霜礬製成冷水能化之藥、以便製成消水之用、然此消水遇氣最易改其體質、如以二十量滴、(1.3) 此二十量滴內含此藥三厘 (0.2) 置於玻璃管內、嚴密封之、乃可久存不壞、即為一次之用、最妙之射處、乃射於肌內、或謂如此射之、亦不覺痛、用此藥者、美國較少於德國、蓋多以其有危險也。

卵黃素 (LECITHIN) 此藥由卵黃而得、色黃、成塊、為人身內所含之物、腦中含硫多處、則含此物亦多、而血脒中亦畧含之、醇酒、伊打、哥羅芳、油類、俱能化之、腦部失其功用[3]、或因腦癆症而腦部大受其阻、且身體甚顯虛弱者、服之有效、各類腦力虛弱之患、如腦[4]

1 Corneal opacities 4 Nervous exhaustion
2 Deafness
3 Neurasthenia

卵腺膏 (OVARIAN EXTRACT) 此乃由羊取出、製之成膏、亦可製之成散、婦女經絕[1]、或因病割取卵腺之後、而腦部失其功用者、服之每效、且不顯乖效、故可久服、初服之分劑、每日二至四厘、(0.12-0.25) 後可漸增、至見功效爲止、倘毫無功效、即應止服、因其功效無常、故重視此藥者有之、輕視此藥者亦有之、最妙之服法、乃製成藥輪也。

腥氣塩 (IODALBIN) 此塩乃以腥與氣製成、近年始入藥用、其中所含之氣、較鋏氣塩所含者、約少一半有奇、然用此塩時、分劑僅等於鋏氣塩、其功效即與之同、蓋此塩所含之氣、一入腹中、必與腥相分、被嗽於身內、鋏氣塩不能如此也、分劑五厘、(0.3) 酌病增減。

賽歐司民 (THIOSINAMINE) 此藥乃由一類草根之精油、或芥子之精油、加醇酒與錏沘消水以火熱之而得結晶、形成三稜、溫水二分、能化藥一分、醇酒伊打、俱能化之、此藥之消水、以藍試紙試之、色不變紅者乃佳、分劑日服半至一厘、(0.03-0.06) 如分劑過大、恐有惹胃之患、若胃不受惹、則可增至三厘、(0.2) 路浦司[2]癥瘤[3]、用之有效、醫癥瘤症、以此藥一分、加醇酒十分、製成消水、每三或四日、用空針射十至二十量滴、(0.6-1.3) 射時常覺甚痛、厥後患處每顯青腫、尿亦增多、或有兼惡心嘔吐者、醫路浦司症、以此消水

1 Menopause
2 Lupus
3 Keloid

皮內、既無惹力、又無乖效、肺癆症[1]兼有血虧[2]而虛弱[3]者、此藥有效、射分劑、乃一厘之四分之一、至四分之二、(0.015-0.03) 服分劑、乃二至四厘、(0.12-0.25) 有醫者謂服此藥者、不但口有蒜味、胃亦受惹、射皮內之良方如左。

鈉砒霜礬	℞ Sodii cacodylatis	百英厘	(6.6)
炥醇	Phenolis, U. S. / Acidi carbolici, B. P.	一量滴	(0.05)
蒸水	Aquæ destillatæ	三量兩	(90.0) —M.

以此方置於火上沸之、後以滅穢之濾具過之、加滅穢蒸水三量兩、(90.0) 射於皮內、分劑十五至二十量滴、(1.0-1.3) 按此藥在人身內、不易分開、故能服大分劑、但其病宜速受砒感者、此藥不爲妙劑、醫者宜切記之。

銾核礬 (MERCUROL) 此乃銾與核素製成之礬、水易化之、無凝胎之力、與惹力、有滅膿穢之功、或曰以滅白濁點穢、此藥爲最、故白濁[4]與白濁眸炎症[5]用之大效、如醫白濁症、以似盟鹽消水百分、加藥半至一分、射於尿脘內、如病勢甚重、加藥二分亦可、製消水時、宜將藥撒於水面上、爲使其易於融化也。

1 Tuberculosis
2 Anæmia
3 Debility
4 Gonorrhœa
5 Gonorrhœal ophthalmia

於患處、用噴霧具噴之亦可。

胸棚 (GLANDULÆ THYMI) 此藥之大用、乃醫癭[1]症、且無乖效、與脾棚不同、亦有用之以代脾棚者、如人胸棚消瘦過早服之有效、初宜服小分劑、每七日分服半兩、(16.0) 後每七日服一兩。(30.0)


賽魚湽 THIOL 此藥乃由棕色之煤蠟、或由作煤氣時所餘之油類、用化法而得、可代魚石湽之用、價直較廉、且無其臭味、分爲二種、一係流質、名流賽魚湽、色深棕、質似油、鰓之與樺木油相似、以試紙試之、無改色之能、醇酒、伊打、署能化之、水易化之、製成消水、過光而不改其本色、如加甘油少許、則製消水較易、一係定質、名乾賽魚湽、放光、形如鱗片。

療效 此藥之體功效、雖與魚石湽相似、而其效未必相同、蓋魚石湽醫病之能、迴異尋常、無藥能及之也、路浦司[2]、濕癬[3]、癯皮等症、此藥俱效、如醫濕癩症、先以滅穢之消水洗淨患處、以乾賽魚湽製散敷之、或以乾賽魚湽一分、加水十分、製成消水、以布蘸熏敷、亦可、骨節有滲出之質[5]、或謂以此藥祛之、其效與魚石湽相等、但用之者少、未可確信。

鈉砒霜礬 (SODII CACODYLAS) 此藥色白、形成細粉、水易化之、其用與砒同、如以此藥射於

1 Goitre
2 Lupus
3 Moist eczema
4 Syphilides
5 Exudates about joints

第五十圖



此圖表明腎上腺精如何增血壓之力設有一犬其先血壓如常至箭鏃處射此藥一厘之一千六百分之一(0.00004)於盍內其血壓立增

喉之割症、如敷此藥、可免流血之患、療傷風草泗炎、眸炎、眸癧炎等症、必有泗膜積血之患、敷之大效、心與絡部猝受阻時、士的年所不能激者、射此藥於盍內、常效、如吸哥羅芳者絡部被阻、以此法射之、庶可救其生命、割症後如有腦力猝衰之勢、亦可射於盍內、射法以腎上棚精消水、(此消水乃腎上棚精一分加水十分而成)一至二量錢、(4.0-8.0)再加似盟盐消水一量磅、(480.0)用空針射於盍內、但不可過濃、恐射處之血受阻、穉得生機、致有成疥之患。

藥製與分劑

枯腎上棚 Glandulæ Suprarenales Siccæ U. S. 三至十厘、(0.2-0.6)日服三或四次。

外用 以腎上棚精氣盐 (Adrenalin Chloride) 一分、加似盟盐消水千至萬分、用絮、蘸之、敷

1 Asthma
2 Coryza
3 Hay fever
4 Conjunctivitis
5 Trachoma
6 Sudden cardiac failure
7 Vascular relaxation in chloroformization
8 Surgical shock

鮮脾腺三至十五厘(0.2-1.0)初服一厘、(0.06)後則日增一厘、(0.06)服至六厘、(0.36)宜停而不增、後當視其病勢、以增減之、但不可越十五厘。(1.0)

脾腺消水 Liquor Thyroidei, B. P. 五至十五量滴、(0.3-1.0)

乖效　服過分劑者、頭必甚痛、心經被阻、亦或有嘔吐之患、見此等乖效、宜止服數日、如欲再服、必先用微分劑、漸次加增方可、初服此腺者、宜用小分劑、並令病者躺臥、不食油膩、則少有乖效。

腎上腺 (GLANDULÆ SUPRARENALES)

此腺與其精、近數年來、醫者多用之、大顯功效、如敷此腺、能使細脈與纖縮小、服之、全身之脈亦受感而縮小、日本化學家他哈米尼者、先得其精、名腎上腺精、(Adrenalinum) 色白、結微晶、加氫氯酸數滴、水能化之。

體功效　將此腺之膏或精、敷於洇膜上、能令纖管縮小、血不能入、以致洇膜發白、至藥效已過、則纖運血如常、不見鬆大、與敷寇卡印者不同、服此藥者、脈必遲緩、蓋因顱臟腑系被激也、且脈管縮小、血壓加增、以致運血之功、畧受其阻、實因脈管被激、非由司絡腦所被激也、與盂毫無關係。

療效　凡細脈流血[1]之患、以此藥敷傷處、乃為上品、鼻衄[2]患、經旺[3]、崩[4]等症、其效甚妙、鼻耳喉

1 Hemorrhage　4 Metrorrhagia
2 Epistaxis
3 Menorrhagia

枯牌棚 GLANDULÆ THYROIDEÆ SICCÆ, U. S. THYROIDEUM SICCUM, B. P.

牌棚缺功[1]、或胎生牌棚缺功[2]者、近數年來、多用羊牌棚爲特藥、其效甚妙、蓋此等症、乃因牌棚消瘦也、最妙者、乃以枯牌棚研末用之、如枯者不便、服鮮棚數厘亦可、但其味不美、如略煎或煮之、其不美之味雖減、而其力亦減矣、若人不能每日得此鮮棚、將鮮棚臠碎、用甘油等分、置於其內泡之、越一日、置於布內壓出其汁、此汁能存而不壞、可服三至十五量滴、(0.2-1.0) 病者甫瘉、切勿止而不服、宜日服微分劑、或每月中服足分劑數日最妙、恐其病復作也、肥胖過度者[3]、服之而見大效者有之、毫不見效者亦有之、蓋因此棚不只消減脂胭、亦消減肌胭、故服時病者當多食肉類、與含氰之物、不然則身力必漸減少、但服此棚者、如多食葡糖、必有糖尿之患、故肥胖而兼有糖尿症者、忌服、新狂[4]、憂鬱[5]、產後狂[6]、經絕狂[7]等症、服之有效、如服至一月而不見效、即可止而不服、惟突眼癭症、不可服、近有醫者云、顯瘈瘲[8]之兆者、如服足分劑、可免此患、蓋因此棚有利小便、並袪尿腥基之能也。

藥製與分劑

枯牌棚 Glandulæ Thyroideæ Siccæ, U. S. 一至五厘 (0.06-0.3)

英枯牌棚 Thyroideum Siccum, B. P. 三至十厘 (0.2-0.6)

1 Myxœdema
2 Cretinism
3 Obesity
4 Acute mania
5 Melancholia
6 Puerpera insanity
7 Climacteric insanity
8 Eclampsia

蒲流膏 Fluidextractum Taraxaci, U.S. Extractum Taraxaci Liquidum, B.P. 半至二量錢 (2.0-8.0)

魚石灊 (ICHTHYOL)

此藥乃由一類變石之魚、用乾烝法而得、其色深棕、別具一種氣息、原分二種、一名鈕魚石灊、一名鈉魚石灊、內含硫質百分之十、其功效多緣於此、體質似漿、但鈉魚石灊較鈕魚石灊尤濃、水能化之。

療效 近二十年來、新入藥用之品、未有過於此者、其大用乃醫節痺新症[1]、宜以此藥半兩、(16.0) 加猪脂、或羊毛脂一兩、(30.0) 製成抹膏用之、用法先以此膏敷患處、再攤於布上纏之、可減其痛、如以後骨節不靈、仍以此膏搓之有效、瘋症[2]、敷之亦爲最妙之品、宜先洗淨患處、以藥敷之、再攤於布上貼之、如面患此症、可將所貼之布、剪作數孔、以露其口眼鼻也、更有數症、因此膏過濃、其力甚大、宜以此藥一分、加猪脂、或羊毛脂四分、製膏用之、若腥腺炎[3]、癬症[4]、路浦司[5]、瘢瘤[6]等之久皮症[7]、以及凍傷[8]、凍瘃[9]、燙傷[10]等患、敷之俱效、瀝癧過長[11]、搓之有效、筋扭新傷[12]、如顯腫勢、搓之亦效、乳頭裂症[13]、敷之有效、但乳嬰時、務要洗淨、否則恐嬰不欲食之矣、若鼻臭症[14]、以此藥四十厘、(2.6) 化於一兩 (30.0) 流煤蠟內、敷於鼻孔中有效、瘖外膶炎症[15]、而有滲出之質、存於盆內者、盆卽尻骨俗稱爲尻骨盆 以此藥製成陰彈、塞至瘖頸、大效、服分劑一至十厘、(0.06-0.6) 成丸用之。

1 Acute articular rheumatism
2 Erysipelas
3 Acne
4 Eczema
5 Lupus
6 Keloid
7 Chronic skin disease
8 Frostbites
9 Chilblains
10 Burns
11 Lymphatic enlargement
12 Acute sprains
13 Fissure of the nipple
14 Fetid ozæna
15 Periuterine exudations

醇酒、伊打、哥羅芳、俱能化之、水不能化。

療效 癰症昔多以此藥醫之、近日用者少、痺症[1]、昔常以此藥醫之、近則多以他藥代之、喉門[2]癰新炎症、如以此藥三十厘、(2.0) 加卵青調勻服之、或可敵禦此症使之就痊、有著名醫者云、常犯癲[3]症者、如日服此餅三次、每服五厘、(0.3) 漸增其分劑、至十厘 (0.6) 爲止、可免此患。

藥製與分劑

怪阿克酒	Tinctura Guaiaci, U. S.	五至六十量滴	(0.3-4.0)
怪阿克錏淝酒	Tinctura Guaiaci Ammoniata,	十至六十量滴	(0.6-4.0)
怪阿克調水	Mistura Guaiaci, B. P.	一至二量兩	(30.0-60.0)
怪阿克餅	Trochiscus Guaiaci Resinæ, B. P.	每餅內含此藥三厘	(0.2)

蒲 TARAXACUM, U. S. TARAXACI BADIX, B. P.

此係一類之草、各處皆有之、因其味苦、故有補效、肝失功用者、古時常用其鮮根以醫之、乾者無效。

藥製與分劑

蒲膏 Extractum Taraxaci, 五至三十厘 (0.3-2.0)

1 Rheumatism
2 Acute tonsillitis
3 Gout

解毒法　服毒分劑者、無藥能解之、惟炭匿酸署敵此毒、宜用吐藥與胃抽器、並用鴉片、以止其痛、服油類藥、以平其育道、如有腦力脫失之勢、宜用熜法以熜其身、服伯蘭地以激其心、且宜射阿刀便以激其絡部、或有幾希之望也。

洋茯苓 SARSAPARILLA, U. S. SARSÆ RADIX, B. P. 此藥產於中亞美利加、服之者似無體功效、惟署有補力、如與他藥同服、有輔助之功、癨症有時鉸氯盐所不醫能者、若專用此藥、亦無功效、必二藥並用方可。

藥製與分劑

洋茯苓雜糖漿 Syrupus Sarsaparillæ Compositum, U. S. 一至四量錢 (4.0-16.0) 此藥以洋茯苓、並洋黃樟、甘草、冬綠、辛那等藥製成。

洋茯苓雜流膏 Fluidextractum Sarsaparillæ Compositum, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0) 此膏所用之藥品、與雜糖漿同。

洋茯苓流膏 Fluidextractum Sarsaparillæ, U. S. 半至四量錢 (2.0.16.0)

洋茯苓濃雜消水 Liquor Sarsæ Compositus Concentratus, B. P. 二至八量錢 (8.0-30.0)

怪阿克 GUAIACUM, U. S. GUAIACI LIGNUM, B. P. 此藥係一類之樹、產於西印度、內含一楠、名怪阿克楠、此楠

不同。

哥枝禁子葡酒	Vinum Colchici Seminis, U. S.	二十至四十量滴 (1.3-2.6)

病重者、可服六十量滴、(4.0) 此乃最妙之品。

哥枝禁根膏	Extractum Colchici Cormi. U. S.	半至二厘 (0.03-0.12)
哥枝禁子流膏	Fluidextractum Colchici Seminis, U. S.	二至四量滴 (0.1-0.25)
哥枝禁子酒	Tinctura Colchici Seminis, U. S.	十五至六十量滴 (1.0-4.0)
哥枝禁子酒	Tinctura Colchici Seminum, B. P.	五至十五量滴 (0.3-1.0)
哥枝禁葡酒	Vinum Colchici. B. P.	十至三十量滴 (0.6-2.0)
哥枝禁膏	Extractum Colchici. B. P.	一厘之四分之一至一厘 (0.015-0.06)
哥枝禁印	Colchicina, U. S.	一厘之百分之一至五十分之一

(0.0006-0.0012) 成丸服之。

毒力　服毒分劑者、先則惡心、腹痛、重瀉、後則瀉泗液、肛急漸次加重、口流涎沫、腦力脫失、以至殞命、但鮮有便血者、若服此藥之葡酒一量兩、(30.0) 必致腹痛甚重、漸至殞命、絕無他望。

哥枝禁印雜膏 ℞-Extracti colocynthidis compositi 十至二十英厘 (0.6-1.3)

閙羊花膏 Extracti hyoscyami 二英厘 (0.12) —M.

製成四丸、病將發時可服一丸。Fiant pilulæ No. iv.

S.— One as soon as threatened by an attack.

如兼大便結燥、此方尤妙、見瀉效後、服哥枝禁根葡酒三十至四十量滴、(2.0-2.6) 越十二句鐘、再服二十量滴、(1.3) 若久癲久痺二症、兼服鋏𣱉盐有效、其良方如左。

鋏𣱉盐 ℞-Potassii iodidi 半至一英錢 (2.0-4.0)

哥枝禁子葡酒 Vini colchici seminis 百二十量滴 (8.0)

白葡酒 Vini albæ 加至三量兩 (90.0) M.—

宜貯於瓶內、每飯後服半量兩、(16.0) 用時必先搖動之。

S.— Tablespoonful three times a day after meals. Shake well before using.

用此藥者、不宜令人瀉腹過甚、恐有危險、亦可用哥枝禁印日服三次、每服一厘之百分之一、至六十分之一、(0.0006-0.001) 以醫癲症有效、如與冬綠油同服尤妙。

藥製與分劑 此藥未經泡製者不宜服、其製成之酒與膏、在英美揀藥册中、所論之力

油加脛梅之足分劑、射於肛內者、以脛梅能助其消化之力也、亦有再加幾阿蘇五至十量滴、(0.3-0.6) 射之者、以幾阿蘇能使藥不變壞、且於被嗽後可以祛痰也。

濃硃強酸 ACIDUM PHOSPHORICUM, U. S. ACIDUM PHOSPHORICUM CONCENTRATUM, B. P. 此酸少入藥用、分劑二至五量滴、(0.1-0.3) 常用者、乃淡硃强酸、Acidum Phosphoricum Dilutum, 分劑二十至六十量滴、(1.3-4.0) 此藥有補力之效、亦有激胃之能、體功效與硃不同、不能養育腦部、故不可代硃之用。

鉛硃強礬 CALCII PHOSPHAS PRÆCIPITUS, U. S. CALCII PHOSPHAS B. P. 詳見錯篇

鉛硃下礬 CALCII HYPOPHOSPHIS, B. P. 詳見錯篇

哥枝禁 COLCHICI CORMUS, 此藥係一類之花、內含一轆、名哥枝禁印、其子與根、皆入揀藥册、但常用者乃其根。

體功效 此藥敷於皮上、則有惹力、服足分劑者、大便必多含膽液、亦有嘔瀉膽液者、過分劑、有惹育道之力、中分劑、於身熱度、及腦絡呼吸等部、無甚感能、惟毒分劑則大顯阻力、中此毒而殞命者、乃先停呼吸、後停心經、因育道受惹、遂促之殞命矣。

療效 此藥之大用、乃醫瘋[1]與久痺[2]等症、患新瘋症者服之、必腹痛、或輕瀉、方能見效、此藥無防症之能、或有服之而病發反速者、醫新瘋症、宜先服瀉劑、頁方如左。

1 Gout
2 Chronis rheumatism

服此藥乃爲妙劑、癆[1]症尙未成形、服之有效、因其有養育之能、並有改症之效、若已成形、服之無效、如仍服之、必有惡心或瀉腹之患、緣其不能消化也、久痺症[2]、服之大效、如病在肌內、其效尤顯、癧皮症[3]而兼血薄[4]者、服之常效、瘰癧過長[5]、如不生膿、或生膿遲緩者、有效、癧眸炎症[6]、服之大效、癗症晚程[7]、並嬰骨軟症[8]、服之亦效、衰瘦症[9]、此藥最妙、如嫌其味惡、不欲服之、以此藥擦身亦效、骫大系痛[10]、腰痺[11]、系痛[12]等症、服之有效、如因血薄之故、其效尤妙、有醫者云、氣腫症[13]有效、若年邁者、顱腦胃經無恙、但時患頭暈[14]、可與貴林之小分劑同服、或效、如不見效、可服麥奴流膏與銕氣鹽。詳見麥奴篇

服法　此油之味甚惡、如能設法服之、亦可減少其味、久之自不覺矣、孩童最易服之、凡服之者、宜先用小分劑、置於牛乳內、猛然吞下、可免其味觸鼻、惟在飯後二三句鐘最妙、蓋此藥必在小腸內、方能消化、此時胃中之食物、將送入小腸、藥可隨之而入也、服後再服脭梅少許、以助其消化之功、有先將鈉氯鹽少許、置於口內而服之者、服後再食鈉氯鹽少許、可助其消化之功、兼免惡味、陳皮糖漿、亦能減少其味、或置於藥壳內服之亦可、初服者、如心中作惡、恐不易再服、故先只在晚餐後服之、隔數日、每餐後亦可服之矣、藥行內、有魚肝油勻藥數種、雖云其味不惡、然人仍不易服、近有醫者、用此

1 Phthisis
2 Chronic rheumatism
3 Strumous skin diseases
4 Anæmia
5 Enlargement of lymphatic glands
6 Strumous ophthalmia
7 Advanced syphilis
8 Rickets
9 Marasmus
10 Sciatica
11 Lumbago
12 Neuralgia
13 Emphysema
14 Giddiness

不符之藥　此藥於金類之蔘、亞銻類之藥、不可合用。

蘇作多 (SOZOIDOL) 此藥乃用化法而得、如傷口不淨以此藥五分、加水百分、製成消水洗之、不但能滅穢、且滅瘴毒、口白瘍新症[1]、喉洇膜炎症[2]、可敷此消水、白濁眸新炎症[3]、嬰孩眸膿炎症[4]、以此藥二分、加水三十分、製成消水、洗之有效、痞頸洇炎[5]、以此藥製散、撒於絮上、自陰道塞至患處有效、至於他類洇膜炎、醫者雖未嘗用此藥、不過因其入藥年少、未經查驗可用與否、按理而論、宜有功效。

魚肝油 OLEUM MORRHUÆ, 此油乃由一類海魚而得、分白黃淺棕三色、白色爲人所常用者、但淺棕色者、功效尤大、此藥中最要之質、乃氯與氰、且有硫强硝强等酸、以出自挪危者爲上品。

體功效　此油有佐身熱之功、最易消化、服之者、膶內之脂加增、血紅脒亦增、其大效不盡在油、乃在所含之各質、故醫者用化法查明、按其質之多寡、化合成油、名曰莫胡拉、Morrhuol 以代此藥之用、亦效、其三至五厘 (0.18-0.3) 與此藥六十量滴 (4.0) 之力相等、惟養育之能、究不如此油之大、易患傷風者、用之有效。

療效　人之肺經、雖未受瘰癧之毒、而氣脘洇膜、每易發炎、如此景況、即爲癆症之先兆[6]

1 Acute stomatitis
2 Laryngeal Catarrh
3 Acute purulent conjunctivitis
4 Ophthalmia neonatorum
5 Catarrh cervix uteri
6 Pre-tubercular stage of phthisis

哥羅芳、火棉酒、俱能化之、醇酒畧能化之、宜貯於深黃玻璃瓶內、可代黃氣之用、氣味不似黃氣之惡、或謂此藥較黃氣不易中毒、有時用之、較黃氣尤妙、亦有時其效不如黃氣之大、但視其病何如耳、以其敵桿種點種之力、不及黃氣之大、故敷於濕皮症類、其效不甚顯然、若乾皮症類、則有大效、遺瘰毒之瞭炎[1]、如以此藥散、每日撒之、大效。

挪色分 (NOSOPHEN) 此藥亦爲氣礬類、其色灰黃、無味、不易融化、惟鹼類能化之、功用與黃氣同、體質較黃氣輕四倍、用時宜將傷處之膿痂洗淨、敷於活腡之上方可、倘不洗淨、其效必少、但於未敷之前、若能用法滅盡藥中之種爲尤善、因此藥熱至二百二十度、體質並無改變也。

猶柔分 (EUROPHEN) 此藥乃爲細粉、亦係氣礬類、色黃、醇酒、伊打、哥羅芳、油類、俱能化之、水不能化、可代黃氣之用、因其中氣質散之甚緩、故敷於傷處、不易中毒、但無速效耳、其大用乃敷濕瘡、因其較黃氣輕五倍、而多有吸濕之能、使瘡變乾、種則無從生長矣、癧皮炎[2]、腿瘍[3]、路浦司[4]等症、有效、瘰梅症[5]、則不如黃氣之妙。

用法 此藥可製成抹膏用之、每百分內、含此藥五至十分、服分劑一至三厘、(0.06-0.2) 瘰[5]症服之有效。

1 Interstitial keratitis
2 Scrofuloderm
3 Ulcer of the leg
4 Lupus
5 Syphilis

黃色之瓶內、功用與黃氣同、氣味不似黃氣之惡、嗓瘵[1]症、以此藥散置於吹藥筒內吹之常效、因其無味、故病者亦不厭惡、有著名醫者謂糖尿症[2]、日服三次、每服一至六厘、(0.12-0.4) 有效、癨[3]症之晚程、如上服之、亦效、浮傷之良方如左。

埃多	℞-Iodoli	一分
伊打	Ætheris	十分
火棉	Pyroxylini	五分

此方名埃多火棉酒、敷於傷處。M. S.— Apply locally.

癩[4]症或鼻下之火瘍、良方如左。

烸醇	℞- Phenolis, U. S. / Acidi Carbolici, B. P.	五量滴	(0.3)
玫瑰油	Olei rosae	五量滴	(0.3)
埃多	Iodoli	二十五英厘	(1.6)
羊毛脂	Adep. Lanae	半英兩	(16.0)

製成抹膏、敷於患處。M. S.— Apply locally.

阿色透

THYMOLIS IODIDUM, U. S. 此藥乃氣洋蘇冰之䤋、其色或似深棕或紅黃無常、伊打、

1 Tubercular laryngitis
2 Diabetes mellitus
3 Tertiary syphilis
4 Eczema

於肛內、後再多用水射於腸內、有效。

內用 瘤症之晚程、服之有效、分劑一至五厘、(0.06-0.3)

藥製與分劑

黃氯抹膏 Unguentum Iodoformi, 此膏宜用新製者。

黃氯肛彈 Suppositoria Iodoformi, B. P. 每彈內含黃氯三厘、(0.2)

乖效 此藥乖效之狀、於毒力中發明之、但中毒最輕者、其狀不甚顯然、故醫者用此藥時、務宜謹慎、有時遍體生瘾、與紅熱症相似。

毒力 敷此藥顯中毒之狀畧輕者、則覺睏倦、惡心、鼻中常有異味、或頭痛、嘔吐、重者以上之患既過、則腦部被激、致有不寐、健忘、厭食、脉速等患、尤重者、則瘈瘲、瘋狂、昏迷、更迭而至、脉微而速、有時尿積、亦有尿中含血者、及其死也、心經與呼吸部、一時俱停、凡敷藥而中毒者、約在三日內、各狀必忽然而顯、年邁者、中毒最易。

解毒法 鈉輕磺強礬、爲此藥之敵藥、亦可服葡萄酒、以激生命司所、並宜用利小便、與發表等藥。

埃多 IODOLUM, U. S. 此藥乃一類氯塩、其色混黃、醇酒、伊打、油類、俱能化之、宜貯於深

1 Tertiary syphilis

癩症[1]作癢、良方如左。

黃　氯	R-Iodoformi	四英厘	(0.25)
郁加列沓油	Olei eucalypti	一量錢	(4.0)
軟煤蠟	Petrolati, U. S. Parafini mollis. B. P.	一英兩	(30.0) —M.

敷於患處。S.—Apply locally

此藥有滅瘰癧之能、骨節[2]或胸統膜[3]之瘰症、常以此醫之、用法、放膿時、宜防身外之癧、入於傷口、以溫硼強酸消水、或非醇消水、冲淨膿袋、後以滅癧之洋橄欖油九十分、與黃氯散十分、製成勻藥、以一至六量錢 (4.0-24.0) 射於其內、過半月、如瘡口無收斂之勢、宜再割開、刮其膿袋之內面、後仍用勻藥、或黃氯紗塞滿之、瘰癧[4]症、無論其生膿與否、以此勻藥射之有效、嗓瘰症[5]、如以最細之黃氯散、用吹藥筒、吹於嗓內有效、亦可用此藥二厘、(0.12) 加松節油半量兩、(16.0) 洋橄欖油半量兩、(16.0) 用噴霧具噴之有效、氣管[6]洇膜久炎症、用此方噴之、能使其咳嗽生痰、一並減少、肛裂[7]、或痛痔[8]等症、以此藥五厘、(0.3) 製成肛彈、塞於肛內、越五分鐘、如見大便、其痛必減、割會陰後、用此肛彈、亦有止痛之能、嬰孩吐瀉[9]症、多有肛急之患、如以此藥五厘、(0.3) 加洋橄欖油一量兩、(30.0) 射

1 Eczema
2 Tubercular disease of joints
3 ,, ,, ,, pleura
4 Tubercular glands
5 Laryngeal phthisis
6 Chronic bronchial catarrh
7 Fissure of the anus
8 Painful hemorrhoids
9 Tenesmus of cholera infantum

體功效　此藥常為敷傷之用、敷於週身、於絡與呼吸、無甚感能、服中分劑亦然、如敷於洇膜、則有痲效、並有改症之功、乃由涎與尿而祛。

療效　此藥之用、乃敷於傷處、近數年來、因其味惡、故用者較少、按此藥有免腐之力、而無滅種之能、蓋種在藥中、猶能生長也、惟其能將傷處變乾、致種不易生長、且敷於傷處、本體改變、畧顯氣質、種所生之毒氣質、可以敵之、醫瘰瘡[1]之良方如左。

黄氣	℞-Iodoformi	二十英厘	(1.3)
郁加列晉油	Olei eucalypti	半量兩	(16.0)

敷於瘡上。S.—Apply locally.

又方

黄氣	℞-Iodoformi	半英兩	(16,0)
樟腦	Camphoræ	七十五英厘	(5.0)
玫瑰油酒	Essentiæ rosæ	二量滴	(0.1) —M.

敷於瘡上。S.—Apply locally.

1 Syphilitic sores

置於藥殼內、多用水送下亦可、其分劑乃五至六十厘、(0.3-4.0) 日服三次、但視病勢如何耳、且宜於飯後一句鐘服之、則胃經少受其惹力。

乖效 服此藥者、每有瞼邊發炎、並鼻嚏之患、服小分劑、較大分劑乖效尤顯、如仍服之、必漸次加重、見中氣毒篇 亦有服之瞼瞤腺炎、且有胃經不平、食物難化者、如與砒兼服、則瞤腺不至發炎矣、又有服之而腿生癮、或瀉腹、或憂悶而倦怠者、倘服此藥非宜、可以錏氣盐或鈉氣盐代之。

鈉氣盐 SODII IODIDUM, 此盐之功用、並分劑、與鉀氣盐同。

錏氣盐 AMMONII IODIDUM, U. S. 此盐之色先白、後則黃而棕、宜貯於深黃瓶內、用合宜之塞塞之、如其色過深、則不宜用、分劑二至五厘、(0.12-0.3) 功用與鉀氣盐同、喉門棚腫脹[1]、久症、以此藥三十厘、(2.0) 化於一量兩 (30.0) 甘油內、每日以刷敷之、有效、製成之後、宜貯於瓶內、嚴密塞之、庶不致改其體質。

鉥氣盐 STRONTII IODIDUM, U. S. 此藥之功用、亦與鉀氣盐同、分劑五至十五厘、(0.3-1.0)

黃氣 IODOFORMUM, 此藥色黃、結晶似鱗、別具一種氣息、醇酒、伊打、哥羅芳油類、俱能化之、水不能化。

1 Enlarged tonsils
2 Syphilitic sores

症、服之或能祛痳使之復原、如因癯症、致患血囊[1]、此藥大效、其痛腫跳等患、必能漸次減少、以至痊癒、若總脉有此類之血囊、其效尤顯、瘳症[2]如病原在氣脘之內、服之大效、若因胃不消化所致、此藥反增其病勢、氣脘久炎[3]與腸淍久炎[4]等症、用鉀氯盐無效者、日服此藥三次、每次三至五厘、(0.2-0.3) 每效、總之小分劑有激生液之能、大分劑有阻生液之力、此外更有他用、肺氣腫[5]症、而氣脘久炎者、用之常有神效、如氣脘久炎、生痰過多者、因其有激生痰之力、故不宜用、腎久炎[6]症、若腎經之功用、猶能祛此藥、可用為祛痳之劑、因其有利小便之能也、癭[7]症敷服皆為妙品、傷風[8]初起時、服此藥十厘、(0.6)或可遏其病勢、肝變硬[9]新症、緣此藥能阻連膶生厚、服之常效、脉變壞[10]症、與鈉氯盐毛地黃同服、有效、頸瀘㿔腫脹[11]症、服之有效、肺炎[12]之晚程、服之可以祛痰、肺瘍症、因其有廢膶之力、故不宜服、無論何症、如兼有癯症者、皆可服之。

藥製

鉀氯盐抹膏 Unguentum Potassii Iodidi. 此膏宜用新製者。

鉀氯盐鹼擦藥 Linimentum Potassii Iodidi,cum Sapone, B. P.

服法 因此藥之味不佳、故宜與洋茯苓雜糖漿同服、如此漿不便、可以甘草膏代之、或

1 Aneurism
2 Asthma
3 Chronic bronchitis
4 Chronic intestinal catarrh
5 Pulmonary emphysema
6 Chronic nephritis
7 Bronchocele
8 Acute coryza
9 Hepatic cirrhosis
10 Atheroma
11 Enlargement of cervical glands
12 Pneumonia

療效　此藥之大用有三、一醫癯症、此症無論何程、皆可用之、晚程尤妙、且患此類病者、雖常服足分劑、亦無乖效、有醫者謂此為常理、無足怪者、但此類症、每有不能服此藥者、如是服大分劑而無乖效、不足定其曾患癯症、不能服大分劑、亦不足定其未患癯症也、有患遺痚遺瘰遺癲遺痺等症、能常服大分劑者、有患癯症、服小分劑、而顯乖效者、醫癯症、常先服十厘、(0.6) 日服三次、後漸增其分劑、有時病者每日能服一二百厘、(6.6-13.2) 曾有每日服至四百厘 (26.4) 者、最妙之服法、以此藥一兩 (30.0) 加水一量兩 (30.0) 化之、先服十量滴、(0.6) 每日增一滴、(0.06) 顯乖效後、減其分劑三分之一、乃為常服之分劑、如與洋茯苓雜糖漿半量兩 (15.0) 同服、其效尤妙、此藥之效、較録類藥畧緩、而癯症至晚程、用之最妙、各類腦癯症、常以此藥醫之、如生命司所有癯瘤者、則宜用録類藥、因其效尤速也、除此危症之外、只用此藥醫之、如因癯症致失和動者、此藥不能使之復原、只可免其增重而已、因腦脒已壞也、凡服此藥者、如兼用汽浴法、見熱法篇其效尤妙。二解毒、漸中鉛錊砒録等毒者、如服此藥、能令身內之毒、與此塩相合、成為可化之礬、故能祛之。三敵痺、節痺新症、服之少效、若節痺久症、輕重無常、與哥枝禁根酒兼服、甚妙、骽大系痛、腰痺、痺系痛等症、服之或效、胸統膜久炎、心統膜炎、並腦房痕等

1 Syphilis
2 Hereditary asthma
3 Hereditary gout
4 Hereditary rheumatism
5 Locomotor ataxia
6 Chronic lead poisoning
7 ,, zinc ,,
8 ,, arsenic ,,
9 ,, mercury ,,
10 Acute articular rheumatism
11 Sciatica
12 Lumbago
13 Rheumatic neuralgia
14 Chronic pleurisy
15 Pericarditis
16 Hydrocephalus

多、脉速而微、面白、尿閉、以至殞命、蓋因呼吸部受阻也、如所用之分劑、不致立時殞命、越數日後、仍不能免、因育道發炎、全身之腡俱變壞爲脂也。

解毒法　此藥之毒、糡能解之、但宜多服、且當用吐藥、或胃抽器、亦宜用煖身之法、如絡與呼吸受阻、宜用空針射酒、與毛地黃、士的年等藥、或效。

鋏氯盐 POTASSII IODIDUM, 此藥結方形之晶、色白、水最易化、以試紙試之、則成藍色、若置於潮濕之處、則易變成流質。

體功效　此藥之體功效與氯同、但惹力較小、服之日久、其中鋏質之阻力甚大、恐有他虞、不如服鈉氯盐爲妙。

絡部　此藥之力由於鋏質、强壯者、服小分劑、能增血壓、大分劑則減血壓、脉變壞症、血壓過大、大分劑有效。

𠹌　此藥被𠹌甚速、服後僅十三分鐘、於尿內用化法卽畧見之、一日之內、可祛所服者、十分之八、其餘二分、則積於身內、如以此藥醫癯症、先宜勤服、並漸增其分劑、至顯乖效時、可常服此分劑之三分之二、日服二三次、則見大效、中鉛毒者、不可減其分劑、凡服此藥者、雖止而不服、必過四五日、尿內方不含氯質。

藥製與分劑

碘酒 Tinctura Iodi, 五至十量滴 (0.3-0.6)

碘雜消水 Liquor Iodi Compositus, U. S. 五至十量滴 (0.3-0.6)

碘强消水 Liquor Iodi Fortis, B. P. 此消水但用之爲敷藥。

碘抹膏 Unguentum Iodi, 此藥於濜柵大症、敷之有效、如皮膚薄嫩、加猪脂等分調勻、敷之最妙、惟宜用新製者。

禁用之狀　腎炎症不宜用、如不得已、可用微分劑、各類新炎症不宜用、瘡症生膿過多、亦不宜用。

乖效　久服此藥者、口生金味、清晨尤甚、牙齒與齦畧痛、涎液過多、清晨畧有惡心、且不思食、或有鼻涕、或胃不平、或膃腺炎等患、如仍服之、各患必俱加增、鼻涕尤甚、額與喉皆痛、膃腺炎或成膿皰、或有作燒者、亦有乖效只見於腦部者、如肌跳、系痛、精腺、乳腺、與過身之肌、俱形消瘦、後則血虧、體憊、甚有目盲、癱瘓者、有醫者云孩童敷碘酒過多、或致腎經發炎、尿中含胊。

毒力　用過分劑者、必致腸胃發炎、腰胃與腹甚痛、且大有嘔瀉之患、口有金味、生涎過

內、仍使流出、此法最妙、但疼痛過甚、宜先用迷蒙藥熏之方可、有醫者以甘油與碘酒等分合勻射之、亦能醫此症、亦有醫者、以碘酒射於發久炎之潤膜穴內[1]、射後或有乖效、更有醫者、射此酒以醫胸膜瘀症、射後或有中毒之狀、初則癡癡似癇、後則昏迷不醒、有著名醫者、用碘氣以醫下三類症、一肺變硬症[2]、生痰過多、且有重嗽者、如每日早晚以碘氣熏之、其嗽與痰皆可減輕、二六至十歲之幼童、患疹熱症後、或因受風、致患乾嗽[3]、嗓啞[4]、呼吸胸內有聲者、熏此氣有效、三鼻與內眥作癢[5]、呃嚏[6]、流淚[7]、額痛甚重者[8]、如以此氣熏之、或立見效、每有受風初生鼻嚏者[9]、自握碘酒瓶嗅之有效、孕吐者[10]、用碘酒五至十量滴、(03-06) 與伯蘭地同服、有效、嗓痛兼腭垂鬆大者[11]、良方如左。

碘酒	℞ Tincturæ iodi	一量錢	(4.0)
鉀碘鹽	Potassii iodidi	一英錢	(4.0)
伯蘭地	Spiritû vini gallici	一量兩	(30.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	加至四量兩	(120.0)

以二量錢、(8.0) 加水半玻璃盃、日漱三次。

M. S. Use two teaspoonfuls in half a glass of water as a gargle three times a day.

1 Chronic inflammation of serous cavities
2 Fibroid lung
3 Hollow cough
4 Hoarseness
5 Itching of the nose or innercanthus of eyes
6 Sneezing
7 Weeping of the eyes
8 Severe frontal headache
9 Acute coryza
10 Vomiting of pregnancy
11 Relaxed sore throat

氯	℞-Iodi	五英錢 (20.0)
醇酒	Alcoholis	十量錢 (40.0)
伊打	Ætheris	十量錢 (40.0) —M.

若敷此酒一或二層、其效與敷尋常氯酒數層之效同、且乾之甚速、不致壞人衣服、胸統膜炎[1]症、可敷於患處、其益有二、一病初起時、統膜尚未積液、此藥有外惹內效之功、使病不至發作、二統膜既已積液、敷此藥有祛液之功、乾嗽[2]不止、可敷此酒於髃凹處、兼敷於氣管有效、氣管久炎[3]症、敷之可減其痰、久痺[4]症、敷之有效、滑膜炎[5]症、如敷至數日而腫勢愈增、此乃佳兆、逾數日腫消而痊瘉矣、肺癆[6]症、或因胸統膜有發炎之處、以致胸間每覺一處作痛、敷之有效、路浦司[7]症、如敷於患處之四圍、或可遏其病勢、若敷於患處、或亦能醫之、凍瘃[8]、若以氯抹膏與猪脂各半、研勻敷患處、最妙、常患胸痛[9]者、用氯抹膏擦之有效、胸肌作痛亦效、但脅間系痛[10]、則毫無功效、顛茄乃為此類系痛之妙劑、髮錢癬[11]、身錢癬[12]等、敷氯酒有效、瘋症[13]、如以此酒敷患處之四圍、庶可遏其病勢、若齦離牙齒之患[14]、可將氯一厘 (0.06) 化於一量兩 (30.0) 水內、敷患處有效、但敷後宜用水漱口、可免牙齒受傷、陽腺衣瘀症[15]、先用套針與筒以放其瘀、後將氯酒、用水節射於陽衣

1 Pleurisy
2 Harassing, irritating cough
3 Chronic bronchitis
4 Chronic rheumatism
5 Synovitis
6 Phthisis
7 Lupus
8 Chilblains
9 Pleurodynia
10 Intercostal neuralgia
11 Tinea tonsurans
12 Tinea circinata
13 Erysipelas
14 Retraction of the gums
15 Hydrocele

體功效　此藥有改症之效、其理人不得而知也、若敷於皮上則染黃色、或古銅色、或黑色、皆在所用之多寡耳、如敷之過多、皮則生皰、敷於迴膜、大有惹力、有著名醫者謂、其有激全身養育之功、與激絡部之能。

陳　此藥被陳甚速。

祛　此藥由腎皮涎腺而祛、若乳婦用之、乳內必含此質、其所乳之嬰孩、或患腸胃炎症。

療效　如腺部失其功用、致生癆[1]瘰[2]者、此藥有效、濜柵之胭過長[3]症、用之最妙、但濜柵生膿者忌用、蓋此藥易使之生膿也、血薄、濜柵大、與血多白胅等症、無效、肺癆急症忌用、肺變硬癆[4]症有效、癭[5]症大效、惟於突眼癭症有損、久癬[6]症、如以氯抹膏加猪脂等分、敷之有效、或敷氯酒亦可、若兼有血虧[7]症、宜服低鐵氯塩糖漿大效、按氯亦爲外惹內效之藥、若以氯酒敷於皮上數層、至發黑色爲止、在脫皷時、若再敷之、其人必甚受痛、故醫者宜將鋏氯塩製成消水、敷於痛處、並以糡製成糊藥、敷於其上、可畧減其痛也、總之敷此藥、勿使人受痛爲妙、以痛無益於病、徒增其苦耳、近有醫者製有力之氯酒、其方如左。

1 Tuberculosis
2 Scrofulosis
3 Enlargement of lymph-glands
4 Fibroid phthisis
5 Goitre
6 Chronic bone disease
7 Anæmia

高汞硫強礬 (HYDRARGYRI SUBSULPHAS FLAVUS) 此藥爲有力之吐藥、哮聲[1]症有效、但有惹力、用時務須謹愼、二正歲孩童之分劑、二至五厘、(0.12-0.3) 過十五分鐘、如不見效、可再服之、若仍不見效、宜用他類吐藥、或用胃抽器抽之方可。

汞黃洗藥 LOTIO HYDRARGYRI FLAVA, B. P. 此藥乃以汞氯強盐三十厘、(2.0) 加石灰消水十六量兩 (480.0) 製成、功用與汞黑洗藥同、但其惹力較大。

不符之藥 汞氯強盐、惟與鋏氯盐及鋞氯盐相合、他藥俱不可同用、且氯類不可與汞氯弱盐同服、汞氯弱盐、亦不可與輕氯酸同服、蓋此酸能令汞氯弱盐、變成汞氯強盐也、亦不可與安替派林同服。

鏞鈉氯盐 AURI ET SODII CHLORIDUM, U. S. 此藥能醫食滯[2]症、如食畢胃痛、且吐瀉者、有效、有醫者謂、莖不舉之陽痿[3]症、服之大效、亦有醫者謂、遺精[4]症、服之大效、更有著名醫者謂、能醫啼嗽[5]症、但不可服過分劑、以免腸胃發炎、分劑一厘之二十分之一、至十分之一。(0.003-0.006)

氯 IODUM, 此藥由海草而得、嘗之味苦而辣、以試紙試之、其色不變、醇酒伊打能化之、水畧能化之、

1 Croup
2 Indigestion
3 Impotence
4 Spermatorrhœa
5 Whooping-cough

之有效、如專用此藥、畧有潰力、故與他藥合用為妙、腸胃不消化[1]、以致噫噎、且大便惡臭者、服此藥一厘之六十分之一、至五十分之一、(0.001-0.0012) 有效。

紅錸强礬 HYDRARGYRI OXIDUM RUBRUM,

其體質功效、與黃錸强礬同。

藥製

黃錸强礬抹膏 Unguentum Hydrargyri Oxidi Flavi, 此膏之力甚大、宜加猪脂等分用之、乾皮久症[2]有效、睥瘸炎[3]瞼邊瘤[4]等症亦效、但宜用新製者。

紅錸强礬抹膏 Unguentum Hydrargyri Oxidi Rubri, 其力與黃錸强礬抹膏同。

錸氣弱塩 Hydrargyri Iodidum Flavum, U. S.

此藥與錸氣强塩之功用同、但少有惹力、腎炎久症[5]有效、癧症[6]之中程、最為妙劑、分劑一厘之六分之一、至四分之一、(0.01-0.015) 日服三次、但宜日增其分劑、見效後減半服之、乃為最妙之法。

錸柳礬 (Hydrargyri Salicylas.)

此藥之大用、乃醫癧症[7]、用法以此藥二十二厘、(1.5) 加軟怕拉芬三量錢、(12.0) 每四日以一量滴 (0.06) 深射於臀大肌內、越數次如無大效、每二日如法射之、用時宜搖動其瓶、以防沉澱、不然則所射者、盡為軟怕拉芬矣、所用之針、射畢即宜擦淨、因此藥易塞針竅也。

1 Intestinal and gastric indigestion
2 Chronic dry skin diseases
3 Granular lids
4 Styes
5 Chronic nephritis
6 Syphilis
7 Syphilis

錼貼膏 EMPLASTRUM HYDRARGYRI, 其用亦與錼抹膏同。

錼油礬 OLEATUM HYDRARGYRI, U. S. HYDRARGYRI OLEAS, B. P. 此藥乃以錼强礬製成、可代錼抹膏之用、較錼抹膏易合人意、英揀藥册中、有錼油抹膏、Unguentum Hydrargyri Oleatis, B. P. 生陰虱[1]者、以此膏敷之大效、但越一二句鐘、即宜洗去、不然恐中錼毒、或謂此藥之效、不在錼而在油、蓋油於虱類爲毒藥也。

高錼氰强礬消水 LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS, U. S. LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS ACIDUS, B. P. 此藥之潰力大而且速、瘤[2]或大瘊[3]以玻璃箸蘸而敷之有效、路浦司[4]症、敷之亦可、至患處與四圍之皮平爲止、但敷之之時、宜用猪脂擦四圍之皮、以免受其潰力、如恐病者過於受痛、宜先敷寇卡印、再敷此藥、後敷軟火棉酒最妙。

藥製

高錼氰强抹膏 UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATIS 此膏之力甚大、久皮症[5]有效、若無須大惹力之症、宜加猪脂等分用之、其效尤妙。

淡高錼氰强抹膏 Unguentum Hydrargyri Nitratis Dilutum, B. P. 此膏之惹力較小、故常用之。

黃錼强礬 HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUM, 此藥能醫瘤瘡[6]、用法以此藥一分、加白土一分、敷

1 Pediculus pubis
2 Epitheliomata
3 Large warts
4 Lupus
5 Chronic skin diseases
6 Syphilitic sores

芳氣散多半、再加銾四錢、(16.0) 研之極勻、而哥羅芳散盡、惟餘羊毛脂一分、銾二分而已、如醫瘰[1]症以此油三分、加洋橄欖油一分、每三日可射一或二量滴、(0.06-0.12) 或俱用一分亦可、有醫者云、欲射銾藥類、此油爲最妙之劑。

銾白土 HYDRARGYRUM CUM CRETA, 此藥乃以銾三十八分、乳糖十二分、白土五十分製成、畧有瀉力、其大用乃醫嬰遺瘰症[2]、分劑一至十厘、(0.06-0.6) 若孩童有遺瘰衰瘦症[3]、服之其效最速、成人之瘰症、服之亦效、嬰孩水瀉症[4]、如大便內含未化之食物、服此藥之小分劑常效。

銾抹膏 UNGUENTUM HYDRARGYRI, 此藥之大用有二、一醫皮症、二患瘰症[5]者、若不能服銾、或服之不足敵此症之毒、敷此膏於皮薄處、有效、醫瘰症之用法、第一日敷於左胠膕處、第二日敷於右胠膕處、第三日敷於左腋、第四日敷於右腋、宜隨敷隨搓、以病勢之輕重、定日期之久暫、遞次循環、庶皮不致受惹、且速受藥力、嬰遺瘰症[6]、可以此法醫之、或敷藥於絨帶上、束於腰中亦可、但不宜常換裹衣、以裹衣多有藥粘附、加增藥力耳、瀘腧大症[7]、以此藥敷之或效。

銾擦藥 LINIMENTUM HYDRARGYRI, B. P. 其用與銾抹膏同。

1 Syphilis
2 Infantile syphilis
3 Syphilitic marasmus
4 Infantile diarrhœa
5 Syphilis
6 Infantile syphilis
7 Enlarged glands

(…)加猪脂一兩、(30.0) 製成抹膏、敷之大效。

藥製與分劑　因此藥之體重、故分劑似小、多有醫者、將乳糖、白糖、鈉氯碳强礬等藥、加於其內、此二糖無甚功效、只令味甘耳、用鈉氯碳强礬者、以其有鹼力、能增藥之瀉效也、此藥無味、故孩童易服、若加乳糖、製成乳糖散類尤妙、如成輪藥、宜少用壓力、不然必改變其體質。

銾氯弱鹽雜丸 Pilula Hydrargyri Subchloridi Composita. B. P. 二至八厘 (0.12-0.5) 內含銾氯弱鹽、銻硫弱合、怪阿克蓖麻油等藥。

銾氯弱鹽抹膏 Unguentum Hydrargyri Subchloridi. B. P. 癩[1]症敷之有效、且有良方如左。

℞

銾氯弱鹽	Hydrargyri chloridi Mit. U. S. Hydrargyri subchloridi, B. P.	四十英厘	(2.6)
鎂碳强礬	Magnesii carbonatis	四十英厘	(2.6)
玫瑰消水抹膏	Unguent. aquæ rosæ	一英兩	(30.0) —M.

此方可代銾氯弱鹽抹膏之用。

灰色油 (OLEUM CINEREUM)

此藥之製法、乃以羊毛脂二錢、(8.0) 內加哥羅芳研勻、至哥羅

1 Eczema

若常患病之孩童、腸胃氣脹、[1]口出臭氣、[2]大便味惡、其形如漿、如每半句鐘服小分劑、即一釐之二十分之一、(0.003) 至四次爲止、隔三日再如法服之、大效、如患眸瘡炎、[3]而兼有癧症者、以此藥撒於目內、常效、如已服氯類藥、忌用、因氯由淚而祛、若撒此藥於目內、則與氯俱變其質、目則大發炎矣、淋腫症、[4]此藥能利小便、可單用之、亦可與海葱或毛地黃並用、或兼服鴉片、以免瀉腹、亦可、用法日服三次、每服一釐、(0.06) 其效最大、瀉腹者、其效必小、此藥之力、不能久存、越二日如不見效、不可再服、腸熱症[5]初起時、如大便不通、每句鐘以一釐之四分之一、(0.015) 與鈉氯碳强礬兼服、用至一釐 (0.06) 有效、大便乾燥症、而糞色淡黃、兼有頭痛口臭者、服之最妙、若畧有青黑色、服獨腳蓮尤妙、熱症甫瘉而厭食者、[6]舌有黃苔、常用此藥之中分劑、令其瀉腹有效、服新製之皇强酸、尤爲妙劑、但不可與此藥兼服、因其二藥不符也、無論成人孩童惡心症、[7]服此藥之小分劑、或有平胃之功、然有服後反致嘔吐者、蓋其胃或平或惹、人無從豫知也、嬰孩反乳、有時此藥能醫之、每句鐘服一釐之十二分之一、(0.005) 至三次爲止、或每句鐘服灰色散一釐之三分之一、(0.02) 過三句鐘爲止、如身體不見消瘦、不宜服藥、蓋其所吐、必其所不宜存者也、癧濕瘡症、[8]每日以此藥撒於其上有效、肛門作癢、[9]如以此藥一錢、

1 Flatulence
2 Fetid breath
3 Phlectenular conjunctivitis
4 Dropsy
5 Typhoid fever
6 Anorexia
7 Nausea
8 Syphilitic condylomata
9 Pruritus ani

汞丸塊 MASSA HYDRARGYRI, U. S. PILULA HYDRARGYRI, B. P. 此塊每厘(0.06)內含汞一厘之三分之一、(0.02)分劑半至二十厘、(0.03-1.3) 其瀉效與汞綠弱鹽同、但少有用之醫瘰症者。

汞綠弱鹽 HYDRARGYRI CHLORIDUM MITE, U. S. HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM, B. P. 此藥不易消化、而易於被吸、如以之爲瀉劑、每半句鐘服一厘之六分之一、至半厘、(0.01-0.03) 服至一或二厘、(0.06-0.12) 其功效與十厘(0.6)同、且不能中毒、蓋此藥必在鹼類中被吸、腸中含鹼之液、一時不能消化十厘、(0.6) 故服大分劑、多不被吸、用小分劑、間時服之、則腸中之液漸次而生、足敷消化之用矣、如與鈉氯碳強礬同服、其效尤大、蓋因鈉氯碳強礬含有鹼力也、所謂小分劑與大分劑之效同者、於溫道則然、於熱道必用大分劑、始有感肝生液之功、服大分劑者、越二十四句鐘、不見腹瀉、宜服鎂硫強礬、不然恐中其毒矣、如以此藥醫瘰症、較服他類汞藥、中毒最易、醫者宜恒記之、有醫者用之爲射藥、以醫瘰[1]症、其法以此藥五分、鈉氯鹽五分、加水五十分、深射於肌內、不宜僅射於皮內、射時醫者所用一切、務宜潔淨、免有膿腫之患、最宜之射處、乃臀肌中耳、或用此法、致有痤痄、痄脫等患、故射汞類藥以醫此症、宜考汞柳礬、汞氯強鹽、灰色油等篇、新痢[2]症、先服衣必格三十厘、(2.0) 後每句鐘或每半句鐘、再服此藥之小分劑、至大便如常而止、如病者體弱、此藥不爲妙劑、

1 Syphilis
2 Acute dysentery

倘其腹受風、雖用此藥恐難痊癒矣、癯皮痼症[1]可將此藥半兩、(15.0)與錏氯盐一兩、(30.0)置於水內、每三四日沐浴一次、或效、白濁久症[2]若將此藥半厘、(0.03)加水六量兩、(180.0)每三日射於尿管內、大效、各類寄生之皮症[3]若將此藥二厘、(0.12)加水一量兩、(30.0)日敷三次、有效、英揀藥册有錄氯强盐消水、Liquor Hydrargyri Perchloridi, B. P. 乃以錄氯强盐半厘、(0.03)加水一量兩、(30.0)錏氯盐半厘(0.03)而成、其加錏氯盐者、爲免此藥之沉澱也。

錄氣强盐 HYDRARGYRI IODIDUM RUBRUM

此藥之惹力、與錄氯强盐同、服過分劑者、其狀亦與服錄氯强盐過分劑者同、癯症[4]之晚程大效、分劑一厘之三十分之一、至十五分之一、(0.002-0.004)初患喉門棚炎症[5]、若每句鐘服微分劑、即一厘之二百分之一、(0.0003)服四或六次、或能敵之、有醫者云、此藥之免腐力、較錄氯强盐爲大、近有人查明、其免腐之力、仍遜於錄氯强盐耳、英揀藥册有錄氯强盐抹膏、Unguentum Hydrargyri Iodidi Rubri, B. P. 癭[6]或久皮症[7]敷之有效。

錄黑洗藥 Lotio Hydrargyri Nigra, B. P.

此藥乃以錄氯弱盐一錢、(4.0)加石灰消水十六量兩、(480.0)製成癯瘍[8]或癩症[9]洗之有效。

1 Obstinate syphiloderm
2 Gleet
3 Paracitic affections of the skin
4 Syphilis
5 Tonsillitis
6 Goitre
7 Chronic skin disease
8 Syphilitic sores
9 Eczema

則胃痛、嘔吐、瀉腹、所瀉者先則如常繼而泗液、後則帶血、終則腦力脫失、暈仆而死、解法、人中此毒、宜使之多服卵靑、後用胃抽器抽之、用煖身法煖之、若絡與呼吸過於受阻、則用激此二部之藥、或不致殞命、然痊瘉亦必甚遲、或有因育道受傷、歷數月而殞命者、此藥不但服之中毒、即敷於破傷之處、或灌於陰道與竅內過多者、亦然、但其狀與服者不同、若灌汞氯强鹽消水於陰道或竅內、最易中毒、其腹先痛而後瀉、所瀉者有血色、其尿或少或閉、遇此病狀、醫者宜立換他藥、中此類之毒者、雖可漸次痊瘉、然亦有忽爾殞命者、黴[1]症、如用空針射汞藥類、宜以此藥一厘之六分之一(0.01)深射於臀肌、較汞氯弱鹽之效大、隔一二日一次足矣、但所用之針與醫者之手、務須潔淨、此藥之大用、乃爲免腐藥、見免腐篇 痳[2]、黴[3]、腎久縮[4]、喉門桃炎[5]等症、常用此藥醫之、如因紅輪缺少、致患血虧[6]症、以此藥之小分劑、即一厘之六十分之一、至四十分之一、(0.001-0.0015)日服三次大效、若因黴症而血虧者、其效尤妙、無論成人孩童、若大便色綠、且有惡臭、如服此藥之微分劑、即一厘之五百分之一、(0.0001) 有效、或以此藥半厘、(0.03) 加蒸水五量兩、(150.0) 每句鐘服一小勺、(4.0) 至大便如常而止、新久之泗瀉[7]症、如上服之大效、成人之痢[8]或瀉[9]等症、每句鐘可服此藥二小勺、(8.0) 但病者所著之衣、醫者切宜留意、

1 Syphilis
2 Diphtheria
3 Syphilis
4 Chronic contracted kidney
5 Tonsillitis
6 Anæmia
7 Mucous diarrhœa
8 Dysentery
9 Diarrhœa

瀉力、但其效每不及錸氯弱盐、心體炎[1]、與心統膜炎[2]等症、錸則有效、痧症[3]初起時亦效、若用敵痧盟、則他藥庶可不用矣、凡用錸氯弱盐時、宜以乳糖九十分、盐十分研勻、製成乳糖散類、使其易於被味、其效尤妙、以上所論乃錸藥之總效、下則分論之。

錏錸氯盐 HYDRARGYRUM AMMONIATUM,

此藥不可用為服藥、每製成抹膏、名錏錸氯抹膏 Unguentum Hydrargyri Ammoniati, 皮科常用之、癬症[4]或乾癩[5]症、大效、以其大有惹力也、且有殺癬寄生[6]之能、揀藥冊內錏錸氯抹膏之力甚大、宜與猪脂各等分和而用之最妙、不然恐有惹皮之患、鼻臭[7]症之良方如左。

錏錸氯盐	℞-Hydrargyri ammoniati	四英厘	(0.25)
白糖散	Pulv. sacchar. alb.	半英兩	(16.0)

作為聞藥、擤淨鼻涕、吸入鼻孔。
M. S.—To be used as a snuff, after thoroughly blowing the nose.

此方不第能治鼻臭、且能醫鼻洄膜炎症、若以惹力過大、則以此藥二厘、(0.12) 白糖散半兩、(16.0) 和而用之亦可、此方內之錏錸氯盐、亦可以紅錸強霧代之、而功效亦同。

錸氯強盐 HYDRARGYRI CHLORIDUM CORROSIVUM, U. S. HYDRARGYRI PERCHLORIDUM, B. P.

此藥之毒力與惹力甚大、中此毒者、先

1 Carditis
2 Pericarditis
3 Diphtheria
4 Psoriasis
5 Dry eczema
6 Tinea
7 Ozoena

加重、患癨症者、如因腦內有癨瘤、以致頭痛、此藥大效、若因血薄所致、其痛反增。

瀉效　此藥有瀉力、且有感肝之能、所常用爲瀉劑者、乃銾丸塊、或銾氯弱鹽、但銾氯弱鹽之力較大、如與鈉氫碳强礬兼服、其感肝之能加增、若以此礬製之成丸、存之過久則變灰色、其感肝之能減少矣、患痎症者、欲服貫林、宜先服銾氯弱鹽、不然則貫林之效難見、患此症者、如嘔吐不止、服銾氯弱鹽有效。

免腐　銾氯强鹽、與銾氣强鹽、大有免腐之能、外科之醫生、常用銾氯强鹽一分、加水二千至二萬分用之、但宜加菓酸數分、以免此鹽與肉中之液變成不易化之脂礬、用銾氣强鹽亦然、但銾氣强鹽、少用爲免腐藥、若用爲滅瘴毒藥、宜以銾氯强鹽一分、加水五百至二千分方可。

解炎　强壯者、忽患胸統膜炎[1]或腹統膜炎[2]或顱腦衣炎[3]、銾氯弱鹽大效、若有重症、兼患此類之炎、不但無益、反致有損、若用爲解炎藥、兼服鴉片、則能減其惹育道之力、並阻瀉力、如因頭受傷之故、致顱腦衣發炎、常理乃將銾氯弱鹽與鴉片各一厘半(0.1)製成六丸、每句鐘服一丸、至服畢爲止、服時宜將冰囊覆於其首、室中亦當安靜、如是其效甚速、强壯者、心內衣炎[4]症服銾氯弱鹽之足分劑最妙、用銾氯强鹽亦可、且少有

1 Pleurisy
2 Peritonitis
3 Meningitis
4 Endocarditis

祛者、一厘之十六分之一、(0.004)因此患瘰症者、如先服足分劑、至見體功效後、則服中分劑、其效與先相同、故常服錸者、宜每月服錸氯盐數次、以免積效。

療效　此藥之用有四、一醫瘰、俗名楊梅 二瀉劑、三免腐、四解炎、一四兩用、凡錸藥類、皆有此效、第二用惟錸氯弱盐、與錸藥丸塊有效、第三用、惟錸氯强盐、與錸氯强盐有效、醫瘰[1]症最妙之錸藥、乃錸氯弱盐、若不能服此藥、宜令病者沐浴、坐於椅上、用絮被自頸至足、和椅嚴裹之、以錸氯弱盐置於藥機上、將酒燈燃著、置於椅下、使變成氣、熏入皮內。見第五十圖

吸法　以錸氯弱盐四五厘、(0.25-0.3)置於藥機之C處、加熱變氣、使首距藥機約六寸、吸八或十口、吸畢、用水漱口、以免中毒。

射皮內法　此法不宜常用、因射時人多受痛、且有時生瘍、如不得已、最妙之射藥有二、一以錸氯强盐一厘之六分之一、(0.01)加水十或十五量滴、(0.6-1.0)射之、二以灰色油一二量滴、(0.06-0.12)每三日射一次、若射於臀肌或背後、宜先用鹼洗其射處、再以酒洗之、以針深入皮內、緩緩射之、有醫者云、將錸氯强盐射入皮內、此法不宜用、因其危險過大也、患瘰症者、病勢甚重、宜用以上各法解之、瘰瘭久症、若服錸類藥、其瘭每至


1 Syphilis

中毒之證、倘仍服之、必致口臭舌腫、齦則鬆輭、易於流血、最顯者、卽口多流涎也、若服之不已、各等病狀、必至加增、涎常流至頦與胸之間、故頦胸易生癩症、緣涎內所含之錸惹皮故也、後則牙齒脫落、頜（九頁）二骨癧腐、腡之功用全失、血虧而紅白脒少、至此則殞命矣、三正歲以內之孩童、服此藥而中毒者、則不甚流涎、醫者切不可以不甚流涎、卽以爲未嘗中毒也、匠人用錸、惟製鏡者易中此毒、其病狀不一、有時腦部受傷甚重、且顯微顫、後漸成顫癱、但少有轆䀹之患、醫者宜恒記此理、尋常之系炎、多有此患、惟中此毒者則否、尋常之顫患、少在頸肌、而中此毒者、則多在頸肌、且多患肌跳症、此症乃孩童所常患者、若成人患之、醫者宜考其果中錸毒否、有中此毒、皮膚變色、儼若腎上棚詘症者、有目盲耳聾、覺系失其功用、或過靈、或痳木、或一處之肌瘦者、亦有中此毒而血薄、致身體衰憊者、所見之狀、人各不同也。

　　此藥被㗖之遲速、宜視其服何類錸藥、如服不易化者、被㗖則遲、易化者、被㗖則速。

　　祛　此類藥乃白汗、淚、乳、涎、與大小便而祛、人服錸氯弱塩、過二句鐘始祛、至二十四句鐘其祛始盡、如日服錸氯弱塩數次、必積於各經之內、醫者察明、常服此藥、每日所

第四十八圖



此圖係使錸氯觔塩變氣之機、置藥處如C、四圍有槽、必滿之以水、下用酒燈如A。

第四十九圖



此圖表明熏錸氯觔塩之式。

常用爲殺台盼維[1]之藥、著名化學家、研究數載、始製成此藥、然未至極品、必求無損於人而專殺此類寄生、乃爲最妙之藥也、此藥之毒力、較錸砒弱礬消水只有四十分之一、殺寄生之能、較他藥爲大、其殺寄生之功效、與貴林醫瘴[2]症相同、瘧熱[3]症此藥有效、以其能滅血中之寄生也、非洲蝨熱[4]症、白脒旺[5]症有效、癯[6]症無論何程、俱效、故醫此症之特藥、錸居第一、氣居第二、而此藥居第三也、以上諸症、分劑均七厘、(0.5) 用法以此藥七厘、(0.5) 加水三十五至五十量滴、(2.3-3.3) 置於火上滾之、至二分鐘撤下、俟冷射於皮內、或肌內、每日一次、連用二日即止、待至十日、再如法射之、如以此藥加水化之、存貯瓶內、每致失其功用、故宜臨用時製之方可、按七厘 (0.5) 之分劑、在成人少顯毒力、且無惹患、如用大分劑、或用此分劑過勤、或令病者視系枯槁、有盲目之患、有用足分劑、以致腹內疴痛、或腸胃受惹者、但罕見之、以此藥醫寄生之症、必須用之日久、且必用足分劑、不然寄生既不立被殺死、其敵藥之能、必漸增大、後即用足分劑、雖至病者受毒、而寄生亦難滅也、故必如法用之、方能見效。

錸 (HYDRARGYRUM,) 此藥乃係流質、其體甚重。

體功效 如常服此類藥者、先無顯狀、若驗其中毒與否、則以物敲其牙、如覺疼痛、即爲

1 Trypanosomiasis
2 Malaria
3 Relapsing fever
4 African tick fever
5 Leukæmia
6 Syphilis

儼若瘧症、但其中或有含血少許者、如認之不確、宜以化法驗之、其據立顯、延至三四日、病似見愈、然非眞愈也、此乃與中硫毒者同、約在三至六日之內、必至殞命、第三日、皮則發癌、形狀無常、或有立時腹痛、腦力脫失而殞命者。

積毒　漸積此毒者、氣脘被惹、腎經發炎、皮膚有變色之處、亦有因腦系受傷、全身有痲或癱處、若痲在手指或足趾、必多於第一或第二之骨節內、或有因受此毒、間致多系炎症者、其狀與脊腦後柱硬症相同、亦有時皮膚受傷而腦部無損者、亦或有因氣脘被惹、但患瘰症者、又有遲延日久、週身之膶變壞爲脂者。

解毒法　新毒解法　宜先用胃抽器、抽淨胃內之物、以煖身之法煖之、且用化學新製之敵藥、高鐵沘解之、此敵藥之製法、以鐵氯强塩消水、或鐵氯强塩酒、加鎂養、或錏沘消水、所沉之澱、即成此藥、如用錏沘消水製之、必以烝水洗去澱內之錏沘、不然恐有惹胃之患、但錏沘不如鎂養之妙、因鎂養本有敵此藥之能、且無惹胃之力也、服敵藥後、宜服吐藥、亦宜服鴉片、以止其痛、且宜多飲水、不然胃經必甚受損。

積毒解法　宜審致此毒之原而祛之、使之立即避去、並當服鋏氯塩以祛其毒。

阿托益 (ATOXYL) 此藥係鈉砒製成之礬、每百分內含砒三十五分、可代砒礬之用、醫者

藥製與分劑　孩童之分劑、固必少於成人、若以身體之輕重、定分劑之法論之、孩童較成人能多服此藥、但宜在飯後、不然恐有惹胃之患、多服此藥者、醫者宜詢其清晨瞼腫否、腹痫瀉否、若有此狀、當止服一二日、不然恐全體漸成痳腫之症。

砒弱酸 Arseni Trioxidum. U. S. / Acidum Arseniosum. B. P, 一厘之四十分之一 至二十分之一 (0.0015-0.003)

鉀砒弱礬消水 Liquor Potassii Arsenitis, U. S, / Liquor Arsenicalis, B. P, 一至五量滴 (0.06-0.3) 加水服之。

鈉砒礬消水 Liquor Sodii Arsenitis, 一至五量滴 (0.06-0.3) 加水服之。

砒弱酸消水 Liquor Acidi Arsenosi, U. S. 一至五量滴 (0.06-0.3) 較他砒消水多有惹胃之力。

砒錸氯塩消水 Liquor Arseni et Hydrargyri Iodidi, 二至十量滴 (0.15-0.6) 加水服之。


砒弱氯塩 Arseni Iodidum, 一厘之二十分之一、(0.003)

鈉砒强礬 Sodii Arsenas, 一厘之三十分之一、至十分之一、(0.002-0.006)

乖效　服足分劑者、皮則發炎而作痛、或成膿皰、或成系癧狀、見第四十八圖　惟各人不同耳、敷之亦然、每有皮炎後而皺脫、如紅熱症者、亦或有服之致洄膜發炎、鼻嚏等患者。

毒力　新毒　服毒分劑者、則嘔瀉甚重、而膣胃與腹內、皆甚疼痛、先則如常、後似米湯、

第四十六圖



此圖表明患脾臟白脈過多症服吡而歸臥時其白脈如何減少

製之成漿、攤於布上、厚約二分餘、敷患處、至二十四或四十八句鐘揭下、另敷糊藥、越五或十日、疽即脫落矣、又有二方、亦治此症、而病者受痛較少。

一方

歐特方	R· Orthoform.	一英錢	(4.0)
砒弱酸	Arseni Trioxidi, U. S. Acidi Arseniosi, B. P.	一英錢	(4.0)
醇酒	Alcohol.	五量兩	(150.0)
蒸水	Aquæ destillat.	五量兩	(150.0) —M.

一方

砒弱酸	Aseni trioxidi, U. S. Acidi arsniosi, B. P.	七十五英厘	(5.0)
非洒散	Pulv. acaciæ	七十五英厘	(5.0)
寇卡印氯盐	Cocain. hydrochloridi	三十英厘	(2.0)
甘油	Glycerin.	三十量滴	(2.0)
蒸水	Aquæ destillatæ..... q. s.	酌用	

敷於患處 M. ft. paste. S—Apply locally

鐵粉	Ferri reducti. U. S / Ferri redacti. B. P	十英厘 (0.6)
馬前子膏	Extracti nucis vomicæ	四英厘 (0.24) ─M.

共成二十丸、每餐後服一丸。M. Fiant pilulæ No. XX. S.—One t. i. d. after meals.

年邁之人、因心經虛弱、致久立而足[1]腫、或用力時而氣喘者、此藥大有助毛地黃、與士的年之功、醫者遇宜服毛地黃或士的年之症、若兼用此藥、其效尤大、生瘊[2]者以砒消水、或砒弱酸消水、或鋏砒弱礬消水敷之、數日則必脫落、若甚堅硬、先敷鋏泚消水、使其變輭、再敷砒消水、其效尤速、釘胼[3]症、俗名雞眼 若以此法治之、必效、膚疽[4]症、敷之有效、但宜厚敷、如患處甚大、仍宜厚敷、可免被陳之虞、倘敷之淡薄、胭則變壞遲緩、該處之血、運行如常、因而砒多被陳、以致中毒、若患處過大、雖一次不宜敷滿、亦宜厚敷、有著名醫者、醫膚疽症之良方如左。

砒弱酸 ℞-	Arseni trioxidi. U. S. / Acidi arseniosi, B. P.	一英兩 (30.0)
非酒散	Pulv. acaciæ	一英兩 (30.0)
水	Aquæ	五量錢 (20.0) ─M.

1 Swollen feet
2 Warts
3 Corns
4 Epithelioma

Bibulous paper is to be wetted with this compound, and after drying is to be rolled up and smoked as a cigarette.

若專以鉀砒弱礬十五厘、(1.0) 化於一量兩 (30.0) 水內、仍蘸以無礬之紙、成捲、燃而吸之亦可、久痹症[1]、服之每有大效、久齈[2]口白瘍[3]、喉炎[4]、鼻洄膜久炎[5]等症、亦效、草洄炎症[6]、每效、癆症[7]無論新久、服之有效、胃疽[8]、或胃瘍[9]等症、若勤服小分劑、常能止痛且止嘔吐、孕吐[10]者、服之亦效、常食牛乳之嬰孩[11]、如胃洄膜久炎而嘔吐、或宿醉而晨吐者[12]、服之俱效、胃弱食物不化[13]、且有久瀉症者[14]、服之有效、盟瀉症[15]、如勤服微分劑、即每一句鐘服一厘之百分一、(0.0006) 有效、胃弱[16]之良方如左。

鉀砒弱礬消水 ℞- Liquoris potassii arsenitis, U. S. / Liquoris arsenicalis, B. P.	三十量滴	(2.0)
馬前子酒 Tincturæ nucis vomicæ	一或二量錢	(4-8.0)
水 Aquæ	加至三量兩	(90.0) M.

飯後服一小勺、(4.0) 以水送之、但必先搖動藥瓶、以免沉澱、胃炎者忌用。

S.—Shake the bottle. Teaspoonful t. i. d. in water after meals.

又方

砒弱酸 ℞- Arseni trioxidi, U. S. / Acidi arseniosi, B. P.	一英厘之三分之一	(0.02)

1 Chronic rheumatism
2 Chronic coryza
3 Cancrum oris
4 Sore throat
5 Chronic nasal catarrh
6 Hay fever
7 Phthisis
8 Gastric cancer
9 Gastric ulcer
10 Vomiting of pregnancy
11 Vomiting of hand-fed babies
12 Morning vomiting of drunkards
13 Atonic dyspepsia
14 Chronic diarrhœa
15 Serous diarrhœa
16 Gastric atony

效、乾皮症[1]有效、若濕皮症、則無益而有損、患痄症[2]（俗名牛皮癬）者、服之其處必先發紅、病勢似增、服至數日病即痊癒、醫者宜切記之、大皰瘡[3]痲[4]瘋[5]等症、每有功效、糖尿症[6]、與陰門癢症[7]亦效、糖尿癲症[8]、若以鋰礦強礬、與鈉砒強礬並服、亦常有效、若因氣脂洄膜、易於發炎、致患痚症[9]、此為妙劑、服吸俱可、製砒烟捲之方如左。

顛茄葉	℞-Belladonnæ foliorum	九十六英厘	(6.4)
鬧羊花葉	Hyoscyami foliorum	四十五英厘	(3.0)
佛茄兒葉	Stramonii. foliorum	四十五英厘	(3.0)
鴉片膏	Extracti opii	四英厘	(0.2)
菸	Tabaci	八十英厘	(5.3)
水	Aquæ	十六量兩	(480.0) —M.
製成消水、後加	Fiat solutio et adde,		
鉀氰強礬	Potassii nitratis	一百六十英厘	(10.6)
鉀砒弱礬	Potassii arsenitis	三百二十英厘	(21.3) —M.

以未浸礬之紙、蘸此消水內、俟乾製捲、燃而吸之。


1 Dry skin diseases
2 Psoriasis
3 Pemphigus
4 Lichen
5 Lepra
6 Diabetes
7 Pruritus vulvæ
8 Gouty diabetes
9 Asthma

第四十七圖



此圖表明服砒太過者、患系瘰症之狀。

第四十六圖



此圖係血多白脉症、圖中大綫、乃脾經過長之狀、小綫乃服砒後脾經縮小之狀、未服砒之先、白脉有三十四萬二千之多、服後減至三萬二千、且身體重數、亦增二十磅。

用亦失、中分劑、有激絡部、與增司育系之能、若多服之、各類元器、必受其毒。

絡部　服中分劑者、與此部少有功效、過分劑、大有阻此部之能、以致血壓減少、脉緩而微、夫血壓減少者、乃因司絡腦所受阻、過身之血管變爲鬆軟、腹內之血管尤甚。

呼吸部　小分劑、大有激此部之能、過分劑則有阻此部之力。

嗽　此藥被嗽甚速。


祛　此藥由腎而祛者居多、亦畧有由汗涎膽液而祛者、若服中分劑、其祛也、必過十六句鐘始顯、乳婦服之、乳內必含砒少許、若服足分劑、其所乳之嬰孩、易致腹痛。

胴廢　此藥於胴之功用、曾經名醫考察、謂中分劑、大有保胴之能、過分劑、極有廢胴之力。

療效　此藥爲抓跳症[1]之敵藥、然非用足分劑不可、但初服之分劑宜小、後再漸次增多、瘴症而致血虧者[2]、與鐵類並用、大效、腸胃洄膜弱症[3]、此爲上品、血虧惡症[4]、無藥可醫、惟此藥稍效、血多白胅症[5]、此藥最妙、然必服足分劑、始有功效、如病者胃經不受、宜自肛射服分劑之三倍、或以鉃砒弱礬消水一分、與水四分、射於皮內亦可、瘴症[6]此藥不但能防之、亦能醫之、病漸瘉時、且能補助之、若因氣管洄膜、易於發炎而傷風者[7]、服之有

1 Chorea
2 Malarial anæmia
3 Atony of the mucous membrane
4 Pernicious anæmia
5 Leucocythæmia
6 Malaria
7 Coryza

第四十五圖



此圖表明中砒毒者肝中之白點係肝變脂之狀

領骨癱耳、若牙齒與齦無恙、則毒無從而入、否則宜早防之、庶免此患。

砒 (ARSENICUM) 此質不入藥用、所用者乃砒弱酸、Arseni Trioxidum. U.S. Acidum Arseniosum, B.P. 與鈉、鋏、銅、三類砒强礬、無味、以火烤之、則發蒜味、水能化之。

體功效 此藥之毒分劑、於毒力篇論之、如皮受傷、或生瘍、敷之大有潰力、若敷於無恙之皮上、則其力不顯、瘰或濕瘰、市醫每用此藥祛之、亦有用之以祛膚疽者。

腦部 試以小分劑、使蛙食之、即失激反應之能、繼則行動不能自主、後則覺系之功

硄浮酒 (Spiritus Phosphori,)　一至五量滴、(0.06-0.3)

硄甘香酒 (Elixir Phosphori)　十五至六十量滴、(1.0-4.0)

毒力　或浸火柴於水內、飲之而自盡者、其形狀先或如常、越八或十句鐘、口有硄味、腥胃腹內痛如火燒、後則嘔瀉、嘔瀉之物、在暗處必發光、所嘔者、先乃胃中之食物、後則涸液、繼則膽液、末或帶血、病狀儼若腸胃炎症、抑或有不瀉、而反乾燥者、不久肝經腫大而痛、過一二日、病似少瘉、未數句鐘、睟顯黃色、越片時、遍體俱黃、竟成癀症、至此景況、嘔吐疼痛、復又大作、所吐者、形色與加非渣相似、大便乾燥、即或有之、必然堅硬如石、其色淡黃、因其中無膽液耳、所吐者、亦無膽液、蓋因肝經發炎、肝脘俱腫而堵塞也、此時腦部之病顯、如肌跳、頭痛、頭暈昏譫、慾瘼瘲等患、後則不省人事、以至殞命、雖延至數日、亦難痊瘉、因五臟變壞爲脂、生活亦不久耳、服過分劑者、其尿必少、中或含胎、中此毒之狀、有時與肝黃枯症相同、若不於其所吐瀉者、詳加考驗、則此二病難以分別。

解毒法　高銅硫强礬、雖有敵硄之能、但其毒力、與硄相等、故不宜用、惟氟氯强洽、或錸錳上礬、乃最妙之敵藥、製火柴者、因常吸硄氣、亦有漸中毒者、然病狀與服者不同、但

第十二章 論改症藥類

硄 PHOSPHORUS. 此乃化學中原質之一、油易化之、醇酒與伊打、署能化之、別具一種氣味、如先置於光處、後置於暗處、則發光、遇空氣則燃、必加水貯於瓶內、塞嚴方可、骨腦二部、俱含此質、故有補此二部之能。

療效 此藥有補骨之功、無論成人嬰孩之骨輭[1]症、俱大有效、人因腦力耗竭、以致生汗[2]過多、或因過用腦力、致患憂鬱[3]症、服之常效、凡重熱症、如腸熱[4]或腸熱肺炎[5]等症、若腦部受傷過甚、此藥有效、即病勢漸瘉、服之亦妙、因有補助之功也、戒鴉片[6]與患陽痿[7]者、服之有效、癤[8]癰[9]膶腺[10]炎等症、大效、有醫者云、肺炎[11]症、宜服微分劑、以其有補腦之功、故見效甚速、若因腦部被阻、以致系痛[12]症、與顱腦變輭[13]及顱腦衣久炎[14]症、此藥皆效。

藥製與分劑

硄 Phosphorus 一厘之百分之一、(0.0006) 成丸服之、Pilulæ Phosphori, B. P. 若病勢沉重、漸增至一厘之五十分之一、(0.0012) 至二十分之一、(0.003) 亦可、但初服時、不宜過一厘之百分之一、(0.0006) 恐其有服藥之癖忌也。

硄油 Oleum Phosphoratum, B. P. 一至五量滴 (0.05-0.3)

1 Rickets
2 Sweats
3 Melancholia
4 Typhoid fever
5 Typhoid pneumonia
6 Opium habit
7 Sexual exhaustion
8 Boils
9 Carbuncles
10 Acne
11 Pneumonia
12 Neuralgia
13 Cerebral softening
14 Chronic meningitis

飯時服二量錢、(8.0) 用水送下。S.—Dessertspoonful in a little water with meals.

皇强酸 Acidum Nitro-hydrochloricum, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3) 此乃氫氯酸、與氰强酸相合而成。

淡皇强酸 Acidum Nitro-hydrochloricum Dilutum, 十至三十量滴、(0.6-2.0) 若服過分劑、育道驟然發炎、胃經甚受其害、宜用鹼類、或鹼、北方俗稱鹼子 油、卵青等、以抵其力、兼用鴉片、以止其痛。

淡硫强酸 Acidum Sulphuricum Dilutum, 五至二十量滴 (0.3-1.3)

香硫强酸 Acidum Sulphuricum Aromaticum, 五至二十量滴 (0.3-1.3)

此酸最爲妙劑、用時宜多加水冲服。

𨧻氯酸 ACIDUM HYDROCHLORICUM,

此酸乃無色之流質、臭嘗俱有酸味、無斂力、而大有潰能、宜存貯於黑瓶內、胃液每千分中含此酸二分、胃化脭梅(倍辛)必有此酸、方能成其功用。

療效 患熱症者、胃經少生此酸、於病時並病後服之、大效、患胃癌[1]症者、亦少生此酸、服之有效、酒醉後胃經不能消化、服之有效、胃泗炎症兼有鬆大之患[2]、宜多用此藥、以助胃經之功用。

藥製與分劑

淡𨧻氯强酸 Acidum Hydrochloricum Dilutum, 五至二十量滴 (0.3-1.3) 食滯症之良方如左。

淡𨧻氯强酸	R-Acidi hydrochlorici dil.	二量錢	(8.0)
倍辛香酒	Pepsin. essentiæ	一量兩	(30.0)
龍膽草雜酒	Tinct. gentian. comp.	加至四量兩	(120.0) -M.

1 Gastric cancer
2 Gastric catarrh with dilatation

始顯者、如服此藥而大便結燥、以致額痛、與輕瀉劑同服、則免此患、服此類藥時、大便結燥、無論頭痛與否、宜服瀉劑、但患痹瘋等症者、服之常致頭痛、雖服瀉藥、亦少有效、或有服之其胱不安、常欲小便者、孩童服之、間有遺尿之患。

高錳弱養澱 MANGANI DIOXIDUM PRECIPITATUM, U. S. 如因血薄而致經閉症、[1] 此藥有效、分劑三致五厘、(0.2-0.3) 日服三次、成丸用之、當於行經之前數日服之、但不可常服。

硫強酸 ACIDUM SULPHURICUM, 此酸大有潰力、能攝盡肉內之水、而留礎質、故肉變黑色、凡入藥之礎酸類、惟此酸最有斂力、且有凝脂之功。

祛　此藥由腎經、育道、皮膚而祛。

療效　此酸可爲花柳瘡[2]之潰藥、然其大用、乃醫盟瀉[3]霍[4]等症、醫盟瀉症、如與植類之斂藥同服、其效最大、霍症不但有醫之之能、並有防之之效、如用之以防此症、可將香硫强酸五滴、(0.3) 加水二量兩、(60.0) 日服三四次、有效、中鉛毒[5]者、此方亦效、因此酸與鉛合成不易化之礬、可免鉛被陳於身也、匠人之用鉛者、恐中其毒、當服此方防之、肺癆症之盜汗[6]、與顛茄或莫非並用有效。

藥製與分劑

1 Amenorrhœa
2 Venereal sores
3 Serous diarrhœa
4 Cholera
5 Lead poisoning
6 Night-sweats of phthisis

硫强酸、則發氣硫冶之味、是乃不純之明證、其大用乃醫血薄症[1]、因其無味、且斂力無多、故孩童服之最宜、分劑三至六厘、(0.2-0.36) 又有鐵粉餅、Trochisci Ferri Redacti, B. P. 每餅內含鐵粉一厘、(0.06)

鐵乳礬 (Ferri Lactas,) 水四十分能化藥一分、分劑五厘、(0.3)

鐵硫强礬 Ferri Sulphas, 分劑五厘、(0.3) 久瀉兼有血薄症[2]者、成丸服之有效、如以此藥五至二十厘、(0.3-1.6) 加水一量兩、(30.0) 則為有斂力之洗藥、另有二種、即枯鐵硫强礬、Ferri Sulphas Exsiccatus, 粒鐵硫强礬 Ferri Sulphas Granulatus, U. S. 分劑三厘。(0.2)

鐵甘松礬 (Ferri Valeras,) 癲症[3]兼血薄者、服此藥或效、但平腦之力無多、分劑一厘。(0.06)

鐵苦葡酒 Vinum Ferri Amarum, U. S. 成人或孩童之血薄症[4]、用之有效、如兼服魚肝油尤妙、分劑一至二量錢、(4.0-8.0) 又有鐵檸礬葡酒、Vinum Ferri, U. S. Vinum Ferri Citratis, B. P. 其功用分劑、與鐵苦葡酒同。

鐵醋礬消水 Liquor Ferri Acetatis, B. P. 分劑十五至六十量滴、(1.0-4.0)

鐵貼膏 (Emplastrum Ferri)

乖效 有服此類藥而胃不平、或兼有額痛者、此等乖效、有服一次即顯、亦有服數日而

1 Anæmia
2 Chronic diarrhœa with anæmia
3 Hysteria
4 Anæmia

加水、以絮蘸之、塞於鼻內、有效、然所成之血塊、仍存於鼻中、不易取出、故醫者不常用之、如腸熱症而便血者[1]、不可用、因此藥之體質、於胃內必被改變也、以高鐵硫强礬製成三厘 (0.2) 之堅丸、服之方可、如因胃經有恙而吐血者、可加水內服之、以其惹力過大、故不可勤服、喉門棚炎[2]、或喉炎[3]等症、以絮蘸之、敷於炎處、大效、亦可用水與甘油各半敷之、或其效尤大、但用時最宜謹慎、不可使藥滴於嗓內、痧症[4]亦效、鹼（北方俗稱胰子）乃此藥之敵。

鐵草礬 (Ferri Oxalas)　分劑二至三厘、(0.12-0.2)

鐵硫礬類此類分數種、乃

易化鐵硫强礬 Ferri Phosphas Solubilis, U. S.　分劑四厘、(0.25)

鐵硫强礬 Ferri Phosphas, B. P.　分劑二至五厘、(0.12-0.3)

鐵硫貴林糖漿 Syrupus Ferri Quininæ et Strychninæ Phosphatum, U. S. Syrupus Ferri Phosphatis cum Quinina et Strychnina. B. P.　分劑一量錢、(4.0)　此方內之鐵、即鐵硫强礬。

鐵硫强礬糖漿 Syrupus Ferri Phosphatis, B. P.　分劑一量錢、(4.0)

鐵粉 Ferrum Reductum, U. S. Ferri Redactum, B. P.　此粉之精純者、撒於燈火上、則必燃著、否則必有炱煤羼雜、如加

1 Intestinal hemorrhage
2 Tonsillitis
3 Pharyngitis
4 Diphtheria

高鐵氹 Ferri Hydroxidum, U. S. 此乃敵砒毒之藥、惟新製者有效、製法、無論何鐵、製成流質、加鹼類、即鏀氹消水、或鎂養所沉澱而成者、如用鏀氹消水所製者、必以水洗數次、去其鏀味、方可用之、否則恐有惹胃之患、以鎂養製之最妙、蓋鎂養原有敵砒毒之功、且無惹力、如遇中砒毒者、即宜多備、少則恐不敷用。

鐵氯糖漿 Syrupus Ferri Iodidi, 此藥乃透光之漿、味甜似鐵、若加糖於其內、其色不變、倘變爲藍色、則不宜用、因其內含未成鹽之氯質也、(未成鹽之氯大有惹力) 其大用、乃醫血虧[1]、瘰癧[2]等症、如孩童癩症[3]、而兼血虧者、其效尤妙、二正歲之孩童、可服二至三量滴、(0.12-0.2) 成人可服三十至四十量滴、(2.0-2.6) 滴於水內、以玻璃管服之、可免牙齒受傷、又有糖鐵氯鹽、(Ferri Iodidum Saccharatum.) 可代鐵氯糖漿之用、分劑二至五厘、(0.12-0.3) 鐵氯鹽丸、每丸內含鐵粉一厘之六分之一、(0.01) 氯一厘之八分之一、(0.008) 分劑一至三丸。

高鐵硫强礬消水 Liquor Ferri Subsulphatis, U.S. Liquor Ferri Persulphatis. B.P. 此藥大有斂力、遇血則凝成黑硬之塊、必須外敷方效、若身內流血者、服之無效、咳血症[4]、以此藥十至六十量滴、(0.6-4.0) 加蒸水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內、噴於口中、令其吸之、或效、𦜝流血症[5]、無論因何而致、可加水一半、敷患處有效、𦜝頸流血[6]、或𦜝瘜流血[7]、可敷此藥、但不必加水、鼻衄症[8]、或加水一半、或不

1 Anæmia
2 Scrofulosis
3 Eczema
4 Hæmoptysis
5 Uterine hemorrhage
6 Cervical hemorrhage
7 Hemorrhage from uterine polypus
8 Epistaxis

此藥敷服俱可、宜用足分劑、切當加水、以玻璃管服之、可免牙齒受傷、分劑七至三十量滴 (0.5-2.0) 另有泡製之鐵氯鹽二類、一爲鐵氯强鹽消水、Liquor Ferri Perchloridi B. P. 服之者甚少、分劑四至十量滴、(0.25-0.6) 一爲濃鐵氯强鹽消水、Liquor Ferri Perchloridi Fortis, B. P. 歛力頗大。

鐵檸礬類 Citrates of Iron 此類藥原分數種、乃

鐵檸礬 Ferri Citras, U. S. 分劑五厘 (0.3)

鐵錏檸礬 Ferri et Ammonii Citras, B. P. 色紅而結薄晶、分劑五厘、(0.3)

鐵貴林檸礬 Ferri et Quininæ Citras, B. P. 分劑五至十厘 (0.3-0.6)

鐵士的年檸礬 Ferri et Strychninæ Citras, U. S. 分劑一至三厘 (0.06-0.2)

易化鐵貴林檸礬 Ferri et Strychninæ Citras Solubilis, U. S. 分劑一至五厘 (0.06-0.3)

均畧有激斂二力、且與胃道無所妨碍、水易化之。

鐵菓礬類 Ferri Tartras, 此類藥原分二種、乃

鐵錏菓礬 Ferri et Ammonii Tartras, U. S. 分劑五厘 (0.3)

鐵鉀菓礬 Ferri et Potassii Tartras, U. S. 分劑五厘 (0.3)

淡醋酸	Acidi acetici dil.	六分
錏醋消水	Liquor ammonii acetatis	四十分
陳皮甘香酒	Elix. aurantii	十分
甘油	Glycerini	十五分
水	Aquae	二十五分—M.

分劑一至四量錢、(4.0-16.0) 多加水冲服。

S.—The dose is from one to four drachms, well diluted.

低鐵氯盐 (Ferri Bromidum) 嘗有名醫以此藥五至二十厘、(0.3-1.3) 加糖漿、以醫血虧而兼有肌跳者[1]有效。

甘鐵碳强礬 Ferri Carbonas Saccharatus, U. S. 此藥無甚斂力、可成丸服之、分劑三厘、(0.2) 因血虧之經閉[2]症、多以此藥醫之、或用鐵碳雜調水半至一量兩 (15.0-30.0) 亦可。

鐵氯强盐酒 Tinctura Ferri Chloridi. U. S. Tinctura Ferri Perchloridi. B. P. 此藥爲最常用之品、鐵類中利小便者、惟此效最大、[illegible][3]症、宜用足分劑、並當勤服、如胃經能受、每句鐘服五滴、(0.3) 亦不爲過、腎久炎[4]症、服此藥有效、並有減尿腥之功、血虧[5]症、於其所含之酸、有滋補之功、痧[6]症、與喉門欄炎[7]症、

1 Anæmia associated with chorea
2 Amenorrhœa
3 Erysipelas
4 Chronic Bright's disease
5 Anæmia
6 Diphtheria
7 Tonsillitis

之、血旺者忌用小分劑之功效、與中分劑同、並少有大便乾燥之患、血虧重症、如因血中之鐵祛之過多、用足分劑以補其不足、最妙、然必有宜用之確據方可、否則必有損傷、因此類藥之用不同、故一一論之。

鐵錏硫强礬 Ferri et Ammonii Sulphas, U. S. 婦女虛弱而患白帶者[1]、可服、因其斂力過大、故病者胃經發炎、則不宜服、分劑二至五厘。(0.12-0.3)

鐵香調水 (Mistura Ferri Aromatica,) 此藥含鐵甚少、倘病者服鐵宜多、則不便用之、若因熱症、致微有血虧[2]、飯後服一二量兩、(30.0-60.0) 頗效、此水內有鐵與辛蔻那皮、加林嗶、丁香、豆蔻雜酒、陳皮酒、薄荷冰等藥。

低鐵砒强礬 Ferri Arsenas, B. P. 乾皮症類[3]、服一厘之十六分之一、至十二分之一、(0.004-0.005) 有效、久瀉而血虧者[4]、亦效、不但補虧、且能止瀉。

鐵錏醋礬消水 Liquor Ferri et Ammonii Acetatis, U. S. 此藥乃爲易服有效之品、新久腎炎之血虧症[5]、服之能利小便、且能發表、製法如左。

鐵氯强塩酒 ℞- Tincturae ferri chloridi, U. S. / Tinctura ferri perchloridi, B. P. 四分

1 Atonic leucorrhœa
2 Anaemia
3 Dry forms of skin disease
4 Anæmia of chronic diarrhœa
5 Anæmia of acute and chronic nephritis

第十一章 論補藥類

鐵 FERRUM, 此係金類、因人血中含有鐵類、故爲人身必需之物、或謂不但入藥、亦能養身、揀藥册中所載鐵製藥類甚繁、然不常用者居多。

體功效 此藥只服一劑、無甚功效、若連日服之、血與血紅脒、俱必加增、服過分劑而不能吸者、則由大便祛之、即使被吸、祛之則緩、其祛也不藉膽腎、乃被血運至腸內、仍由大便祛之、故於其糞中以化法亦可得回此藥、或謂此藥既已被吸、永不能祛、然絕無此理、夫鐵能令氫變成臭氣、故改變物體甚速、因而知其有養育人身之功也、鐵之入藥者有二類、一可化者、一不可化者、可化者、於胃中與胃液、成爲不易化之鐵類、被吸甚緩、故不可化者甚妙、按此類藥中、鮮有無斂力者、若服之過多、必致大便結燥、胃經略失功用、最有斂力者、乃高鐵硫强礬、(Ferri Subsulphas.) 與低鐵硫强礬、Ferri Sulphas, 其次乃鐵錏硫强礬、Ferri et Ammonii Sulphas, U. S. 與鐵氯强鹽、Ferri Chloridum, U. S. 斂力最小者、乃鐵粉、Ferrum Reductum. U. S. Ferri Redactum, B. P. 甘鐵碳强礬、Ferri Carbonas Saccharatus. 鐵錏檸礬消水、Liquor Ferri et Ammonii Acetatis, U. S. 鐵檸礬類、鐵菓礬類、鐵乳礬、鐵硄强礬等。

療效 鐵藥類、常用於血紅脒紅腥缺少、及血虧[1]等症、醫此等症、宜先以紅脒紅腥表試

1 Anæmia

積毒　服此礬日久者、必沉澱於皮、以致週身發青、其最先顯著者、乃於盰睟、或唇涸膜上有青綫一道。

解毒法　新毒解法　化學中敵此毒者、乃鈉綠盐、即常食之盐以水化開服之、兼服鴉片、並油類、以平其育道、且宜多飲牛乳、並鹼水、以抵其毒力、並宜以煖身之法煖之。

積毒解法　漸積此毒者、皮之青色、無善法可去、用鉶氣盐、或有微效。

銀脭礬(PROTARGOL)　此藥近數年來、始入藥用、乃以銀與脭製成、色黃、其質細粉、每百分內含銀約八分有奇、冷水滾水俱能化爲消水、其色黑紫、此消水內加脂、或淡氳氣酸、或鹼藥類、俱不能使之沉澱、故與銀氰强礬不同、白濁[1]與白濁之睟炎[2]、用之有效、因其能滅此症之穉也、醫白濁之用法、以此藥一至五厘、(0.06-0.3)加水百量滴、(6.6)射入尿脘內、乃爲合宜、醫白濁睟炎之用法、以此藥一分、加水二至四百分、製成淡消水、滴於目內、方爲合宜、他類睟炎久症、用之亦可。

1 Gonorrhœa
2 Gonorrhœal conjunctivitis

若喉癆[1]症、可以半至二厘、(0.03-0.12) 化於一量兩 (30.0) 水內、用噴霧具噴之、或效、有名醫以此法醫啼嗽[2]症、令病者或能安然睡臥、因此藥易致人嘔吐、故宜在飯前噴之、噴具之口、病者必銜於唇內、則免染黑之虞、白濁[3]症之中程、將此藥半厘、(0.03) 以水三量兩 (90.0) 化之、射入尿脘、有效、痞頸生瘍[4]與白帶症[5]、如痞頸腫痛、以淡銀丹敷之有效、倘敷此處、而覺頭痛、當服鋏氣塩十厘 (0.6) 以止其痛、陰肛二處作癢[6]、用此礬四至六厘、(0.25-0.4) 化於一量兩 (30.0) 水內、每日用刷敷二至四次、有效、臥瘡將起[7]時、其皮先紅、可以此礬二十厘、(1.3) 化於一量兩 (30.0) 水內、以刷敷於紅處、可免成瘡之患、如已成瘡、此法無效、癤[8]初起時、頂有膿飽、四圍發硬者、可用五厘、(0.3) 化於一量錢 (4.0) 水內、敷之、可免生膿之患、睥瘢炎[9]可用淡銀丹擦之、或以此礬十厘、(0.6) 化於一量兩 (30.0) 水內、敷之亦可。

毒力　新毒　服毒分劑者、霎時必有腹痛、嘔瀉等患、育道發炎、腹內凝結、面紫、容戚、且生汗不止、所吐者、或白、或棕、或黑、無一定之色、唇則先白、不久變爲棕色、後則變黑、或腦部受惹過甚、致有似癇之痪癱、並有譫語、其死也、或因育道發炎、或因呼吸司所停止、氣脘必有淡泗液充塞其中。

1 Laryngeal phthisis
2 Whooping-cough
3 Gonorrhœa
4 Ulceration of cervix
5 Leucorrhœa
6 Pruritus pudendi vel ani and vulvæ
7 Bed-sores
8 Boils
9 Granular lids

久、宜停半月、然後再服、如久服之、恐皮色改變、因其祓祛最緩也、已有人查明、連用此藥一兩、面色有變黑紫之處、然僅用一兩、而皮色改變者鮮矣。

淡銀丹 又名銀鋏氰礬 Argenti Nitras Mitigatus, 此係銀氰强礬一分、鋏氰强礬二分、製成、乃外科之淡潰藥。

鑄銀丹 又名鑄銀氰强礬 Argenti Nitras Fusus, U. S.

韌銀丹 又名韌銀氰强礬 Argenti Nitras Induratus, B. P.

外用 痘熱作漿時、在第四五日內、將此礬二十厘、(1.3) 化於一量兩 (30.0) 水內、以針蘸之、挑破其痘、則免成痘痕[1]、亦有人謂、以此礬五至十厘、(0.3-0.6) 化於一量兩 (30.0) 水內、敷於痘上、其效與用針挑破之法同、此二法皆爲免其生膿太過也、前數十年、醫者常以此礬化於水內、以敷瘡症[2]、今因有較此法尤妙者、故少用之、然於他類皮炎症、敷之有效、陽腺炎[3]、或精腺冠炎[4]、於症初患時、用大分劑、化於水內敷之、一可止痛、二能消腫、指筋鞘炎[5]、初患時以此消水敷之、或免生膿之患、喉嗓喉門口各類之炎症[6]、敷之有效、然此消水、必有濃淡之不同、若受風之喉痛症、自覺喉洇膜有脫落之勢、以六十厘、(4.0) 加水一量兩、(30.0) 化而敷之、大效、此法用藥雖多、然較少用者受痛輕而功效大、

1 Pitting of smallpox
2 Erysipelas
3 Orchitis
4 Epididymitis
5 Felon
6 Inflammations of pharynx, larynx, fauces and mouth

至達於層下之肌已。

祛　此藥被祛甚緩。

療效　胃瘍症[1]、與鬧羊花膏、或鴉片相合、成丸服之、最妙、無論新久之胃泗膜炎症[2]、如多有噫噎嘔酸或飯後嘔吐者、頗效、宜在飯前半句鐘、服一厘之六分之一、至四分之一、(0.01-0.015) 乃乘胃經空閒之時、俾藥力易達於病處也、有名醫用此礬以醫腸生瘍症、謂爲最妙、但宜將此礬製之成丸、以角素爲衣、使其過胃、方能融化、則藥力乃達於患處、闌肛等處生瘍[3]、或新久痢症[4]、可用爲射肛藥、惟闌瘍必以六十厘、(4.0) 加水三量磅、(1500.0) 射之、若醫肛瘍、只用礬三厘、(0.2) 加水四量兩 (120.0) 射之、肛瘍日久者、可用礬五厘、(0.3) 加水四量兩 (120.0) 射之、但未射之先、宜用溫水將胴洗淨、水內忌有鹹（北方俗名膁子）與鈉氯鹽、因其有敵此礬之能也、射之之時、宜備鈉氯鹽消水、倘病者不勝礬力、即以鹽水射之、其力可解、脊髓旁柱後柱變硬症[5]、如非因楊梅牽累者、此藥或效、癇[6]、肌跳[7]等症、昔日多以此藥醫之、近少用之、因其鮮有功效也。

藥製與分劑

銀氰強礬 Argenti Nitras, 一厘之六分之一、至四分之一、(0.01-0.015) 成丸用之、服兩月之、

1 Gastric ulcer
2 Chronic and acute gastric catarrh
3 Ulceration of cæcum and rectum
4 Acute or chronic dysentery
5 Lateral and posterior spinal sclerosis
6 Epilepsy
7 Chorea

而死也、可知此藥之毒、較砒毒尤速也、有道生瘍之瀉症[1]、與鴉片並服有效、分劑一厘之四分之一、至一厘、(0.015-0.06) 乾皮症[2]、瘰癧症[3]等、常以砒醫之、如服砒而不受、則以此藥之微分劑代之、即一厘之十分之一、(0.006) 有效、或謂微分劑有感肌之能、故服之者、肌必硬而有力、近有醫家云、血虧症[4]、以高銅砒弱礬 (Cupri Arsenitum) 醫之、爲最妙之劑

頑瘍症[5]、以銅礬塊擦之、或研爲細末撒之、有效、睟炎[6]之中程、用銅礬一至三厘、(0.06-0.2) 化於一量兩 (30.0) 水內洗之、乃爲妙劑、嗓鬆痛症[7]、以銅礬四厘 (0.25) 化於一量兩 (30.0) 水漱之、有效。

解毒法　先服鋏低鐵藍洽、Potassii Ferrocyanidum 此乃化學中之敵藥也、後服洋橄欖油、與卵青、再後用吐劑、或用胃抽器抽之、倘業已吐瀉、腹痛必甚、不可再用吐藥、宜於吐後服鴉片酒之中分劑、敷芥末糊藥於腹外、然中此藥而成積毒者鮮矣。

銀氰強礬 ARGENTI NITRAS,

此礬結晶透光、水一分、能化藥一分、敷於皮上、先發欖色、後則變黑。

體功效　此礬與鉛鉍鋅等礬類同、凡洇膜發炎、此數礬皆可服之、因其頗有斂力、少有惹力也、若敷之、則潰力甚大、緣其有凝胎之能、故所潰不深、既凝胎成層、其潰力即不

1 Diarrhœa
2 Skin diseases of the dry type
3 Scrofula
4 Anæmia
5 Indolent ulcers
6 Subacute conjunctivitis
7 Relaxed Sore throat

鋅醋強礬 ZINCI ACETAS, 此藥結晶、形如鱗片、色白、味澀、無臭、水能化之、敷於皮或洄膜上、則有斂力、然較鋅硫強礬之斂力爲小、睥炎症[1]、用此藥一或二釐、(0.06-0.12) 化於一量兩 (30.0) 水內、洗之有效、白濁症[2]、以此藥一至二十釐、(0.06-1.3) 加玫瑰水一量兩、(30.0) 射入尿脘、有效、中此藥之毒者、醫法與醫育道炎症同、中毒日久者、肌肉被攤、腦系作痛、身體疲憊、然不常有之。

銅 (CUPRUM) 此係金類、不入藥用、入藥者乃高銅硫強礬、俗名藍礬 Cupri Sulphas, 色藍、味澀、結晶、晶之大小不同、冷水四分、或滾水二分、皆能化藥一分、醇酒不能化。

體功效 此藥敷於洄膜、大有斂力、敷於瘡口、微有潰效、服毒分劑者、越一句鐘、胃甚燒痛、口覺銅味、後則嘔吐、所吐者乃藍水與粘沫、再後瀉腹、先則其糞如常、後則血與粘沫、育道發炎、至力耗盡而死、將死時、必有似癇之瘈瘲、或有流涎甚多者、

療效 此礬乃爲速而有力之吐藥、其令人嘔吐者、非激嘔吐司所、乃激胃系末也、分劑五至七釐、(0.3-0.5) 以其惹力過大、如服一次無效、不可再服、宜以鋅硫強礬、或芥末代之、按此藥不可輕用爲吐劑、惟中砒毒者、可謹慎用之、因其在化學中爲砒之敵藥也、近有人以砒毒犬、用此藥醫之、卒不可救、細查其故、非因砒毒而死、乃因中此藥之毒

1 Conjunctivitis
2 Gonorrhœa

鋅碳強礬澱 ZINCI CARBONAS PRÆCIPITATUS, U. S. ZINCI CARBONAS, B. P.

此藥之功用、與鋅養同、因其有斂力、敷於患處、可免衣服蹭磨之虞、故常用之於皮濕與濕癩[1]等症、多有醫者、醫濕癩症、不用過澱者、良方如左。

鋅碳強礬	℞-Calaminæ	一英錢	(4.0)
鋅養抹膏	Unguenti zinci oxidi	七英錢	(28.0) —M.

敷於患處。 S.—Apply to the eczematous spot.

嬰孩因大小便惹皮、致患對磨瘢[2]者、良方如左。

鋅碳強礬散	℞-Pulveris calaminæ	二英錢	(8.0)
鋅養	Pluveris zinci oxidi	四英錢	(16.0)
甘油	Glycerini	四量錢	(16.0)
醇酒	Alcoholis	二量兩	(60.0)
水	Aquæ	加至一量磅	(480.0) —M.

每換兜布時、用絮蘸藥、敷於患處。 S.—Apply with a mop after each removal of the diaper and allow to dry.

1 Weeping eczema
2 Intertrigo

瘍[1]癲[2]等症之良方如左。

筋膠	R-Gelatini	四分
水	Aquae	十分
甘油	Glycerini	十分
鋅養	Pulveris zinci oxidi	四分

此方先以筋膠置於水內、用火化開、後加甘油、再後加鋅養、宜隨加隨調、調勻即傾於盆內冷之、俟其凝塊、方可用之、有消腫之能、亦有平輔之用、用時先以鹼水、將患處之全肢洗淨、再用淡酒洗之、將此藥化開、以刷蘸之、敷於患處之四圍、以絮覆其瘡口、用二寸寬之紗布條纏之、務須裹平、後用剪通上下鉸開、再敷藥一層、仍用紗布如前裹之、又復剪開敷之、如此裹至三四層爲止、最要者、宜從足趾裹至膝蓋、然後用尋常之布捲、再裹一層、越二十四句鐘、乃可去之、先裹者狀如白色庫秋、如瘡口流膿過多、宜於該處剪開一口、令膿流出、亦由此口敷之以藥、但宜令病者躺臥、使其腿高於身、越一二日、令其行走、必見功效。

1 Ulcers
2 Eczema

皮症皆可用之、孕婦之皻[1]患良方如左。

鋅　養	℞-Zinci oxidi	三英厘	(0.2)
錄錏洽	Hydrargyri ammoniati	一英厘	(0.06)
蔻蔻脂	Olei theobromæ	一百五十英厘	(10.0)
蓖麻油	Olei ricini	一百五十量滴	(10.0)
玫瑰花油酒	Essenciæ rosæ	十量滴	(0.6)

日敷二次。S.—Apply to face night and morning.

癩皰[2]症之良方如左。

樟腦散	℞-Pulveris camphoræ	三十英厘	(2.0)
鋅　養	Pulveris zinci oxidi	一百八十英厘	(12.0)
甘　油	Glycerini	四十量滴	(2.6)
安息香豬脂	Adipis benzoinati	一英兩	(30.0)

敷於患處、或先撒鉍礬類、後敷此膏亦可。S.—Apply to the part.

1 Chloasma of pregnancy
2 Eczema

空氣即成細粉。

服法　此藥有惹胃系末之能、以十至三十厘、(0.6-2.0) 溫水化服、可作吐藥、如服一次、過二十分鐘而不吐、可再服之、如仍不吐、可以芥末代之、此藥令人嘔吐、較銅硫强礬之力小、然毒力亦小、白濁[1]症、可用此藥少許、以水化之、射入尿脘、有效、盬瀉[2]症、製成二厘 (0.12) 之丸、服之有效、如用鴉片小分劑、或獨脚蓮精一厘之六十分之一、(0.001) 尤妙、眸炎[3]症、可以此藥一至二厘、(0.06-0.12) 加水一量兩、(30.0) 洗之有效。

鋅養 ZINCI OXIDUM,　此藥色白、無味、形如細粉、水不能化、對磨瘕[4]、眸炎[5]等症、用之有效、如與鉍礬、倍辛等藥並用、以醫孩童之暑瀉[6]症有效、癆症之盜汗[7]、良方如左。

鋅　養	R-Zinci oxidi	三十英厘、(2.0)
顛茄膏	Extracti belladonnæ foliorum	三英厘、(0.2) —M.

製成十丸、每晚服一丸。Fiant pilulæ No. X. S.—One at night before going to bed.

此方之功效、在乎顛茄、有名醫用此方、醫痚[8]與啼嗽[9]等症。

鋅養抹膏 Unguentum Zinci Oxidi,　此藥皮科常用之、湯傷[10]、膿瘡[11]等有效、乾皮症忌用、凡濕[12]

1 Gonorrhœa
2 Serous diarrhœa
3 Conjunctivitis
4 Intertrigo
5 Conjunctivitis
6 Summer diarrhœa of children
7 Night-sweats
8 Asthma
9 Whooping-cough
10 Burns
11 Sores
12 Moist skin disease

鉍柳下礬 Bismuthi Subsalicylas. U. S. Bismuthi Salicylas. B. P. 此藥色白、質軟、水、醇酒、伊打、哥羅芳等、皆不能化、惟酸類能化之、育道泗膜發炎時、所食者如有釀患、此類藥能醫之、因其有免釀之力也、分劑三至十五厘。(0.2-1.0)

鉍加沏下礬 Bismuthi Subgallas, U. S. 此藥無味、色黃、置於盤中、歷久不改其體質、其外敷之功用、能令瘡口發乾、生膿之穉無從而生、與黃氰同、因其斂力過大、故頑瘍忌用、宜用有惹力之藥方能見效、醫瘰瘡、此藥或不如黃氰之妙、然其毒力較黃氰微小、故少有中此毒者、皮濕症類[1]、或散或抹膏皆可用之、抹膏之製法、每兩 (30.0) 內有鉍加沏下礬散三十至六十厘、(2.0-4.0) 或加鉦養相等之分劑、亦可、曾有以此散五至十厘、(0.3-0.6) 醫中耳聤症[2]、而見大效者、亦有以之醫食滯之釀症[3]、謂有大效者。

鈰草礬 CERII OXALAS, 此藥色白無味、形係微粒、空氣不能變其體質、水與醇酒皆不能化、氫氯酸能化之。

療效 孕吐患[1]、與鉍氰下礬同用、或專用、此藥皆效、若用之以醫胃酸[5]、藥亦可、分劑二至五厘、(0.12-0.3) 製之成丸、每三四句鐘服一丸。

鉦硫強礬 ZINCI SULPHAS, 此藥色白、結晶、小如砂粒、臭之無味、嘗之味酸、水能化之、遇

1 Moist skin diseases,
2 Otitis media
3 Fermentative dyspepsia
4 Vomiting of pregnancy
5 Gastric acidity

常有噫噎者、服鉍礬類俱效、胃系痛[1]、胃瘍[2]、胃炎[3]等症、鉍礬類有平斂之功、惟育道新炎症、鉍錏檸礬忌服、因其惹力過大也、夫鉍礬中微含碲質、服之日久者、口中必有蒜味、大便每有黑色、若舌生苔、亦每有黑色者、手臉皴裂[4]之良方如左。

鉍氰下礬	℞-Bismuthi Subnitratis	百八十英厘、	(12.0)
鋅蕣油礬	Zinci Oleatis	百八十英厘、	(12.0)
金　粉	Lycopodii	百二十英厘、	(8.0) —M.

日敷三次。 S.—Apply to the parts t. i. d

近今入藥者、更有數礬、列之於左。

鉍安息礬 (Bismuthi Benzoas.) 此藥色白、無味、形如細粉、水不能化、近數年來、德人常用之以醫瘄症[5]、因其收口最速、所留之瘢痕亦小也、各類之楊梅瘡、或他類之頑瘡[6]、用之亦可、用法、先以淡錸氯强塩消水洗患處、後以此藥撒於瘡上、覆之以絮、用合口貼膏貼之、每二十四句鐘、必換一或三次方可、敷後或覺熱痛、然不久即止。

1 Gastralgia
2 Gastric ulcer
3 Gastritis
4 Chapping
5 Chancroid
6 Indolent ulcer

者謂、多服此藥、則育道發炎、近代人細心考查、乃知昔時之鉍礬類、與砒（又名鍩）混雜、故有育道發炎之患、若用過分劑日久、無論服數間有中毒者、用中分劑則否、若不常服、雖日服半兩、(16.0) 亦不受毒、人之受毒、育道有黑色之疪塊、腎必發炎、尿中多含脜類、英國揀藥册、另有鉍藥數種、如左。

鉍錏檸礬消水 Liquor Bismuthi et Ammonii Citratis, B. P. 分劑三十至六十量滴、(2.0-4.0)

鉍雜餅 Trochiscus Bismuthi Compositus, B. P. 每餅內有鉍二厘、(0.12)

鉍養 Bismuthi Oxidum, B. P. 分劑五至二十厘、(0.3-1.3)

體功效　鉍氰下礬、與鉍碳強礬、無體功效、服數略有斂力、此二藥入腹、必徧附於育道之洄膜、正所以保護洄膜也。

療效　服鉍礬類之足分劑、功效有二、一有斂力、二保衛發炎之洄膜、不受惹患、因胃受惹而嘔吐[1]者、服之有效、瀉洄液症[2]、宜先服草麻油、瀉淨洄液後服鉍礬、有效、盟瀉症[3]、如以鉍氰下礬 Bismuthi subnitras 十厘、(0.6) 與炥醇 Phenol, U. S. Acidum Carabolicum, B. P. 一厘、(0.06) 置於藥殼內服之、其效尤大、且微有攺酸之能、鉍錏檸礬、頗有斂力、在鉍礬中、惟此礬水能化之、盟瀉久症[4]、每二三句鐘、可服五厘、(0.3) 如因乳酸、乳油酸之釀患、以致胃不消化[5]、且

1 Vomiting
2 Mucous diarrhœa
3 Serous diarrhœa
4 Chronic Serous diarrhœa
5 Dyspepsia

藥製

淡鉛醋下礬消水 Liquor Plumbi Subacetatis Dilutus 因其力薄、故不常用。

鉛醋下礬蠟膏 Ceratum Plumbi Subacetatis, U. S.

鉛醋下礬擦藥 (Linimentum Plumbi Subacetatis.)

鉛醋下礬甘油 Glycerinum Plumbi Subacetatis, B. P.

此四藥俱能代鉛醋下礬消水之用。

鉛貼膏 Emplastrum Plumbi, 此膏乃用鉛醋下礬製成、有著名醫者云足生汗過多者[1]、以鉛貼膏、與胡麻子油各半、攤於布上裹之、三日一換、乃係妙法。

鉛弱礬 PLUMBI OXIDUM,

此藥醫家鮮有用之者、製藥者常用之以作鉛醋下礬消水。

鉛氰強礬 PLUMBI NITRAS, U. S.

此藥只用爲敷藥、甲母炎[2]重症可用之。

鉍 (BISMUTH)

此係金類、不入藥用、入藥者係鉍質所成之數礬、即鉍碳強礬、Bismuthi Subcarbonas, U. S. Bismuthi Carbonas, B. P. 鉍氰下礬、Bismuthi Subnitras, 鉍檸礬、Bismuthi Citras, U. S. 鉍錏檸礬、Bismuthi et Ammonii Citras, U. S. 前二礬功效相同、可隨意用之、分劑均五至二十厘、(0.3-1.3) 後二礬之斂力、較前二礬甚大、故宜服小分劑、均二至四厘、(0.12-0.25) 昔有醫

[1] Sweating of the feet
[2] Onychia

鉛碳强礬	℞-Plumbi Carbonatis	六十英厘	(4.0)
糭散	Pulveris Amyli	六十英厘	(4.0)
玫瑰水抹膏	Unguent. Aquæ Rosæ	一英兩	(30.0)
洋橄欖油	Olei Olivæ	一百二十量滴	(8.0) —M

敷於患處。S.—Apply to inflamed skin.

鉛氯塩 PLUMBI IODIDUM,

分劑半至二厘、(0.03-0.12) 然不常用爲服劑。

鉛氯塩貼膏 Emplastrum Plumbi Iodidi, B. P.

鉛氯塩抹膏 Unguentum Plumbi Iodidi, B. P.

鉛醋下礬消水 LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS, U. S. LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS FORTIS, B. P.

此藥與鴉片酒並用、以醫筋扭[1]與跌打[2]等傷、用法以此消水四分、鴉片酒一分、水十六分相合、敷傷處頗效、若醫漆咬[3]症亦效、如皮膚已破、則不可用、其故有二、一恐藥被吸而中毒、二此藥之斂力、能令傷口血少難於收斂、指筋鞘炎[4]初起時、可將饅首浸此消水、敷於炎處、以免生膿之患、肛癢[5]症、洗之有效、如濕癩[6]作癢、每日敷淡消水一二次、有效、敷後宜用淡鹼水類洗之。

1 Sprains
2 Bruises
3 Ivy Poisoning
4 Felon
5 Pruritus pudendi
6 Eczema

鉛醋礬 R-Plumbi Acetatis 四十英厘、(2.6)
鴉片散 Pulveris Opii 十英厘、(0.6)
樟腦 Camphoræ 四十英厘、(2.6) -M.
共成二十丸、每四句鐘服一丸。 Fiant pilulæ No. XX. S. One every four hours.

痢[1]症此藥可用、白濁[2]症、以一至八厘、(0.06-0.5) 加水一量兩、(30.0) 射入尿管內、有效、漆咬[3]症亦可用之、因其能抵拒漆毒、不使散佈也、用法以此藥半厘、(0.03) 加醇酒一量兩 (30.0) 洗之、後敷涼藥類、油類忌用、因漆毒能藉油性散佈也。

藥製與分劑

鉛醋鴉片丸 Pilulæ Plumbi cum Opio, B. P. 三至五厘、(0.2-0.3)

鉛醋雜肛彈 Suppositoria Plumbi Composita, B. P. 每彈內有此礬三厘、(0.2) 鴉片一厘、(0.06)

鉛醋抹膏 Unguentum Plumbi Acetatis, B. P.

鉛碳強礬 PLUMBI CARBONAS, B. P.

此藥色白、不易融化、湯傷[4]以油調敷、有效、曬皰[5]之良方如左。

1 Dysentery
2 Gonorrhœa
3 Ivy poisoning
4 Burns
5 Sunburn

解毒法　新毒解法　宜使之多服易化之硫强礬類、因此類藥購之甚便、且能變鉛醋礬成不毒之藥、亦能令人瀉淨腸內之物、並宜服吐藥、如未能吐淨、必須用胃抽器抽之、後用煖身之法、煖其腹與四肢、亦當服鴉片、以止腹痛、並平其胃道也。

積毒解法　一宜去中毒之原、二宜除淨身內已有之鉛、三宜治所傷之處、中此毒而腹痛者、當服渣笠鍅氯弱鹽等膽瀉藥、亦當與鴉片白礬並用、惟白礬只用二厘(0.12)餘者可用足分劑、此方亦可謂爲特方、若積中毒者、只服瀉劑、不與莫非並用、或無功效、因鉛之惹力、有阻大便之能、莫非有敵鉛惹之能、故用莫非以輔瀉藥之力也、如有因之而腦發炎者、宜在項上敷起炮藥、內服瀉劑、且可服披路加便令其生汗、更宜服鋏氯鹽、因其能令身內不易化之礬類、變成易化者、日服三次、每服十至三十厘、(0.6-2.0)若有漸癱之勢、宜服士的年、或鋏氯鹽、但此二藥性質相反、不可並用、亦可用法拉兒氏電具、以助肌之功用、如不見效、則用電池、或有裨益、此毒大半由肝而祛、亦有由大小便而祛者。

鉛醋礬 PLUMBI ACETAS,

此藥結晶、色白、其酸如醋、水能化之。

療效　盟瀉症[1]、可用此藥、且有良方如左。

1 Serous diarrhœa

綫、亦或有中毒者、因售此綫者、常攙鉛礬於其內、以圖獲利也、作茶食者、偶因雞卵價昂、以鉛鑛强礬代之、入食之或有中毒而殞命者、華人每用錫器、或磁器、以盛食物、亦或有中毒者、蓋因錫器中含鉛、磁器之釉亦含鉛也、積毒之狀、最明顯者、乃雙手下垂、因伸手肌被癱之故、惟伸拇短肌、與肱骸肌、不至被癱、但如此形狀、不常見之、亦有中此毒而成對眼者、因眼外直肌被癱也、亦有腹痛者、其痛自臍而起、佈滿全腹、且大便乾燥、所便者白或淺黃、不一、其色蓋因膽液缺少故也、至腹痛之時、血壓加增、必甚、舌生白苔、大便乾燥、有此現狀、若不速去有鉛之處、顱腦必漸積毒、終則發炎、如顯瘓癱、則殞命不遠矣、然亦有非因腦炎、乃因腎炎致腦中尿毒而瘓癱者、中毒者、以尿表試其尿、如體質過輕、則爲凶兆、緣其腎經大受其毒、而功用已失矣、亦有工匠、日與鉛礬細粉相近、呼吸之間、隨空氣入肺、致患瘰症者、以上所論中毒之狀、惟近牙之齦、顯有藍色、乃常見之狀也、無此藍色者、亦不敢定其果未中毒也、積毒症、多有血虧者、以致面無血色、久之腦系幹、少得血之養育、其狀如繩、或有脊腦前柱發炎者、而後柱變硬者甚鮮、倘有失和動之狀、乃因身內諸系發炎也、按鉛與尿酸相合、成爲不易化之礬、血將此礬催入骨節、故中毒者、或似癲症。

枯白礬 ALUMEN EXSICCATUM, 此藥撒於痼瘡[1]上有效、患齦頂齦[2]者、用此藥敷於齦上、大效、但用時必須謹慎、以其有傷牙之力也。

鉛 (LEAD) 此乃金類、不入揀藥冊、其所成之礬或鏽類、有入之者。

體功效　以易化之鉛礬、敷於洇膜上、其斂力必使該處發白、若其處先覺發炎、其白尤顯、鉛類之最毒而有惹力者、即鉛氰强礬、其次乃鉛醋下礬、惟鉛醋礬毒力最少、凡鉛中之礬、不易化者、不能立受其毒、然匠人用之日久、每有中毒者。

毒力　新毒　服鉛醋礬之過分劑者、受毒必速、口覺甜味、並金類之味、後覺胸痛、再後則吐白水、或帶食物、其水色白者、乃因胃內所存之鹽氯酸、與鉛變成鉛氯鹽也、其痛加增必速、大便或瀉或閉塞、所瀉者、其色必黑、因腸內存硫故也、形狀至此、其脉必速、硬如鐵綫、後則微弱、面色憂戚、或白或紫無常、並口甚乾渴、或腓肌轉筋、或全身之肌、間有微顫之處、迨至昏迷不省、乃將死之兆也。

積毒　中此毒者、少因易化之鉛礬類、多因不易化之鉛礬類、其形狀各有不同、如形狀異常、醫者當先審明果中鉛毒、抑或楊梅症所致、易中毒者、多係作鉛礬類之人、或多用鉛礬類之匠人、亦有因用烏髮水、偶中其毒者、蓋因此水常含鉛礬也、人以牙斷

[1] Old sores.
[2] Swollen gums.

量滴、(1.0-4.0) 與水與甘油同服、尤妙。

鋏白礬 ALUMEN,

此藥自礬石煉成、色白透光、嘗之味濇、其後畧酸。

體功效 此藥敷於洄膜上、必畧白而縮、敷於皮上、必漸厚而硬。

療效 喉痛症[1]、以二十厘、(1.3) 加水一量兩、(30.0) 敷於喉上、有效、因其易於傷牙、故少用之、流血症[2]、敷之乃爲止血之妙劑、其止血之能有三、一能使血內粹腥凝塊、二能使傷處縮緊、三用布蘸此藥之消水、礬即成晶、血遇此晶、即凝成塊、摘牙而流血不止者、此藥大效、癆症之盜汗[3]、或手足妄汗[4]、以此藥二厘、(0.12) 加水、或醇酒一量兩、(30.0) 洗之有效、吐血症[5]、以二十厘、(1.3) 加水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內、細密噴之有效、此法於氣脘炎而生痰過多[6]、或喉嗓久炎症[7]、亦可用之、凍瘃作癢[8]、或陰門作癢[9]、用消水洗之、有效、白帶症[10]、以十至二十厘、(0.6-1.3) 加水一量兩、(30.0) 洗其陰道、有效、喉門柵微核炎[11]、可用白礬莖塞於微核竅內、或以消水刷之、俱可、趾甲入肉[12]、用食水絮蘸濃消水、塞於甲傍大效、若用之爲吐藥、孩童之分劑一錢、(4.0) 成人四錢、(16.0) 初受鉛毒者[13]、可服之爲敵藥。

毒力 此藥雖有毒力、然少有服之而死者、緣其能令人嘔吐也。

1 Sore throat.
2 Hemorrhage.
3 Night-sweats,
4 Localized sweating.
5 Hæmoptysis.
6 Bronchorrhœa
7 Chronic catarrh of the pharynx and larynx.
8 Chilblains.
9 Pruritus vulvæ
10 Leucorrhœa.
11 Follicular tonsillitis.
12 Ingrowing toe-nails.
13 Acute lead poisoning.

風呂草 Geranium, U. S. 二十至六十厘、(1.3-4.0)

風呂草流膏 Fluidextractum Geranii, U. S. 三十至六十量滴、(2.0-4.0)

陽葛 RHUS GLABRA, U. S.

此藥係一類矮木、產於美國、入藥者乃其子。

喉痛症[1]以陽葛流膏 Fluidextractum Rhois Glabræ, U. S. 加水與甘油漱之大效、且有良方如左。

鋏氯强礬	℞-Potassii chloratis	六十英厘	(4.0)
陽葛流膏	Fluidextracti rhois glabræ	半量兩	(16.0)
烝　水	Aquæ destillatæ	加至三量兩	(180.0) ft. M.

每二句鐘用半量兩、(16.0) 再加水半量兩、(16.0) 漱之。

S.—To be added to an equal quantity of water in a glass and used as a gargle every two hours, after stirring.

香葛 (RHUS AROMATICA)

此藥亦係矮木、與陽葛相類、入藥者乃其根之皮、未入揀藥册、然醫者多用之、故不得不載之於書、若尿血[2]經旺[3]遺尿[4]等症、有醫者以爲妙劑、如因胱弱、致患遺尿、用香葛流膏頗效、分劑、八歲之孩童可服十五量滴、(1.0) 成人十五至六十

1 Sore throat
2 Hæmaturia
3 Menorrhagia
4 Incontinence of urine

玫瑰流膏 Fluidextractum Rosæ, U. S. 五至百二十量滴、(0.3-8.0) 只用之爲引藥、以解他藥之惡味。

玫瑰糖菓 Confectio Rosæ U. S. Confectio Rosæ Gallicæ, B. P. 此藥乃爲和他藥成丸之用。

玫瑰蜜 Mel Rosæ U. S. 六十至百二十量滴、(4.0-8.0)

玫瑰糖漿 Syrupus Rosæ, 一至二量兩、(30.0-60.0)

玫瑰酸冲藥 Infusum Rosæ Acidum, B. P. 一至二量兩、(30.0-60.0)

玫瑰水 Aqua Rosæ 常合他藥製爲敷藥類、亦與他藥合用、射入尿脘、以醫白濁[1]症。

玫瑰水抹膏 Unguentum Aquæ Rosæ, 常用以醫燙傷[2]、刃傷[3]、手裂[4]、唇裂[5]等患、如加甘油、或安息香酸少許、暑熱時可免腥味。

風呂草 GERANIUM, U. S.

此藥乃一類之草、入藥者係該草之根、內含炭匿酸、加沕酸、其用乃醫瀉症[6]、若孩童之瀉症、可將此草一二根、以牛乳一量磅、(480.0) 煮而服之頗效、且無藥味。

藥製與分劑

1 Gonorrhœa
2 Burns
3 Cuts
4 Chapped hands
5 Chapped lips
6 Diarrhoea

佳奴酒 Tinctura Kino, 二量錢 (8.0)

佳奴雜散 Pulvis Kino Compositus, B. P. 內有佳奴十五厘、(1.0) 洋桂四厘、(0.25) 鴉片一厘、(0.06) 醫瀉[1]症大效。

赤蘇木 HÆMATOXYLON, U. S. HÆMATOXYLI LIGNUM, B. P. 此藥係一類之樹、產於中亞美利加、與西印度羣島、入藥者乃其樹心。

療效 此藥之斂力無多、且氣味不惡、故孩童易服、盟瀉[2]或孩童瀉[3]症、大效、服之者、大小便必色紅如血、抑或有藍色者、醫者當先言明、免人驚恐、白帶[4]症、服之亦效。

藥製與分劑

赤蘇膏 Extractum Hæmatoxyli, U. S. 八至三十厘、(0.5-2.0)

赤蘇煮水 Decoctum Hæmatoxyli, B. P. 六十至百二十量滴、(4.0-8.0)

白槲樹 QUERCUS, U. S. 此藥係一類之樹、中西均有、入藥者、乃其細嫩之內皮、婦人之白[5]濁、或白帶[6]症、以白槲樹冲藥射之、有效、脫肛[7]痔[8]等症亦效、喉痛[9]症、用為漱藥亦可。

玫瑰花 ROSA GALLICA, U. S. ROSA GALLICÆ PETALA, B. P. 此藥中西均有、內含炭匿酸、加沕酸。

藥製與分劑

1 Diarrhœa
2 Serous diarrhœa
3 Diarrhœa of children
4 Leucorrhœa
5 Gonorrhœa
6 Leucorrhœa
7 Prolapsus recti
8 Hemorrhoids
9 Sore throat

每四句鐘服二小勺、(8.0) 用時切宜和勻。

S.—Dessertspoonful every four hours till relieved. To be shaken before using.

喉痛症[1]、流涎過多、已至中程者、可作漱藥、齦鬆症[2]、用之漱口、或效。

藥製與分劑

兒茶散 Gambir, U. S. Catechu, B. P. 二十至三十厘、(1.3-2.0)

兒茶雜酒 Tinctura Gambir Composita, U. S. 六十至百二十厘、(4.0-8.0) 此酒但以洋桂兒茶製成。

兒茶餅 Trochisci Gambir, U. S. 喉痛症、可噙於口內、但用之者少。

兒茶酒 Tinctura Catechu, B. P. 六十至百二十量滴、(4.0-8.0)

兒茶雜散 Pulvis Catechu Compositus, B. P. 二十至四十厘、(1.3-2.6) 內有佳奴加美喇。

佳奴 KINO,

此藥乃印度一類樹汁、曝乾而成、瀉症[3]服之有效、亦可用為漱藥、以醫喉痛[4]、或腭垂鬆軟症[5]。

藥製與分製

1 Sore throat
2 Spongy gums
3 Diarrhœa
4 Sore throat
5 Relaxation of uvula

加沕酸 Acidum Gallicum, 二至四十厘、(0.12-2.6) 與鐵藥類不合。

加沕酸抹膏 (Unguentum Acidi Gallici)

無食子 GALLA, 此藥生於各類槲樹之上、因蟲卵而生、其效皆在所含之炭匿酸。

藥製與分劑

無食子酒 Tinctura Gallæ. U. S. 三十至百二十量滴、(2.0-8.0)

無食子抹膏 Unguentum Gallæ,

無食子鴉片抹膏 Unguentum Gallæ cum Opio, B. P. 此膏有平斂之力。

兒茶 GAMBIR, U. S. CATECHU, B. P. 此藥乃由本樹之枝葉取出、其色深紅。

療效 此藥之大用、乃醫瀉[1]症、如所瀉者內多含盟、其效尤妙、若多含酒液、宜先用蓖麻油、或鎂硫强礬以瀉之、後用此藥、如與鴉片並用亦可、良方如左。

兒茶雜酒 ℞ Tincturae Gambir Composit. U. S, / Tincturae Catechu Composit. B. P. 二量兩 (60.0)

樟腦鴉片酒 Tincturae Opii Camphoratæ, U, S. / Tincturæ Camphoræ Compositæ, B. P. 二量兩 (60.0)

鍇礦强礬調水 Misturæ Cretæ 二量兩 (60.0) —M.

1 Diarrhœa

英揀藥册、每餅內含此酸半厘、(0.03)

炭匿酸甘油 Glyceritum Acidi Tannici U. S.
Glycerinum ,, ,, B. P.

炭匿酸抹膏 Unguentum Acidi Tannici, U. S.

火棉止血藥 Collodium Stypticum, U. S. 其功效俱在所含之炭匿酸。

炭匿酸肛彈 Suppositoria Acidi Tannici, B. P. 每彈內含此酸三厘。(0.2)

加沕酸 ACIDUM GALLICUM,

此藥大半由炭匿酸取出、結晶似針、冷水百分、或滾水三分、或醇酒四分半、皆能化藥一分。

體功效 此藥歸斂藥類、然無凝血之能、故身外流血症、敷之無甚功效、因有縮緊血管之能、故身內流血症、服之或有功效。

祛 此藥藉腎而祛、仍不改其體質。

療效 尿血[1]、咳血[2]、盜汗[3]、及氣管久炎[4]、致痰生過多[5]等症、用之有效、尿過多症[6]、與鴉片並用最妙、糖尿症[7]、或因腎弱致患脂尿症[8]、以及新久之瀉症[9]、服之俱效、瘍症[10]、與多生膿之瘡[11]、以加沕酸抹膏敷之、有效、外痔症[12]、以此膏與佛茄兒抹膏各半敷之、有效。

藥製與分劑

1 Hæmaturia
2 Hæmoptysis
3 Colliquative sweats
4 Chronic bronchitis
5 Bronchorrhœa
6 Diabetes insipidus
7 Diabetes mellitus
8 Albuminuria
9 Acute or chronic diarrhœa
10 Ulcers
11 Sores
12 External hemorrhoids

第十章　論斂藥類

炭匿酸 ACIDUM TANNICUM, 此藥自無食子取出、純而不雜、不能結晶、色淡黃、味酸、惟甘油與水能化之、醇酒伊打、俱不能化、各類植物之斂力、皆含此酸。

體功效　此藥敷於各類之腡、腡即縮緊、其血減少、蓋因血脂縮緊、故有阻生液之能、接此藥服之之後、必先變加沕酸、而後被吸、祛時仍爲加沕酸、此理宜切記之、倘醫流血症、患處不能敷藥、莫如用加沕酸、因加沕酸被吸尤速也。

療效　此藥之用有二、一能止血、二爲斂藥、虛弱之瀉症、服之有效、無論全身或一處、易於生汗[1]、以及初產之乳頭痛、與脚氣等症、敷之有效、咳血症[2]、宜用五至十厘 (0.3-0.6) 加水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內噴之、有效、洇膜虛弱[3]或頑瘍[4]、宜用二兩、(60.0) 加甘油八量兩、(240.0) 用煖化法化之、敷患處有效、流血痔症[5]、以此藥製成肛彈、大效、白帶症[6]、以絮蘸炭匿酸消水、塞於陰道、有效。

藥製與分劑

炭匿酸　Acidum Tannicum, U. S.　二至十厘 (0.12-0.6) 成丸服之最妙。

炭匿酸餅　Trochiscus Acidi Tannici,　美揀藥册、每餅內含此酸一厘、(0.06)

1 Sweating
2 Hæmoptysis
3 Depressed mucous membranes
4 Indolent ulcer
5 Bleeding hemorrhoids
6 Leucorrhœa

醋酸 Acidi acetici 一兩 (30.0) 量 一M.

以筆蘸之、敷於患處。 S.—Apply with a camel's hair brush.

尋常所用之醋、與淡醋酸相近、乳婦不宜多用、恐嬰孩有瀉腹之患、服過分劑者宜多用牛乳、或灰水鎂養等鹼藥類、以免育道受惹。

分四次服之方可、如因肝經畧失功用[1]、或腸泗膜發炎致患癀症[2]、此酸有效。

藥製與分劑

檸酸糖漿 Syrupus Acidi Citrici, U. S.　一至二量錢 (4.0-8.0)

檸檬汁 Succus Limonis, B. P.　半至二量兩 (15.0-60.0)

檸檬糖漿 Syrupus Limonis, B. P.　半至一量錢 (2.0-4.0)

醋酸 ACIDUM ACETICUM, 此藥由一類之木用烝法取出、臭之略甜、醫家所用者、乃無色之流質、每百量滴、(6.6) 內含冰醋酸三十六量滴、(2.36) 水六十四量滴、(4.25)

療效　此酸少用爲服劑、生皰藥類、冰醋酸 Acidum Aceticum Glaciale, 乃爲有力者、如以冰醋酸敷於瘊上、有祛之之能、若日久之瘡[3]、肉芽過長、敷於其上、有潰藥之功、淡醋酸 Acidum Aceticum Dilutum 可作洗藥、能醫盜汗症[4]、若輕流血症[5]、或鼻衂[6]、患以淡醋酸與水各半洗之、其血可止、嘔吐症[7]、每用布蘸熱醋酸臭之、或可止其嘔吐、陰陽具生瘊類[8]、敷之有效、且不覺痛、其良方如左。

柳酸 ℞-Acidi salicylici　三十英厘 (2.0)

1 Hepatic inactivity
2 Catarrhal jaundice
3 Sores
4 Night-sweats
5 Minor hemorrhage
6 Epistaxis
7 Vomiting
8 Vegetations about genitals

菓酸 ACIDUM TARTARICUM, 此藥由鋏氫菓礬取出、酸力無多、若服過分劑、必致腸胃發炎、宜服灰水鎂養等鹼藥類、吐藥類亦可用之、若甚疼痛、可用鴉片止之、此藥鮮有單用者、常與鈉氫碳强礬、或鋏氫碳强礬、製成自沸藥類、分劑五至二十厘 (0.3-1.3)

檸酸 ACID CITRICUM, 此酸大半由檸檬或香櫞取出、無色透光結晶顯之無味、嘗之味酸而美、如置於暖處則外起白霜、置於潮處則漸次融化、冷水半分、或醇酒一分半、或伊打十八分、俱能化藥一分、不但檸檬含有此酸、各類酸菓俱含之、用化法查驗、與檸檬汁同、而其效不同。

療效　此藥不但能豫防癥症[1]、且能醫之、然不如檸檬汁之效大、故檸檬若便、總宜取其汁、不必用此酸也、若欲存貯此汁、以便取用、其法壓取檸檬之汁、置於火上滾之、乘熱灌入瓶內、然不可使瓶盈滿、以距瓶口半寸為度、後以洋橄欖油灌滿其瓶、以塞塞嚴、如此可免日久變壞之虞、如患腸熱症者、常食牛乳、因乳內多含錯礬、或致絡內結成血團、越二三日、可兼服此酸三次、每次五厘 (0.3) 則免此患、以其能敵乳內之錯礬也、倘服之過多、亦能令血成團、故不宜日日服之、無論新久痺症[2]、日服檸檬汁四次、每服一至二量兩、(30.0-60.0) 有效、但宜多以水送下、如檸檬汁不便、日以此酸二錢、(8.0) 亦

1 Scurvy
2 Acute or chronic rheumatism

淡氰藍酸 R-Acidi hydrocyanici dil. 六十量滴 (4.0)

洋郁李糖漿 Syr. Pruni virginianæ 三量兩 (90.0) —M.

每四五句鐘、服一小勺。 S. Teaspoonful every four or five hours.

陰門癢[1]或他處作癢者、敷之有效、其良方如左。

銾氯强盐 R. Hydrargyri chloridi corros, U. S., Hydrargyri perchloridi. B. P. 一英厘半 (0.09)

淡氰藍酸 Acidi hydrocyanici dil. 六十量滴 (4.0)

苦杏仁水 Aquæ amygdalæ amaræ 六量兩 (180.0) —M.

以布蘸藥敷患處、倘有忌用銾氯强盐者、於此方內亦可去之。 S.—Poison. For external use. Apply to the itching surface with a small rag.

藥製與分劑

淡氰藍酸 Acidum Hydrocyanicum Dilutum, 一至五量滴 (0.06-0.3)


毒力 服毒分劑立時殞命者、先微瘈瘲、死後面紫目瞪、齒齘、口出血沫、如所服之分劑、不至立時傾命、先覺呼吸甚難、心思不靈、心之舒縮遲緩、後即瘈瘲呼喊、瞳亦散大、知覺全無、嘔吐、遺尿遺精、遺糞、迨面色發紫全身癱瘓、則氣絕矣。

1 Pruritus vulvæ

氰藍酸 (ACIDUM HYDROCYANICUM)

此藥乃無色之流質、其氣易散、宜存於黑色瓶內、其塞必須嚴密、人微吸之、必至頭暈、若此氣不與空氣勻和、吸之立死、醫家只用淡氰藍酸、每百量滴、(6.6) 含此藥二量滴。(0.12)

第四十四圖



此圖表明禽獸中氰藍酸毒時、其呼吸如何、I 乃尋常之呼吸、II 乃甫受藥氣之呼吸、III 乃大受藥氣之呼吸、IV 呼吸停止、

體功效　毒藥類中、此藥爲最、蓋因其氣易散、於肺經被㖡甚速、其正感乃行於呼吸絡二部之中、因其㖡祛皆速、故服過分劑者、若能活至二十至三十分鐘、諒不至殞命、服毒分劑者、全身受毒、有癱瘓之狀、倘所服尤多、生命司所倐爾停止。

療效　若因腦系致患胃系痛[1]或嘔吐者[2]、此藥俱效、如胃經受惹[3]、飲食下咽、即覺疼痛者、此藥有效、腸系痛[4]亦效、患乾嗽症者[5]、頗效、其良方如左。

1 Gastralgia
2 Nervous vomiting
3 Irritable stomach
4 Enteralgia
5 Irritable cough

毒力　服過分劑者、泗膜先受其痲力、後則痛如火燒、越片時痛即不覺、唇與指尖或全身皮膚皆覺痲痛、形神倦怠、先則脈緩而微、後則速而難診、遍體生汗、或至暈仆、亦偶有嘔吐者、呼吸甚微、所吸之氣、謹保其不死而已、面白容戚、如不暈仆、至氣絕方無知覺、目之凸凹無常、盱白似珠、少有瘈瘲者、瞳或散大、或縮小、或如常而無定式、身之熱度甚減、心於舒時停止、或驟然而停、或漸次而停、亦無常例。

解毒法　中此毒者、宜躺卧於牀、令其首略低於足、可使生命司所、於延腦內多得血之養育、且宜以煖身之法煖之、如中毒甚重、不當令其嘔吐、恐嘔吐時心即停止也、且其胃已甚受阻、雖服吐劑、恐亦無效、即或嘔吐、其首不宜離牀、當以布接其所吐者、宜用胃抽器洗其胃經、若形勢甚危、宜先射伊打於皮內、後則射酒、再後射毛地黃、蓋伊打之效甚速、其效未過、酒效亦顯、酒效未過、毛地黃之效即至、毛地黃乃此藥體功效之敵藥也、倘絡部仍受其阻、可以阿刀便射之、以其有激司絡腦所之能也、如呼吸將止、宜用代引呼吸之法、倘心經將停、可略齅炆氰弱礬、或效然不宜多用、恐有阻心之患、亦可用士的年之足分劑、即一厘之二十分之一至十分之一、(0.003-0.006) 射於皮內、以激其呼吸絡二部。

久用之、不但無益、反致有損、患痚症、先有鼻涕者、初起時、服之有效、如因腦系失其功用、或心胴過長、致患心跳症[1]此藥有效、與毛地黃並用尤妙、因患此症者、心經少得腦系之功用、此藥能平心肌、兼阻毛地黃之激力太過也、其方如左。

草烏頭酒 ℞-Tincturæ Aconiti 二量錢 (8.0)
毛地黃酒 Tincturæ Digitalis 四十五量滴 (3.0)
顛茄酒 Tincturæ Belladonnæ 一量錢半 (6.0)
龍胆草雜酒 Tincturæ Gentian. Comp. 加至三量兩 (90.0) —M.
每六句鐘服一小勻、(4.0) S.—Teaspoonful every six hours.

藥製與分劑

草烏頭酒 Tincturæ Aconiti 一至五滴 (0.06-0.3 每句鐘、服一次、若每刻鐘服一滴之四分之一 (0.015) 或二分之一、(0.03) 較日服足分劑三次、尤妙。

草烏頭膏 (Extractum Aconiti) 一厘之四分之一、至四分之三、(0.015-0.045)

草烏頭流膏 Fluidextractum Aconiti, U. S. 一至二量滴 (0.06-0.12)

乖效 人服此藥、有皮作癢、或生癌、或生皰者。

1 Palpitation

呼吸部　此藥之中分劑、有畧平呼吸之能、作燒時、其能尤顯、如服毒分劑、則呼吸司所被癱。

身熱度　此藥有令人生汗、並血運略緩之功、故作燒時服之、可減熱度。

陳　此藥被陳甚速、祛之亦速、但於身內爲氣所變者居多、服足分劑、其感能約可存三句鐘之久、凡服之者、尿則必多。


療效　此藥乃醫家通重之藥、其效他藥皆不能及、且於身內所成之效、與體功效所言者、無不相符、其正感、乃平絡部與覺系末也、如因孕吐[1]、或某處炎症、以致腦系受惹、血壓加增、此藥有平腦系、並減血壓之能、若各類新炎症[2]、初發時、服之有效、系痛症[3]、如系與皮膚相近、可以此藥二厘 (0.12) 脂六十厘 (4.0) 研勻、製成抹膏、敷之有效、血旺之䶊症、此藥常效、白濁[4]、初患時、勤服小分劑、有效、如初程已過、亦可用之、以免莖舉硬痛[5]之患、因其有阻腦司所之能也、哮吼[6]、喉門棚炎[7]、喉痛[8]、傷風[9]、氣脘炎、受風之瘁[10]等症、初患時服之有效、受風之經閉症[11]、與熱茶同服、並令其坐於熱水盆內、其經或可復至、心統膜[12]炎症、服之有平心之效、亦有退燒之功、健壯之肺炎症[13]、初發時、血壓之力必大、此藥能減之、孩童之猛燒症[14]、此藥有平腦絡二部之功、惟各類虛弱症忌用、倘於各類熱症、常

1 Vomiting of pregnancy
2 Acute inflammations
3 Neuralgia
4 Gonorrhœa
5 Chordee
6 Croup
7 Quinsy
8 Sore throat
9 Colds
10 Asthma
11 Suppression of menstruation
12 Pericarditis
13 Sthenic pneumonia
14 Sthenic fevers of children

其力之大小、乃在鹻之多寡、近代之醫家云、另有二鹻含於其內、但人尚未得其確據耳。

體功效　此藥敷於舌上、必覺痳熱、漸至滿口皆然、以其先有惹覺系末之力、後有痳覺系末之能也、此藥之力、顯於身內甚速、祛之亦速。

第四十三圖



此圖表明草烏頭能使脈緩、其故有二、一激顱臟腑系司所如A、一阻心肌如B、因司絡腦所被阻、故血壓減少如c、呼吸司所亦被阻如d

腦系部　服足分劑者、覺知司所、與脊腦覺徑、均受其阻、然其正感、乃阻覺系之末、若敷於泗膜、該處必覺痳木、因其惹力過大、不可用爲眼科之痳藥、足分劑、無感脊腦動徑之能、毒分劑、則脊腦動徑、與其動系末俱被癱。

絡部　服中分劑者、惟絡部大受其感、脈即略緩、蓋因顱臟腑系之司所被激、亦因心肌受阻也、心肌既受其阻、故血壓略減、如用足分劑、脈尤緩而微、血壓更顯減少、乃因司絡腦所受阻也、服毒分劑、脈則甚緩、血壓甚微、漸次加重、心於舒時停止。

肰如痓症、與癎症不同、瘈瘲甫過、即成癱患。

絡部　服毒分劑者、其心之舒縮、必緩而微、終於縮時停止。

呼吸部　此藥能癱呼吸司所、令人殞命。

療效　此藥乃歸敷藥類、常製成抹膏、Unguentum Veratrinæ, 用之於肌痺[1]、痺節[2]、系痛[3]等症、又有韋拉抵印油膋、Oleatum Veratrinæ, U. S. 此油膋有毒力、用時宜加謹愼。

辣菜根 ARNICA, U. S. ARNICÆ RHIZOMA, B. P. 此藥係一類之草、產於歐洲美國等處、入藥者乃該草之花與根。

體功效　此藥敷於皮薄處、必覺發熱、並有惹力、重者色似漆咬、服之者、脉則略緩、血壓亦增、服毒分劑、則脉緩而微。

藥製與分劑

辣菜花酒 Tinctura Arnicæ, 十五至三十量滴、(0.1-2.0) 此藥少有用為服劑者、可服者惟此酒。

辣菜貼膏 (Emplastrum Arnicæ) 此膏有止痛之功、跌打等傷、敷此藥之酒有效。

草烏頭 ACONITUM, 此藥亦係草類、產於歐洲印度中華美國等處、入藥者乃該草之根、

1 Muscular rheumatism
2 Rheumatic joints
3 Neuralgia

藜蘆酒 Tinctura Veratri, U. S. 五至二十量滴、(0.3-1.3) 乃此藥製之最美者、

藜蘆流膏 Fluidextractum Veratri, U. S. 一至三量滴、(0.06-0.2)

健壯者、患各類新積血症、每半句鐘、或一句鐘、常服藜蘆流膏一量滴、(0.06) 過二句鐘、皮如濕而鬆、脉畧緩而平、或略有惡心、是此藥之效已顯、則當止服、如病勢沉重、多用一二劑亦可、倘服之者、藥效未顯、再服時、宜防其嘔吐、須於前一刻鐘、服鴉片酒五至十量滴、(0.3-0.6) 可免此患。

禁用之狀 凡虛弱症、並腹統膜炎、與胃炎等症、如有嘔吐者忌用。

毒力 此爲最毒之藥、然服毒分劑、少有殞命者、蓋因其毒未盡被吐、必有嘔吐以祛之也、令人嘔吐之故有二、一因非拉特丁、原有此力、二因內含一類之檷、有令人嘔吐之力、中毒者、宜用阿刀便類之激心藥、以敵之、並宜煖其身、令其頭略低於足、亦可用士的年、以激其呼吸絡二部也。

韋拉抵印 VERATRINA,

此藥乃阿撒憂草子之鹻、其質細粉、其色銀灰、齅之令人生嚏、過數句鐘方止。

體功效 此藥於顱腦少有感能、其正感乃行於脊腦與志肌之中、服過分劑、令人瘓瘫

癱、心即停止矣、其正感乃行於司絡腦所之中。○非拉特丁、較直分多有惹力、如服過分劑、則必嘔瀉、肌亦畧有抽搐與瘈瘲之患、然不似直分之甚。○藜蘆能阻心肌、並感顫臟腑系、故令脉緩、因其能阻心肌、並阻司絡腦所、故令血壓減少。

療效　藜蘆之正用、乃醫初燒症[1]、若久燒與身弱者禁用、凡肺炎[2]、胸統膜炎[3]、肝炎[4]、腹統膜炎[5]、腦炎[6]等症、如用之於初積血時、甚效、倘積血之時已過、則無益而有損、腦炎、腹統膜炎二症、多有嘔吐之患、如用之、宜加謹慎、因此藥畧能使人嘔吐也、患腹統膜炎者、其嘔吐之勢、多令統膜動宕、恐此藥更增其人之病也、故用草烏頭較妙、按藜蘆能令血脂鬆大、故凡有積血者服之、其效與放血同、若遇宜放血之症、用之亦可、產後熱症[7]多有醫者以之為妙劑、然宜謹慎用之、產瘈瘲[8]、多有以之為上品者、但須用足分劑、即藜蘆流膏二十至三十量滴、(1.3-2.0) 射於皮內、射後每二刻鐘、服五量滴、(0.3) 至脉如常為止、緣其有阻脊腦動徑之效也、但當謹慎用之、以免絡部過於受阻、健壯者、或患心胴過長[9]、或鬱心[10]等症、此藥有效、血囊症[11]、如血運不週、並血壓之力過大者、用之、尤宜謹慎、以防血囊崩裂之險。

藥製與分劑

1 Acute inflammation
2 Pneumonia
3 Pleurisy
4 Hepatitis
5 Peritonitis
6 Cerebritis
7 Puerperal fever
8 Puerperal eclampsia
9 Cardiac hypertrophy
10 Irritable heart
11 Aneurism

不顯、呼吸極微而短、呼吸之有無、他人不易知也、全身之水、幾至瀉盡、以致腓肌轉筋、熱度漸減、因而殞命、其形與患癨症者毫無差別、當癨症流行之時、若中此毒、倘不用化法、或顯微鏡、無能辨之者、如有所疑、當用以上之法試之、亦或有五臟變壞為脂者。

解毒法　中此毒者、當多服炭匿酸、如此酸不便、多飲濃茶亦可、並用胃抽器抽之、最要者、無論何故、不可使之起牀、頭亦不可離枕、當令其頭畧低於足、宜服毛地黃與酒之足分劑、並當煖其身、呼吸如不甚微、當射莫非於皮內、以止其痛、並平其胷道、形勢如甚危急、莫非禁用、若必須用之、當與士的年同射、蓋莫非有阻呼吸司所之力、士的年能敵之也。

藜蘆 VERATRUM, U. S.

此藥係一類之草、產於北亞美利加、入藥者、乃該草之根、味苦而辛、內含數鹻、最要者有二、一名直分、(Jervina) 一名非拉特丁、(Veratroidina) 本藥用於成人、以阻絡部、最為穩妙。

體功效　欲論本藥之體功效、宜先明二鹻之體功效、試以直分之毒分劑、用於獸類、肌則無力、行動甚緩、厥後肌畧抽搐、狀如癇症、隨即仆倒、流涎不止、越片時、即成癱瘓、至死方無知覺、以腸胃未受其惹、故不嘔瀉、絡部甚受其阻、故脉緩而微、後呼吸司所被

銻錑菓葡酒 Vinum Antimonii U. S. Vinum Antimoniale, B. P. 十五至三十量滴 (1.0-2.0) 乃常用之劑、二至四量錢、(8.0-16.0) 爲嘔吐之劑、每量兩 (30.0) 內含此藥二厘、(01.2)

銻錑菓雜丸 (Pilulæ Antimonii Compositæ) 一至三丸、有改症之功、每丸內有銻硫粉半厘、(0.03) 錸氯弱盐半厘、(0.03) 怪阿克一厘、(0.06)

銻錑菓抹膏 (Unguentum Antimonii Tartarati) 此抹膏有外惹內效之功、用時攤於布上貼之、

銻 散 Pulvis Antimonialis, B. P. 三至十厘、(0.2-0.6) 成丸服之、痺熱等症、可爲退熱之劑、內含鐵弱礬、錆硫强礬等藥。

海葱雜糖漿 Syrupus Scillæ Compositus, U. S. 二十至三十量滴、(1.3-2.0) 爲成人平絡之劑、三十至六十量滴、(2.0-4.0) 爲孩童嘔吐之劑、每量兩、(30.0) 內有此藥一厘之四分之一、(0.045)

毒力 服毒分劑者、脉畧緩而微、皮濕而鬆、全身無力、且惡心過甚、胃經不安、越片時即有極重之嘔吐、所吐者、初則食物、後則洄液、膽液、或血等物、當時必兼瀉腹、所瀉者先則腸內所積之物、後則洄液膽液、或血等物、此勢既過、或有忽然而過者 則所瀉者、形如米湯、凡中毒者、必有如此之瀉、至此面目青瘦、並生冷汗、脉速於梭、診之似無、血壓之力幾乎

療效　此藥之用不一、常用以平絡部、近世醫者、多以他藥代之、如强健之人、偶患炎症[1]、脉速而有力者、服之大效、身體虛弱者忌用、如防傷風[2]、服中分劑有效、健壯者氣管炎症[3]、此藥可以祛痰、用足分劑令其嘔吐、亦效、或服小分劑、即每句鐘服一釐之六十分之一、(0.001) 或以半釐、(0.03) 加於四量兩 (120.0) 水內、每句鐘服一小勺 (4.0) 亦可、此分劑、孩童用之最妙、且因其無味、亦不令其嘔吐也、孩童育道洄膜新炎[4]、而無重燒者、服此分劑、每立見效。按此藥爲緩而有力之吐藥、因其見效不速、故中他藥之毒者、不可用爲吐藥、如胃經受惹、或腎經有重症者、服之無益而有損、倘服足分劑、仍不嘔吐者、不可再服、免中其毒、當以他類吐藥代之、或用胃抽器抽之、中分劑之力、或不足令人嘔吐、此藥必存於胃中、致中其毒、若用之爲吐藥、宜用足分劑、如用爲外惹內效之藥、宜製成抹膏用之、敷於痼症尤妙、如敷於骨節久炎[5]、或癎症[6]之頸、皆效、此藥有發表之能、常有惡心瀉腹等乖效、故近日多以他藥代之。


藥製與分劑

銻鉀菓礬 Antimonii et Potassii Tartras, U. S. Antimonium Tartaratum, B. P. 一釐之二十分之一、至十分之一、(0.003-0.006) 爲平絡之劑、半至一釐、(0.03-0.06) 爲嘔吐之劑、

1 Sthenic inflammation
2 Colds
3 Sthenic bronchitis
4 Acute catarrh of alimentary tract
5 Chronic enlargement of joints
6 Epilepsy

爲時暑長、先則發紅、後成小皰、漸次成瘡、難於收口。

第四十二圖



此圖表明銻激嘔吐、司所如A、且惹胃中之系、亦令人嘔吐如B、

絡部　此藥之正感、乃行於絡部、小分劑、令脉漸緩、蓋因心肌被阻也、且令血壓減少、蓋因司絡腦系於血管內受阻也、或言司絡腦所亦同受阻、但無確據耳、服毒分劑者、絡與呼吸二部、甚受其阻、以至殞命、如速用毛地黃大效、因其有敵此藥之力也。

呼吸部　若不用毒分劑、於此部則無感能、如用之、則令人殞命、其故有三、一因呼吸司所於延腦中受阻、以致呼吸停止、二因心經虛弱、以致肺有積血、三因氣管洒膜受惹、致令生痰過多、吐之無力、以至殞命、與溺死者無異。

育道　此藥大有惹育道之力、足分劑、可爲緩而有力之吐劑、其能令人嘔吐者、乃因其感胃經、並延腦中之嘔吐司所、故此藥爲感腦系首末之吐藥也、但服之者、惡心過甚、過分劑、則有水瀉疞痛等患。

祛　此藥藉各液而祛、由大便而祛者居多。


第九章 論阻心藥類

銻 (ANTIMONY) 此係金類原質最難消化、故少入藥用、所常用者、乃銻鉀菓礬、Antimonii et Potassii Tartras. U.S. Antimonii Tartaratum B.P. 或純銻硫弱洽 Antimonium Nigrum Purificatum, B.P. 銻硫粉、Antimonium Sulphuratum, B.P. 銻弱養等類。Antimonii Oxidum, B.P.

銻鉀菓礬 ANTIMONII ET POTASSII TARTRAS, U. S. ANTIMONIUM TARTARATUM, B. P.

此藥乃以銻弱養與鉀輕菓礬、加水煮之而成結晶、遇空氣則成細粉、醇酒不能化、淡酒畧化、冷水能化、滾水尤能化、與酸鹼二類不符、故不可並用、若與炭匿酸相合、即成一難消化之藥、故炭匿酸、乃解此毒最效之藥也。

第四十一圖



此圖表明銻阻心肌如A、阻繖中之肌如B、或阻延腦中司絡腦所如C、亦阻呼吸司所如D、

體功效 此藥置於洒膜上、則該處覺熱、為時畧長、必顯有發炎之勢、如敷於皮薄處、則必受惹、

阿大那典 Adonidina 一厘之八分之一、至四分之一、(0.008-0.015)日服三次、

阿大那冲藥 (Infusum Adonidinæ) 半量兩、(16.0)乃此草四至八分、加水一百八十分泡成、日服三次。

顫癱[1]症、用金雀印一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.03) 日服三次有效、心症[2]之㾝腫、用金雀花梢半英兩、(15.0) 加水十六量兩、(480.0) 煎成八兩、(240.0) 每三句鐘服一量兩、(30.0) 乃爲妙劑。

藥製與分劑

金雀花汁 Succus Scoparii B. P. 二十量滴、(1.3)

金雀花冲藥 Infusum Scoparii B. P. 一至二量錢、(4.0-8.0)

毒力　中此毒者、失和動之功、四肢發顫、且有抽搐或痿癡者、後則腦系部受阻、以致全身疲憊。

阿大那 (ADONIS VERNALIS.)

此藥係一類之草、產於歐亞二洲、內含一葡糖鬱類、名阿大那典。

阿大那典 (ADONIDINA)

惟此可入藥用、其功用乃醫各類心虛[3]症、如因心症[4]之㾝腫、此藥爲合宜之品、然其力不敵毛地黃與加非印、如用毛地黃加非印而無效者、用此或可見效、近數年有與鉥𣱵鹽並用、以醫癇[5]症者、自謂有效。

藥製與分劑

1 Paralysis agitans
2 Cardiac dropsy
3 Cardiac weakness
4 Cardiac dropsy
5 Epilepsy

三次、有醫者云、每日宜服一次、免有積效之患。

金雀花 SCOPARIUS, U. S. SCOPARII CACUMINA, B. P.

此花產於英美中等國、入藥者乃其嫩枝、內含二鹼、一名俗革仁、一名金雀印、惟金雀印入藥用。

體功效　此藥之功效、多在金雀印、故此藥之體功效、亦金雀印之體功效也。

腦系部　用過分劑、顱腦與脊腦必甚受阻、其感能多行於動徑之中、因此感應之能與動能、必皆減少、久則必癱、中此毒之形勢、人畜相同、其心必皆於縮時停止。

絡部　此藥有激絡部之能、服中分劑者、血壓與脉力俱增、⿰血賣之縮力尤大、用過分劑、此部必受其阻。

呼吸部　中分劑、無感此部之能、毒分劑、則呼吸司所被癱、以致殞命。

療效　有醫者云、凡毛地黃所能醫之心症、金雀印亦能醫之、然亦有心症用毛地黃無效、用金雀印或有效者、用過此藥之人、謂脉亂行[1]與心跳[2]等症、有效、猶有醫者謂於突睛症[3]並各類血運不過之症、有效、多有醫者謂此藥爲無甚緊要之品、不屑用之、然用其同類者無效、仍當試用此藥耳、因金雀印之力不同、故有只用一厘之二十分之一 (0.003) 者、亦有用二至四厘 (0.1-025) 者、如初用時、小分劑無效、漸次加增可也、有醫者謂、

1 Arrhythmia
2 Palpitation
3 Exophthalmos

藥製與分劑

加非印 Caffeina 二至五厘、(0.12-0.3)

加非印檸礬 Caffeina Citrata, U. S. Caffeinæ Citras, B. P. 二至五厘、(0.12-0.3)

沸加非印檸礬 Caffeina Citrata Effervescens, U. S. Caffeinæ Citras Effervescens, B. P. 六十厘、(4.0)

乖效 患心症者服之、或有不寐之患、重則當止而勿服、不然或致酒狂之狀、服過分劑者、因腎內血管抽搐、尿或減少、曾親見一人日服三次、每次二厘、(0.12)竟有作燒之患實可奇也、久用加非者、或有不寐、微顫、心跳、耳鳴、胃系痛、面黃肌瘦等患、但罕有之。

洋鈴蘭 CONVALLARIA, U. S. 此乃一類之花、產於美俄中等國、入藥者係該花之根、與毛地黃同為補心之劑、但其力不敵毛地黃、而其功效或大於毛地黃、脈亂行症[1]此藥有效、但使脈緩之力無多。

藥製與分劑

洋鈴蘭流膏 Fluidextractum Convallariæ, U. S. 四至八量滴、(0.25-0.5)日服三次、

洋鈴蘭酒 (Tinctura Convallariæ) 五至二十量滴、(0.3-1.3)

洋鈴蘭精 (Convallamarina) 此精係葡糖礬類、每服半厘、(0-03)日服

1Arrhythmia

定理、因其有感呼吸之能、故中鴉片毒[1]者、服之大效、或服濃加非、或射於肛內亦可、其輔效有二、一令人警醒、二增身熱度、哮症[2]將發時、服濃加非一盃、或能醫之、過用腦力之頭痛[3]、與安替派林鋏氫盐並用、大效、有時用經烤之加非豆、以作引藥、若免腐避臭之藥、不便、可用經烤之加非末代之、按此藥不可用爲射藥、因入水改其體質也、如必射之、可用左方。

鈉柳磬	℞-Sodii salicyl.	三十分
加非印	Caffeinæ	四十分
烝水	Aquæ destillat.	六十分

又方

鈉安息香磬	℞-Sodii benzoat.	四十五英釐	(3.0)
加非印	Caffeinæ	三十英釐	(2.0)
烝水	Aquæ destillat.	七十五量滴	(5.0)


用時以火熱之、每次射十量滴、(0.6)

1 Opium poisoning
2 Asthma
3 Headache

宜切記。

絡部　此藥有增血壓之能、故昔人謂其有感心之力、今經多人察明、言其只能感腦、由腦感心耳。

第四十圖



此圖表明加非印使腎球之血脘舒鬆如A、且激腎微脘之司祛膚如B、

呼吸部　此藥大有感呼吸司所之能。

腎經　此藥能使腎微脘舒鬆、故有利小便之功、其效易顯於腎球、並感於腎司祛膚、故尿中所含之尿腥基、與水類較多。

胭廢　此藥有阻胭廢之力。

祛　此藥於身內被氫改變體質。

療效　此藥不但為感心補心之上品、且有感腎之能、無論心痰腫[1]、或腎痰腫症[2]、服之大效、故有舍毛地黃、而專用此藥者也、腎新炎症忌用、蓋新炎處不可用感之之藥、此為

1 Cardiac dropsy
2 Renal dropsy

蹟過於受感、心盌之血不盡入蹟之故、服毛地黃如顯乖效者、此藥大效、因心病而患瘀症者有效、因大有感心之能、少有感腎之力也。

藥製與分劑

康昇箭毒酒 Tinctura Strophanthi, 五至十五量滴、(0.30-1.0) 日服三次

康昇箭毒膏 Extractum Strophanthi, B. P. 一厘之四分之一、(0.015)

康昇箭毒精 Strophanthinum, U. S. 一厘之一百五十分之一、至五十分之一、(0.0004-0.0012) 射於皮內、其效可存七日之久、究無定評。

乖效　此藥之足分劑、或令人瀉腹。

加非印 CAFFEINA, 此藥係加非豆所含之鹻、並含一類之油、斯油無體功效、不易消化、飲之者或有食滯之患、如不在飯時、其患尤甚、人所常飲者乃加非、入藥者即加非印、與加非印檸礬、Caffeina Citrata, U. S. Caffeinae Citras. B. P. 更有沸加非印檸礬。Caffeina Citrata Effervescens, U. S. Caffeina Citras Effervescens. B. P.

體功效　腦系部　此藥之正感、行於顱腦脊腦之中甚速、惟其感於顱腦、故助人心思之敏、惟其感於脊腦、故增人感應之能、是以人謂多用加非、易成悸患、按加非只有感腦之力、毫無育腦之能、常以加非感腦者、必致減食、其人之腦卒致失其功用、醫者最

數日而殞命者、亦有不足二句鐘而殞命者。

解毒法　中此毒者、宜服炭醕酸、因其爲化學中之敵藥、亦當服草烏頭、因其乃體功效之敵藥、如此毒未嗽、宜服吐劑、並用胃抽器抽之、如心經受毒已甚、吐劑有險、宜以煖身之法煖之、最要者、乃煖其腹、此毒祛後、宜躺臥數日、曾有人以爲無患、如常起坐、倏爾殞命。

康畀箭毒 STROPHANTHUS, U. S. STROPHANTHI SEMINA, B. P.

此藥乃亞非利加一類生蔓之樹、入藥者即此樹之子、苗人塗此子於箭鏃、用以射獵、故名箭毒、內含一精、名康畀箭毒精、昔人論此藥有痳效、今已查明、此效只顯於禽獸。

體功效　此藥之正感、乃行於心肌與心結、於顱臟腑系毫無感能、不似毛地黃令人脉緩、血壓加增、按此藥不感司絡腦所、乃感心肌而增其力、故其正用、乃醫心經虛弱、致脉脂抽搐之症、因其增血壓之力無多也。

療效　此藥於各類心症、可代毛地黃之用、但其力較小、十二歲以下之孩童、服之常效、此等孩童、若服毛地黃、易見乖效、雖胃經不甚受惹、然腦系被激、易於動怒、且有氣促皮紫等患、血壓大而心虛弱者、服之較毛地黃尤妙、蓋其無增血壓之力也、成人因心

顯。

禁用之狀　血脂變壞至甚、或血囊、中瘋等症、服之甚爲有險、因其有加增血壓之力也、心肌變脂、其未變之肌絲雖受其感、但此藥有加血壓之力、心之功用亦必加增、以致過用其力、愈爲衰弱、此爲禁用之狀耳。

乖效　此藥能惹胃經、令人嘔吐、與消化之功有妨、孩童服之、脉易不穩、用足分劑時、宜常躺卧、不可驟然而起、免致暈仆、便溺亦不可起牀、曾有起牀便溺者、倏爾暈仆、以致殞命、此藥祛之甚遲、服之或遇積效者、其人忽有中毒之形狀、即如患痳腫者、服之日久、若與之放痳、則易成積效之患、醫者云、未放痳之先、此藥不全被嗽、尚有存於身內者、及放痳後、腹中之血脂不被痳壓、藥力忽然被嗽、其人受感太過、以至如此、患熱症者、服此藥至燒退時、或亦有遇此患者、常服足分劑者、不俟其祛盡、即又服之、則必遇此患、總之有積效之前、其人之尿必較常減少、若遇如此景況、宜止而不服、或少服之。

毒力　服毒分劑者、其脉先緩而有力、後則不勻而雙涙、又後甚速如梭、試聽其心之跳動、甚爲有力、躺卧時、脉或緩而有力、坐起時、則驟然不勻、過時不久、多有嘔吐之患、亦有突睛之形、其肝各見藍色、然靈性知覺、至氣絕方止、且每令人有甚重之額痛、或有

酒並用有效、按此藥之功效最緩、而藥力之存時最長、故初服之而見效者、後每日只服一二次即可。

藥製與分劑

毛地黃酒 Tinctura Digitalis, 五至三十量滴、(0.3-2.0)

毛地黃冲藥 Infusum Digitalis, 六十量滴至半量兩、(4.0-15.0)

毛地黃流膏 Fluidextractum Digitalis, U. S. 一至四量滴、(0.06-0.25)

毛地黃膏 Extractum Digitalis, U. S. 一厘之四分之一、(0.015)

毛地黃葉 Digitalis Folia, B. P. 一至四厘、(0.06-0.25) 常製丸用之、

毛地黃蘸、有易化於水者、有易化於酒者、因其效不同、故其製亦不同、心虛弱症、毛地黃酒、或流膏最妙、利小便者、乃毛地黃冲藥、此冲藥、較毛地黃酒與流膏、多有惹胃之患、如人不能服之、可將其蘸名狄吉塔雷印者、射於皮內有效、若射以他類之蘸、則改其質、而無效矣、或將此藥之葉、盛於布袋中、浸於滾水內、製成糊藥、敷於腰際、則有激心之效、然宜謹慎用之、蓋此藥被竦、遲速無從預知、恐有中毒之患也、此藥常用於緊要之症、故醫家須用藥局中已試驗者、有病者久用無效、及改用已試驗者、其功效立

藥者、速而不穩之脉變成緩脉、故絡部受其阻、然論此藥之功用、實有感絡部之能、而令速而不穩之脉變爲緩脉者、非因力微、乃因力增也、按此藥之體功效、必有阻心之能、究其所以阻心者、乃因人已中毒耳、凡血運不過之心症[1]、此藥有效、若心胴過長、無論因何而致者、其心若能運血如常、此藥不但無益、反至有損、總脉門扇血廻流之患、此藥不爲甚妙、因其能使心舒之時較長、致血多廻流𧖴中故也、若已日久、致兩扇門俱有血廻流之患、則大有功效、然每有兩扇門有血廻流、服此藥無益而有損者、蓋𧖴受感過甚、縮力大而且長、雖多有血入總脉脘、亦必多有血廻流入盌、故盌有餝脹之勢、但未服藥之前、此患則無從知之、鬱心症[2]而心跳[3]者、非因飲食不化、此藥大效、心鬆大症[4]亦效、肺炎症之中程[5]、而心運血之力不足者、亦大有效、重熱症[6]、用小分劑補心、亦可、若此症有肺經積血[7]之患、亦有催血之能、如熱度過大、則無甚功效、凡因腦力脫失[8]、或受傷[9]中毒[10]、腦力猝衰[11]、而致心虛弱症、用之俱效、中草烏頭之毒[12]者、此藥乃其體功效之敵藥、如病勢甚險、務當先服錏沘消水與伯蘭地、因此藥不能立見功效也、中菌類之毒[13]者、此藥乃其敵藥、亦爲利小便之劑、若心運血之力不足、以致血積腎經[14]、大有功效、如腎兼有他症、不可專用此藥、當與海葱、或加非印同服、方可、腎久炎症[15]、與杜松雜

1 Cardiac weakness
2 Irritable heart
3 Palpitation
4 Cardiac dilatation
5 Second stage of pneumonia
6 Exhausting fevers
7 Congestion of the lungs
8 Collapse
9 Injury
10 Poisoning
11 Shock
12 Aconite poisoning
13 Muscarine poisoning
14 Congestion of kidneys
15 Chronic kidney disease

肌放鬆、或謂心跳動甚速、諒必顱臟腑系受阻也、如將其人驟然扶起、當時或即殞命、蓋心之縮力已盡、若驟然而起、心多因之停止矣。

呼吸部　尋常之分劑、與此部無效、過分劑則阻之。


身熱度　尋常之分劑、與熱度無關、用過分劑、則熱度減少、患熱症者服之、則熱度畧減、然少有用之爲退熱劑者、人作燒時、此藥不能使脉緩如常、因作燒時、顱臟腑系之司所於延腦中受阻、或顱臟腑系之末兼受其阻、此藥故無感之之能耳、此係療效中最要之理也。

腎經　此藥於腎經無甚感能、心症之瘀腫、服之有利小便之功、非因其有感腎之能、乃因絡部受阻、血壓加增、將腎內所積之血催出、則腎經之功用復原矣、若服過分劑、有時因腎經血脂抽搐、致有尿閉之患、此患之後、常有積效之虞、醫者當切記之。

祛　此藥由何經而祛、人不得而知、化學家於服者之尿中、亦未能得其確據、諒於身內改其體質耳。

療效　此藥有感絡部之能、亦有謂其有阻絡部之能者、惜乎所論有未盡耳、所謂有感能者、以服此藥血壓加增、心力之舒縮較大、故絡部受其感、所謂有阻能者、因視服此

第三十九圖



此圖表明毛地黃激絡部之功、

I 係未用毛地黃之先、血壓之至數爲八十六、

II 係已用毛地黃之後、血壓之至數爲一百五十、

III 係用毛地黃、血壓之至數爲一百六十四、

VI 係仍用毛地黃、血壓之至數爲二百一十、


II III 脉浪較常爲大、IV 因用藥太過、雖血壓加增、而脉浪較小、

然者、昔者有人謂此藥不但有感心之能、且有補心之力、如實有感司育系之效、是有雙功矣、服過分劑者、心之跳動不勻、脉顯雙浪、夫不勻者、人尚不知其所以然、然實非因心之縮力不足也、蓋心縮時、其力過於尋常、諒必因心肌和動之功受擾亂之故耳、亦有心之跳動甚速者、但無論其心之跳動不勻、或甚速、而血壓必微、其故有二、一因心經失其功用、二因司絡腦所受阻、故血管之

者較野外自生者力小、英德二國所產者、較美國者力大、用者當於著名藥行、購其曾經試驗者方妥。

體功效　如胃洄膜畧受惹者、此藥不宜服、以其有加增此患之力也、若病勢甚危、胃經雖畧受惹、亦不得不服。

第三十八圖



此圖表明毛地黃激心經如A、激顱臟腑系之司所如B、激顱臟腑系之末如C、激司絡腦所如D、激血脂之肌如E、

腦部　此藥若不用過分劑、於此部無感能。

絡部　此藥之正感、乃行於絡部、若用中分劑、則脈與血壓之力必增、且使脈緩而脈浪加大、其脈力加增者、乃因心結與心肌受感也、血壓加增者、乃因脈力與脈浪加增、並因司絡腦所與血脂之肌受感、脈脂縮小也、脈緩者、乃因顱臟腑系之首末受感也、脈浪加大者、乃因顱臟腑系受感也、此系受感時、心舒而大、舒時亦長、心續血滿、故縮時脈浪較常為大、其顱臟腑系、果為心之司育系否、醫家固未敢定、然於形迹觀之、多有以為

受此二毒者、靈性無甚差別、惟有一法、乃查其尿含鴉片與否則知其所中爲何毒矣。

受酒毒與中瘋者之別、列表如左。

	中酒毒者	中瘋者
一	脉速而易壓	脉多半緩而有力
二	皮潮而鬆	皮熱而乾
三	身之熱度減少	身之熱度加增
四	二瞳多半散大而大小相同	二瞳大小不同
五	無偏癱之狀	有偏癱之狀
六	睡不甚鼾氣不偏出	睡甚鼾而氣偏出
七	面無癱處	面有癱處
八	知覺未必全無	知覺全無

聞人口內有酒氣、不可即謂之非中瘋、或因飲酒令其顱腦中之血脂崩裂、亦致中瘋也。

毛地黃 DIGITALIS, U. S. DIGITALIS FOLIA, B. P. 此藥乃一類草葉、產於歐州美國等處、必經年者方入藥用、內含數甁、若分而用之、俱與本藥之效不同、用時必選有效者、蓋此藥之力不等、自種

人飲酒至成癮時、肺經最易發炎、乃因心之右續不能如常運血也、醫者宜切記之。

毒力　中酒毒者、若靈性無知、肌肉無力、絡與呼吸部漸次微弱、當以毛地黃與土的年、射於皮內、並用煖身之法煖之、若身生冷汗、再服顛茄、以激其司絡腦所、有效、若腦顯病狀、可用外惹內效之藥、敷於頸上、俟其酒毒略散、再用錏醋礬消水與辣類、激其胃經、蓋令其思食也、如胃經有發炎之勢、此二藥忌用、服平胃之藥方可、如醉者嘔吐不止、當食冰塊、或服草烏頭寇卡印之微分劑、與衣必格等藥、並以外惹內效之藥敷於腹上、大便稍覺滯塞者、當服渣笠散四十厘、(2.6) 或伊拉替印一厘之八分之一 (0.008) 以瀉之、如欲輕瀉、先服錸綠弱鹽足分劑、後服鎂硫強礬、若早晨嘔吐、服錸砒礬消水每效。

中酒與受鴉片之毒者、不易分辨、特將不同之狀列表於左。

	中酒毒者	中鴉片毒者
一	瞳散大或如常	瞳縮小
二	呼吸與尋常所差無多脉先速後微	呼吸緩而有力脉亦然
三	面或發白	面癱而紫
四	皮涼或發汗	皮較煖
五	脉速先有力而後微	脉緩而有力至死方微

飲酒者若胃經無消化之力、良方如左、

辣椒脂稨	R-Oleoresin. Capsici	十量滴	(0.60)
丁香油	Olei Caryophylli	十量滴	(0.60)
銾綠弱盐	Hydrargyri chloridi Mit Hydrargyri Subchloridi	二十英厘	(1.20)
阿羅	Aloes	四十英厘	(2.60)

共成二十丸、每飯後服一丸。

若不令其瀉腹、當加鎂硫强礬少許。

酒痼症、與癱凝症、有時不易分別、特將其不同之狀列表如左。

	酒痼症	癱凝症
一	昏譫之時不長	昏譫之時較長
二	昏譫之狀無定	昏譫時必有高傲之狀
三	所見之像必甚兇惡	所見之像皆係快心之事
四	頭臂發顫	他處亦有發顫者
五	飲酒即無顫患	飲酒顫患尤甚
六	飲酒昏譫暫愈或見輕	飲酒昏譫尤甚
七	顫患多在早晨	顫患無定時

其效尤妙、但宜加冷水或熱水、服之方可、若病者胃經失其功用、服乳汁葡酒、最爲合宜、以其易於消化也、自沸葡酒、必不含糖質者、乃可用、腎久炎症、荷蘭酒可服之、癆症或熱症後之無力者、畀兒酒可服、乳婦服之亦可。

禁用之狀　凡腦受激症、非因用力太過者、忌用、各類之新炎症亦忌用、酒癮已斷、或酒癮未斷、以及中瘋、腦衣炎、腎新炎、血囊、脉變壞至甚者、皆忌用。

中癮　中酒癮者、身內必有損傷、蓋酒自胃先至於肝、與匯孟血相聯、故肝受其毒、因而變硬、胃則大受其阻、身則少得養育、心才亦常覺昏迷、或令系炎致成癱瘓者、亦有與失和動相似者。

戒法　戒癮之法有二、一令其居於密室、立時斷之、二令其居於密室、遞減其飲、漸次斷之、此法較妙、總之不容病者設法得酒、亦不容其與人來往、並使妥實之人服役之、如此設法、似甚完全、然猶宜日查其室內一切器用、以防其竊飲、倘防守稍疎、必歸徒勞、戒後身體必覺無力、當食肉湯或他類易消化之物、並當食辣物、激發胃經、如身甚虛弱、可服莫非、或寇卡印少許、但不可常用、恐其中癮、酥酪乃養人之物、戒癮者食之最宜。

强葡酒 (Vinum Portense) 又名破透酒、其製法與葡酒同、作成後內加醇酒、以增其力。

庫厘酒 Vinum Xericum, B. P. 每百分內含醇酒三十分、亦係葡酒類。

畀兒酒 (Beer) 乃以大麥綫釀成糟、後取其汁而成酒、但不用烝法、每百分內含醇酒四至六分。

破特酒 (Porter) 與畀兒酒同類、但製時將大麥烤糊、故較畀兒酒色深。

伯蘭地雜酒 Mistura Spiritus Vini Gallici, B. P. 製法乃以卵黃二枚、加白糖半兩、(16.0) 調和後、再加伯蘭地、與洋桂水各四量兩、(120-0) 即成、服之有養育之功。

服法 伯蘭地或穀烝酒、多爲激絡部之用、用時當審其病狀、譬如暈仆者、必須立使見瘉、宜以熱酒加水少許服之、則被嚥甚速、如欲其效尤速、當射於皮內、若欲激發胃經、以助其身力、宜與飯同用、並多以水、或用乳酒、(即酒與乳合成者) 或卵乳酒和之、但卵乳酒消化較難、成人之腸熱症、每三四句鐘、可服伯蘭地或穀烝酒半至二量兩、(15.0-60.0) 若孩童之分劑、一月者、服五至十量滴、(0.3-0.6) 二月者、十至二十量滴、(0.6-1.3) 三月者、二十至三十量滴、(1.3-2.0) 四月以外者、六十量滴、(4.0) 有時每二句鐘、以此分劑減半服之、

以酒擦病者之身、大有增力之效、常患病者、以穀烝酒加鹽、用之擦身、乃激皮膚之法。

藥製

穀烝酒 Spiritus Frumenti, U. S. 由黑麥釀成者、方入藥用、然必存貯四年以外者方可。

伯蘭地 Spiritus Vini Gallici, 乃以葡酒烝之而成、必存貯三年以外者、方入藥用。

紅葡酒 Vinum Rubrum, U. S. 乃以帶皮之葡萄、取汁釀之而成、但不用烝法。

白葡酒 Vinum Album, U. S. 乃以去皮之葡萄取汁釀之而成、亦不用烝法。

淡醇酒 Alcohol Dilutum, U. S. 乃以醇酒一分、烝水一分、相合而成。

醇酒 Alco hol Spiritus Rectificatus, B. P. 每百分內含水五分、英揀藥册內含水十分。

濃醇酒 Alcohol Absolutum, 每百分內含水一分。

蔗酒 (Rum) 乃以糖漿釀之、用烝法而成、每百分內含醇酒四十至五十分。

荷蘭酒 (Gin) 乃以大麥或黑麥、並杜松子、洋葎草、釀後烝之而成、有利小便之功、腎新炎者忌用、若常飲此酒、易患肝變硬症。

杜松雜酒 Spiritus Juniperi Compositus, U. S. 其功效與荷蘭酒同。

皆在酒之多寡、故少飲酒者、有助消化之功、以其能激胃而使之多生化腥糏也、若多飲者、其消化之功反受其阻。

祛 酒在胃內被㗖甚易、祛或變質亦易、若用之合宜、皆成爲身內當用之物、倘用之過度、乃藉肺皮腎腸而祛。

療效 酒之大用、一或因受傷或受毒等故、而心將停止者[1]、用以激心、其效甚速、一低熱症[2]、並一切勞力之久症、與熱症後身體無力者、或肺葉炎[3]與肺細葉炎[4]等症、用之俱效、如因暈仆[5]、蛇咬[6]、或受傷而腦力猝衰[7]、肺瘤炎[8]之晚程、年遠之膿瘡[9]等、用之皆效、若絡部受激、則不宜用、然絡部受阻時、則可用之、孩童肺炎症、其效尤妙、每二句鐘、以伯蘭地、或穀烝酒、五至六十滴、(0.3-4.0) 滴於乳或水內服之、如瘟熱[10]、腸熱[11]二症、病人甚爲虛弱者、酒乃正用、患此症每以酒爲激發胃經、輔助身力之用、然決不可視爲常規、總當審明可用與否、如脉速而微、或全身無力、或不思飲食、則當用之、否則不可用、甚重之腸熱症、若服尋常之伯蘭地、或穀烝酒、而胃經受惹、則服陳伯蘭地、或葡酒、可免此患、有時人嘔吐不止[12]、將伯蘭地少許、滴於碎冰塊上、服之有效、按酒非但爲內服之藥、亦可外敷、受跌打等傷者[13]、以酒擦之、可去患處之燒、且能免腐、骨節炎[14]、以布浸酒裹之、有效、

1 Cardiac failure
2 Low fevers
3 Croupous pneumonia
4 Catarrhal pneumonia
5 Fainting
6 Snake bite
7 Traumatic shock
8 Chronic pneumonia
9 Excessive wasting
10 Typhus fever
11 Typhoid fever
12 Persistent vomiting
13 Bruises
14 Inflamed joints

中之伯蘭地酒、或穀烝酒、乃醫家所常用。

體功效　腦部　此酒之力、能激司動系、若服足分劑、此部不但受阻、恐有暫癱者、若滴於腦系之末、先有激力、後則被癱、飲之者、心思敏捷、然與其才能之淺深、毫無加增、且有阻滯、按酒有加增感應之能、若服過分劑、則失和動之功、蓋因知覺受阻、則捫覺不靈、故醉者行動蹣跚。

絡部　飲酒者心經受激、脉必速而有力、血壓亦增、此其故、少因司絡腦所受激、多因心經受激也、飲之過甚者、絡部與腦部、先則受激、後則被癱。

呼吸部　小分劑則激之、大分劑則阻之。

身熱度　此藥無增身熱之能、然飲之覺煖者、非因熱度加增、乃因身內熱血被催運至四肢也、若多飲之、熱度反減、其故有二、一因熱血催入四肢、身體反失其熱、二因人身之熱、先激後阻、被激時、身胴虛耗、被阻時、生命司所亦受其阻、以致熱度漸減、曾有人查考飲酒者之熱度、謂飲酒時、身內生熱雖多、而祛散甚速、且其所散者、較多於所生者。

胃經　若將食物與胃化脭糐、同置於玻璃試筩內、加之以酒、其消化之功、或遲或止、

常用之、恐失胃經之功用、有醫者云、流血過多、與肺炎等症、若用錏沘消水、射入腿盂內、可免心血凝塊[1]之患、如射入皮內、其處必至生瘡、射於臂盂內、恐藥力至心過速、而受其阻、如欲使皮成飽、以錏沘濃消水、滴數滴於皮上、後以表鍋覆之、即能生飽、蝎蜂等螫傷[2]、此消水最效、若以錏沘消水、加於擦藥類內、用以止痛、其效尤妙、若因食滯釀爲酸類、致患胃酸症[3]、服此藥最有神效、胃已受惹者忌服、最宜常服者、乃錏沘香浮酒。

藥製與分劑

錏沘强消水 Aqua Ammoniæ Fortior. U. S. Liquor Ammoniæ Fortis, B. P. 每百分內、有錏沘氣二十八分。

錏沘消水 Aqua Ammoniæ, U. S. Liquor Ammoniæ, B. P. 每百分內、有錏沘氣十分。

錏沘浮酒 Spiritus Ammoniæ, U. S. 三十至六十量滴、(2.0-4.0) 以水送下。

錏沘香浮酒 Spiritus Ammoniæ Aromaticus, 三十至六十量滴、(2.0-4.0) 以水送下。

此酒以錏碳强礬、肉蔻油、檸檬油、拉芬大油、和醇酒與錏沘消水製成。

錏沘臭浮酒 Spiritus Ammoniæ Foetidus, 內有阿魏、其用與錏沘香酒浮同。

錏沘擦藥 Linimentum Ammoniæ, 扭傷敷之有效。

醇酒 又名燒酒 ALCOHOL

此酒係流質、以糖精類、用火釀之而成。泰西入藥用者即此酒、惟其

1 Heart-clot
2 Spots stung by insects
3 Gastric acidity

第八章　論激心藥類


錏沘 (AMMONIA) 此藥乃係氣類、其味甚辣、能使齅之者、氣管發炎、緊口抽搐、以至殞命、故純者不入藥用。

體功效　此氣最有惹力、肌受其惹、初見紅色、久則成疕。

腦部　試以此藥射於禽獸血管內、立即瘓瘲、蓋因脊腦受惹也。

絡部　此藥能激絡部、可使脉速而有力。

第三十七圖



此圖表明錏沘能激速系如A、且激心經如B、故使脉最速而有力、且能激司絡腦所如C、並激呼吸司所如D、

呼吸部　此藥亦能激呼吸部。

療效　此藥之用有四、一激絡部、二激呼吸部、三外惹內效、四改酸、如因蛇咬[1]暈仆、或驚懼、或受傷或食物不化等故、以致心經虛弱症、用他藥不及者、可用此藥、肺炎症、或他類之熱症、偶有心將停止之勢者[2]、此藥頗可用之、有著名醫者云、薰哥羅芳、心經停止者、以錏沘消水、射於盂內、可使復原、因其藥力易散、有痼症者忌用、若

1 Snake poisoning
2 Cardiac failure

之力也、瘍[1]疽[2]等症、若疼痛過甚、可研其葉成末、撒於敷藥上、敷之有效、醫者切記此草之力不同、故初用此藥時、當以小分劑、如不見效、漸次加增可也。

藥製與分劑

哥念膏 (Extractum Conii) 半至一厘、(0.03-0.06)

哥念流膏 Fluidextractum Conii, U. S. 二至六量滴、(0.1-0.4)

哥念酒 Tinctura Conii, B. P. 半至一量錢、(2.0-4.0)

哥念印 (Conina) 此係哥念之蝷、乃爲流質、不宜用之。

哥念汁 Succus Conii, B. P. 一至二量錢、(4.0-8.0)

哥念氣 (Vapor Conii) 此以哥念汁半量兩、(16.0) 𨦇𣲘消水一量錢、(4.0) 蒸水一量兩、(30.0) 製成、以二十量滴、(1.3) 加熱水、置於噴霧具內噴之、能醫乾嗽、抽搐之痒等症。

哥念抹膏 Unguentum Conii, B. P. 此膏之常用、乃醫肛門作癢之患、

毒力 此藥之毒與黃茉莉同、解法亦同。

1 Ulcers
2 Cancers


解毒之法　先用吐藥或用胃抽器後用鏭紕消水毛地黃等藥以激其心經再用士的年、阿刀便等藥以激其呼吸庶可救之。

哥念 CONIUM, U. S. CONII FOLIA, B. P.　此藥乃一類之草產於英美二國入藥者乃該草之葉與果內含一鹼名哥念印。

體功效　服足分劑者其肌無力其體疲倦服過分劑則頭覺懸暈步履不穩目視迷離血運不勻。

腦部　此藥能阻動系幹服過分劑覺系幹亦必受阻其感脊腦不甚顯然乃緩緩阻之無感大腦之能服毒分劑者臨死時其靈性猶有知覺。

第三十六圖



此圖表明哥念阻動系幹如A、

絡部　此藥有阻絡部之能。

呼吸部　此藥有癱呼吸肌系之力故能阻此部。

療效　此藥在揀藥册中非緊要之品如因系幹被惹致患瘈瘲者服之有效若因腦或脊腦被惹所致忌用因其無平腦之力只有阻顱腦傳於系幹

a Irritation of nerve trunk

目 此藥能癱動眼系之末、故置於目內、瞳必散大。

療效 凡因腦系過於受勞、或過用目力、致患偏頭痛[1]者、此藥有效、若與印度麻同服、其效尤顯、或言此藥能醫瘧症、人多不以為然、某著名醫者、謂此藥於肺炎[2]、肺統膜炎[3]等症、大效、但當於初患時用之方可、若哮[4]乾嗽[5]啼嗽[6]喉口抽[7]等症、與歪頸[8]、經痛[9]等一處之抽搐、皆效、惟身體軟弱者忌用、或謂用黃茉莉印散瞳、其力與阿刀便同、但於目內、較阿刀便之力易祛耳、用法將此印八厘 (0.5) 以水一量兩 (30.0) 化之、滴於目內、初一句鐘、每刻滴一滴、至二三句鐘、每兩刻滴一滴、必有功效。

藥製與分劑

黃茉莉流膏 Fluidextractum Gelsemii, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.30)

黃茉莉酒 Tinctura Gelsemii, 五至十五量滴、(0.30-1.0)

黃茉莉印 (Gelsemina) 一厘之六十分之一、(0.001)

毒力 服毒分劑者、其必顯之形狀、先則身倦、思臥、肌肉無力、上瞼下垂、頷骨下墜、脉漸速而微、身生冷汗、面消瘦而戚、喉嚨瘖啞、或有成對眼者、其殞命之故、乃緣呼吸司所被癱也、但其人必氣絕後、方無知覺。

1 Migraine
2 Pneumonia
3 Pleurisy
4 Asthma
5 Nervous cough
6 Whooping-cough
7 Laryngismus stridulous
8 Torticollis
9 Dysmenorrhœa

大便久燥症[1]、臨睡時服十量滴、(0.6) 若與洋鼠李同服尤妙、人受漆咬、以此藥一兩、(30.0) 加滾水一量磅、(480.0) 洗之有效。

藥製與分劑

路卑利酒 Tinctura Lobeliæ, U. S. 十至六十量滴、(0.6-4.0) 爲平胃之劑、二至四量錢、(8.0-16.0) 爲令人嘔吐之劑。

路卑利流膏 Fluidextractum Lobeliæ, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3) 爲平胃之劑、十五量滴、(1.0) 爲令人嘔吐之劑。

路卑利伊打酒 Tinctura Lobeliæ Ætherea, B. P. 五至十五量滴、(0.3-1.0)

黃茉莉 GELSEMIUM, U. S. GELSEMII RADIX, B. P.

此乃美國生蔓之樹、入藥者乃此樹之根、內含一鹼、名黃茉莉印。

體功效 腦部 此藥最易癱脊腦、然受其毒者、先則覺徑、後則動徑。

絡部 此藥有阻絡部之力、而阻心尤甚。

呼吸部 此藥因能癱呼吸司所、故令人殞命。

身熱度 服過分劑者、熱度必大爲減少。

[1] Constipation

玻璃瓶內、只宜貯於馬口鐵盒內、嚴密封之、置於冷處。

藥製與分劑

甘油氰弱礬浮酒 Spiritus Glycerylis Nitratis, U.S. 一至二量滴、(0.06-0.12)

甘油氰弱礬輪 Trinitrini Tabellæ, B.P. 一至二輪、

甘油氰弱礬消水 Liquor Trinitrini, B.P. 半至一量滴、(0.03-0.06)

鈉氰弱礬 SODII NITRIS,

此藥之功用、與鍁氰弱礬同、分劑一至二厘。(0.06-0.12)

路卑利 LOBELIA.

此藥係美國所產之野草、入藥者乃其葉。

體功效 服毒分劑者、必致嘔吐、脉微、皮白、面紫、生冷汗、全身之肌無力、亦有瀉腹之甚者、臨死時、呼吸司所、與第十對腦系之末被攤、服過分劑者、當以鴉片平胃、止其嘔吐、以酒與錏淅香浮酒、激其心經、並當煖其身。

療效 此藥之正用、乃醫哮症[1]、泰西之名醫、有重視此藥者、亦有輕視此藥者、乃因醫哮症、必用至足之分劑、方能見效、故其所視不同也、患此症者、若因胃失功用、或氣管發炎而致、此藥常效、若因心經致患哮症、或兼有心症者、忌服、醫此症之法、當將哮之時、服路卑利酒、三十至六十量滴、(2.0-4.0) 或每刻鐘服十量滴、(0.6) 以哮止或惡心為度、

1 Asthma

鈥氰弱礬 (POTASSII NITRIS)

近來此藥多代炦氰弱礬之用、其效較炦氰弱礬畧長、心痛急[1]胃痛[2]癇[3]等症、用之有效、分劑三至五厘、(0.2-0.3) 亦有用分劑較大者、然不能無險。

祛 此藥藉肺腎二經而祛。

甘油氰弱礬 (NITROGLYCERIN)

此藥大有崩力、故用者每一分、必加醇酒百分方可、分劑一至二量滴、(0.06-0.12) 加水或成丸服之、初則切不可多用、若服之日久、即至六十量滴、(4.0) 亦不爲過、醫者須切記此理、如用之見效、必日加分劑方可、此藥之正用、爲使絡部受大而且速之激力、因其激力易過、故宜每三四句鐘服一次、其體功效、與他類氰弱礬相同、炦氰弱礬、亦與此藥相類、但其激力、較此藥畧短、鈥氰弱礬、與鈉氰弱礬、其激力較此藥畧長、心痛急症[4]、多用此藥、癇[5]、肌跳[6]、胃系痛[7]等症、用之亦可、多有著名醫者、謂其能醫腎脫膚久炎症[8]、蓋因服之者尿胎減少也、然恐不能竟其功、腎變硬炎症[9]、如心經受其牽累、且血壓加增、並於右脇第二骿朋處、能聽心之第二聲過大、此因總脉門扇闔力甚大也、服此藥有效、心痛急症、無論痛時與痛先、如血管肌有抽搐之勢、用之最效、若因氣管洒膜積血、致患哮症[10]、此藥最妙、各類嘔吐症[11]、除孕吐與腹統膜炎之外、俱效、醫家所用之甘油氰弱礬酒、因其與水或酒合成、故無崩力、此酒不可貯於

1 Angina pectoris
2 Gastralgia
3 Epilepsy
4 Angina pectoris
5 Epilepsy
6 Chorea
7 Gastralgia
8 Chronic parenchymatous nephritis
9 Interstitial nephritis
10 Asthma
11 Vomiting

即仆倒、心動速而有力、呼吸短而有聲。

腦部　阻腦藥類中、其效最速者係輕藍酸、第二乃此藥。

第三十五圖



此圖表明烌氰弱礬如何阻脊腦動徑

療效　此藥之正感、行於脊腦動徑之中、若不用過分劑、覺徑不受其感、故不能用之止痛、其妙用、能醫全身、或一肢之抽搐、亦能防癇[1]症之瘈瘲、但必須甫覺癇兆時用之、方能有效、服士的年[2]之過分劑、與有痙症[3]者、此藥能防其瘈瘲、心痛急症[4]、若大顯血壓者、此藥有效、婦人經痛症[5]、屢有瘄抽搐之勢、亦大有效、暈船[6]患、或謂其有效、如因驚懼、或因熏迷蒙藥、以致心力虛弱[7]者、或畧鼻之、少頃復鼻之、若不立時見效、即不可復用矣、啼嗽[8]、喉口抽[9]、哮吼[10]痵等症、或因偏頭痛[11]絡部有抽搐之處、此藥皆大有效、醫痙症、或中士的年毒者、當在瘈瘲之先、用之、亦可射於皮內、用法以此藥三至五滴、(0.2-0.3) 滴於布上鼻之、或滴於糖上服之亦可、鼻此藥者、越片時、其效尤大、故宜迭次鼻之、但不可一氣鼻之、恐有意外之虞、醫者當切示病者、藥效甚速、鼻之不宜太驟、恐心經大受其阻也、最妙之用法、以此藥三滴、(0.2) 置於薄玻璃管內、用時即折此管於布上而鼻其氣。

1 Epilepsy
2 Convulsions of strychnia poisoning
3 Tetanus
4 Angina pectoris
5 Dysmenorrhœa
6 Seasickness
7 Cardiac failure
8 Whooping-cough
9 Laryngismus stridulus
10 Spasmodic croup
11 Migraine

或勢欲逞兇者、亦有成瘋狀、或癡狀、或幻想者、且幻想之事多屬兇惡、更有成極重之氣脘炎症、使病者難獲其必需之氣、身變紫色者、顯腸熱之狀者、亦有之、若兼服碘類之藥、或能免脂腺發炎之患、如婦人必須久服此類藥、宜將鉀碘弱礬消水、加此類鹽消水內、可常用之、服此類藥者、因身之脂腺受阻、故脂腺發炎、宜令病者每晚以溫水沐浴、用粗布搓身、以激其皮、有醫者云、倘病者須久服此類藥、宜兼服納透、或撒薹可免以上之患。

禁用之狀　腦部受阻、或育道洄膜受激者、忌用、如腸熱症稍瘉、或產後癲、或年邁顱腦變軟等症、服之不但無益、反致有損、易患脂腺炎者、亦不宜用、倘必須用之、當加慎重。

毒力　中此類鹽之毒者無多、如一次服半至一兩、(15.0-30.0)胃經覺熯、全身無力、額痛、昏迷、口噤、語誤、脉緩、每分鐘之至數僅十五至二十次、且遲速不均、沉取無力、然每能痊瘉、倘致肺成瘀患、則不能救矣、亦有中毒而成顛狂者。

烒氫弱礬 AMYLIS NITRIS, U. S. AMYL NITRIS, B. P.

此藥乃係流質、其氣易散、其香似梨、其形似油、遇熱與光、即改其體質。

體功效　或服或齅皆可、用過分劑、必致頭暈、步履不穩、且耳鳴、頭脹、面紫、身弱、越片時

鏀氣盐 AURI BROMIDUM, 此藥醫癲症[1]、有醫者以爲妙品、日服三次、每次一厘之五分之一、至二十分之一、(0.012-0.03) 成丸服之、或謂此藥有平顱腦之能。

鋰氣盐 LITHII BROMIDUM, U. S. 此藥較他類氣盐之力小、故所用之分劑畧大、有著名醫者謂他類氣盐所不能醫之癇症[2]、此藥或能醫之、一日之分劑三十至百厘。(2-0-6.6)

鎳氣盐 (NICCOLII BROMIDUM) 此藥色綠、惹力甚大、曾經人試驗、體功效與錸氣盐相等、服時宜製沸劑、且多飲水、免有惹胃之患、製沸劑法、乃與鈉䤀碳强礬、及菓酸合勻、以酒噴之、即時過羅、後置於火傍、煨乾、用時加水、即沸、沸時服之。

鈉氣盐 SODII BROMIDUM 此藥之功效、與錸氣盐同、其惹阻二力、較小於他類氣盐、故常用之分劑、與他類氣盐同。

銻氣盐 STRONTII BROMIDUM, U. S. 詳見錸篇。

解毒之效　無論中何毒者、如顛癡之狀、氣盐類、用之爲宜、若顯腦部不平、用之亦可。

久服氣盐之狀　久服大分劑、先則面之皞腺發炎、後則身之腊腺發炎、口出穢氣、精神疲倦、終日酣睡、大聲呼喚、雖能醒覺、隨仍酣睡、即勉强行動、亦衰弱無力、口不能辨味、耳不能司聽、先則慾心受阻、既而靈才亦然、亦有久服此類藥、形狀顛狂、或性情暴燥、

1 Epilepsy
2 Epilepsy

體功效　此藥見涎即化、敷於口洒膜、則有鹽味、如服過分劑、腹內覺有熱痛、且有腸胃發炎之勢。

腦部　此藥使禽獸食之、脊腦動覺二徑、必受其阻、系與肌則不然、亦有平顱腦之功。

絡部　此藥之中分劑、雖有激此部之能、然不甚大、若用之以激此部、宜與他藥同服、方能見效。

療效　此藥之用、與鋏氣鹽同、其阻腦之力、較鋏氣鹽爲小、惹胃之力、較鋏氣鹽爲大、若醫癎[1]症、其功與鋏氣鹽同、有醫者謂若治此症、二鹽同用尤妙、又有名醫謂、若醫痺[2]症、此鹽大效、每日服六十至八十厘 (4.0-5.3) 多用水送下方可、常用之分劑、乃十至三十厘、(0.6-2.0) 忌與燒氣弱酒同用。

錯氣鹽 CALCII BROMIDUM,　此藥有平腦安睡之能、初入藥時、有醫者謂其能代鋏氣鹽之用、其效較鋏氣鹽尤妙、蓋因少有惹力、與阻腦之患、但今之醫者少用之、其故不能盡述、一日之分劑三十至九十厘、(2.0-6.0) 如不易受此類藥之感、雖多用之、亦無妨碍、癲[3]癎[4]等症、服之有效、凡鋏氣鹽所能醫之症、此藥亦能醫之、如與鋏氣鹽各半用之、較專用此藥尤妙。

1 Epilepsy
2 Rheumatism
3 Hysteria
4 Epilepsy

孕吐症[1]、此方有效、如嘔吐過甚、每半句鐘以此分劑減半服之、至四量兩 (120.0) 爲止、如不見效、當用射肛藥、其方如左。

鈉溴塩	℞-Sodii bromidi	三十英厘	(2.0)
無臭鴉片酒	Tinct. opii deodorat	三十量滴	(2.0)
糨水	Aquæ amyli	六量兩	(180.0)

此乃射用之方、存於肛內愈久、功效愈大。

S. To be injected gently into the rectum and retained as long as possible.

過服貴林[2]以致耳鳴者、若與此藥同服、則能預防此患。

服法　此藥之分劑、每日服五至百二十厘、(0.3-8.0) 因其來與祛皆緩、故不宜勤服、如先受大分劑之感、後雖日服小分劑、其感仍存、最妙之服法、乃以水化之、畧加糖漿、則可解其鹹味。

錏溴塩 AMMONII BROMIDUM, 此藥係結晶體、藥店所售者、常爲白散、如遇空氣、畧變黃色、水易化之。

1 Vomiting of pregnancy
2 Cinchonism

頭痛而吐膽液者、此方不可用、經痛[1]與經旺[2]症、此藥有效、幼婦尤效、但經旺症、宜於行經之前七日、早晚服之、每服十釐、(0.6) 方可見效、若醫經前錯症、當常服此藥、雖已痊癒、仍當服二三月之久、可免再犯、暈船[3]者、此爲最妙之防藥、在未上船之前數日、每日服三次、每服五至十釐、(0.3-0.6) 其嘔吐司所即能安靜、如已懸暈、當以他藥佐之、良方如左。

檸酸	℞-Acid. citric.	百二十英釐	(8.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	四量兩	(120.0) —M.

貯於瓶內、再以 Fiat solutio.

鋏氰塩	℞-Potassii bromidi	六十英釐	(4.0)
鋏氣碳強酸	Potassii bicarbonatis	六十英釐	(4.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	四量兩	(120.0) —M.

另貯一瓶內、服法、將此二瓶之藥、各以半量兩、(16.0) 傾於玻璃杯內、立即沸起、正在沸時服之。S. A tablespoonful of each of these solutions should be added to one another and drunk during effervescense.

1 Dysmenorrhœa
2 Menorrhagia
3 Sea-sickness

婦人因瘖病而頭痛[1]者、無論其痛在頂在項、病原在瘖頸者居多、當先治其病原、後服此盐有效、成人或孩童之瘈瘲[2]症、與哥拉同服大效、若孩童因胱抽搐而遺尿[3]者、與哥拉同服屢效、若因脊腦司所、受激太過、致遺精[4]症、此藥乃最妙之品、慾迷[5]、花顛[6]二症、大有功效、用照喉鏡之時、或不能忍受服此藥一二劑、則能忍受矣、嗓新炎[7]症、日服六十厘、(4.0)均開用之有效、孩童生牙[8]時、如有瘈瘲之勢、服之亦效、常有孩童在酣睡之時、忽然驚咋[9]、若用此藥之小分劑、大效、有時人因勞碌太過、不得安睡[10]者、服之亦效、過用目力、致頭與腦系作痛[11]、若與加非印同服、乃為良劑、蓋因加非印能激受阻之腦系、復原、鉀溴盐能阻覺痛之司所也、治頭痛之良方如左。

安替派林	℞ Antipyrinæ U. S. Phenazoni B. P.	二十五英厘	(1.6) —M.
加非印檸檬	Caffeinæ citratæ	十英厘	(0.6)
鉀溴盐	Potassii **bromidi**	二十五英厘	(1.6)

均為五分、每二句鐘服一次、以痛止為度。

Fiant in chartulæ, No. V. S. One powder as needed.

1 Headache
2 Convulsions
3 Incontinence of urine
4 Seminal emissions
5 Satyriasis
6 Nymphomania
7 Acute laryngitis
8 Teething
9 Night screaming
10 Insomnia of overwork
11 Migraine and neuralgia due to eye-strain

腦部　此藥於顱腦覈質動覺之功用、大有阻力、且阻人思索之才、可爲平脊腦之妙藥、其阻力多行於脊腦覺徑之中、故激反應、與覺痛之能俱減。

胃經　因有惹泗膜之力、故多用水送下、可免惹胃之虞。

祛　在人身內不變體質、乃藉各類津液緩緩而祛。

療效　凡腦部之症、若因受感太過、此藥最妙、惟腦部受阻忌用、醫癇[1]症、此藥爲上品、摩[2]症、或婦女癲[3]症、此藥有效、無論成人孩童、或婦女懷孕、或經絕時而受驚者、亦效、良方如左。

錏氯盐	℞-Ammonii bromidi	二英錢	(8.0)
鉀氯盐	Potassii bromidi	半英兩	(16.0)
錏泚香浮酒	Spt. ammon. aromat.	三百六十量滴	(24.0)
樟腦消水	Aquae camphorae	加至六量兩	(180.0) —M.

每四句鐘服一量兩之四分之一、至二分之一、(8.0-16.0)

S. A dessertspoonful to a tablespoonful every four hours.

1 Epilepsy
2 Nervousness
3 Hysteria

厄司連柳礬 Physostigminæ Salicylas, U. S. 一厘之八十分之一、(0.0008)


厄司連硫强礬 Physostigminæ Sulphas, 較上柳礬易於消化、用之最宜、然眼科之醫者、仍多用柳礬。

厄司連鱗片 Lamellæ Physostigminæ B. P. 每片內有厄司連硫强礬一厘之千分之一、(0.00006)

鉀氣塩 POTASSII BROMIDUM.


此藥乃氣與鉀沘消水製成、色白、過光、結晶、無臭、味腥而鹹、乾燥之時、不改原質、陰雨之際、即返潮濕。

第三十三圖



此圖表明服鉀氣塩者、顱腦司動處必受其阻、如A、司靈處亦受其阻、如B、

第三十四圖



C圖乃表明脊腦之覺徑受阻、D圖乃表明激反應之能受阻、蓋因脊腦中之覺脒受阻也、如a、

體功效 此藥令人睏睡、並減少其感應之能。

第七章　論阻動系藥類

此類藥有阻脊腦之能。

加拉巴豆 PHYSOSTIGMA, U. S. PHYSOSTIGMATIS SEMINA, B. P. 此藥產於亞非利加之西、乃一類樹子、內含二鹼、一名厄司連、一名加拉巴印、最要者乃厄司連。

體功效　服中分劑、常令人胃痛、身憊、脉緩、瞳縮、呼吸受阻、過分劑、則全體癱軟、若藥內多含加拉巴印、必至令人痠癱。

腦部　用毒分劑、脊腦覺徑先失其功用、後則脊腦動系之末被癱。

瞳　若以厄司連置於眼內、能令瞳縮小。

療效　醫者於痓症[1]、抽搐[2]與嬰痓[3]俗名四六瘋等類症、常以此藥醫之、微效、胱無力[4]、腸弱[5]、腸胃鬆大[6]等症、皆效、氣腫[7]症亦效、因其能激氣脘之肌、使痰易於吐出也、若加於瀉劑內用之、亦效、因其能激腸內之肌也。

藥製與分劑

加拉巴豆膏 Extractum Physostigmatis. 一厘之八分之一、至四分之一、(0.008-0.015)

加拉巴豆酒 Tinctura Physostigmatis, U. S. 五至三十量滴、(0.3-2.0)

1 Tetanus
2 Spasms
3 Trismus neonatorum
4 Atony of bladder
5 Atony of intestine
6 Gastric and intestinal dilatation
7 Emphysema

毒力　服毒分劑、或有驟然瘈瘲者、亦有漸次使頸項發板、眼目發直者、厥後腦部受惹、忽爾瘈瘲、如狂風之來、當此之時、大概脊必反張、形似彎弓、呼吸之肌、亦必發板、或有他類之瘈瘲、惟脊之反張、乃常見者、中此毒者、或微有所聞、或略受風吹、或有人稍撫其身、彼即因而瘈瘲、蓋脊腦之動徑、受惹甚重、一受覺系之感、遂至於此、然非盡瘈瘲至死、或偶有間斷者、或迭次不止者、間斷時、呼吸如常、瘈瘲時、肌肉甚痛、其死亡之故有二、一因力量用盡、一因呼吸之肌發板、以致呼吸窒塞、遂至殞命者居多、近有人試將毒分劑、射於禽獸皮內、用代引呼吸法、尚能救之、再加五百倍、方能令其死亡。

解毒法　人受士的年之毒、未至瘈瘲之先、當熏炈氰弱䃜、止其瘈瘲、以便易用胃抽器、熏此藥時、當用炭匿酸、以水化服、蓋炭匿酸乃化學中解此毒之藥也、後用胃抽器取出胃中之毒、取淨、將鋏氯鹽六十厘、(4.0) 哥拉二十厘、(1.3) 化服、此二藥與士的年有相敵之效、如已瘈瘲、不能服藥、待間斷時、用哥羅芳謹慎熏之、後用鐃水化鋏氯鹽與哥拉、射入肛內為宜、但熏時不可驟然停止、必以肛內之藥被㖕為度、忌用伊打、因其惹力過甚、功用較緩也、在瘈瘲時、因其不能呼吸、熏藥俱不能用、倘瘈瘲不止、宜用炈氰弱䃜、射於皮內、如有功效、再用以上之法、挨次醫之、中此毒而殞命者、氣將斷時、靈性猶存、至呼吸停止、方無知覺。

然、當心經將停之時、方可用之、受哥羅芳毒者、此藥最效、人熏哥羅芳、有時心將停止、或肺不呼吸、宜用士的年一厘之十分之一(0.006)射入皮內、過十分鐘、如不見效、可再射之、大有激絡部、與呼吸部之力、因受傷而腦力猝衰者[1]、用之大效、氣促症[2]、無論年邁寒嗽[3]或氣脘痰盛[4]、此藥有效、大便久燥症[5]、與瀉劑同服、最效、以其能免瀉力之過猛也。

藥製與分劑

馬前子膏 Extractum Nucis Vomicæ, 一厘之六分之一至四分之一 (0.01-0.015)

馬前子流膏 Fluidextractum Nucis Vomicæ, U. S. Extractum Nucis Vomicæ Liquidum, B. P. 一至五量滴、(0.06-0.3)

馬前子酒 Tinctura Nucis Vomicæ 五至四十量滴、(0.3-2.6)

士的年硫强礬 Strychninæ Sulphas, U. S. 一厘之三十分之一、至二十分之一 (0.002-0.003)

服與射同

士的年⿹气肖礬 Strychninæ Nitras, U. S. 與士的年硫强礬之分劑同、

士的年綠塩 Strychninæ Hydrochloridum, B. P. 亦與士的年硫强礬之分劑同、

割症後如腦力猝衰過甚、即以空針射一厘之四分之一、(0.015) 亦不爲過。

士的年綠塩消水 Liquor Strychninæ Hydrochloridi, B. P. 二至八量滴、(0.12-0.5)

1 Traumatic shock
2 Dyspnœa
3 Winter cough
4 Bronchorrhœa
5 Chronic constipation

劑、因瘈瘲之故、或能使熱度加增。

祛　士的年於肝經之內被氰所奪者多、由腎而祛者少。

療效　馬前子有數類功效、因其味甚苦、且有補力、故可作苦補藥、凡於腦部、呼吸部、以及心經、眼目、皆有功效、且能解鴉片之毒、如因腦部過力、致某經有功病[1]、服之有效、然腦部初得腦病、（如中瘋癱瘓並小兒癱瘓等症）此藥不但無益、反致有損、嘗有患癱瘓者、每服此藥、其所癱之處、反有抽搐之患、若腦系新炎症、忌用、蓋腦系業已受惹、如用此藥、乃益增其惹力也、油匠多用鉛粉、有時中毒漸成癱瘓[2]者、用士的年之足分劑、能抵禦之、並當用鉀氯塩以祛身內之鉛毒、酗酒兼吸煙葉者、有時令目失明[3]、馬前子酒、乃為妙劑、服法、第一日服三次、每次三量滴、(0.2) 第二日每次五量滴、(0.3) 如此每日遞加二量滴、(0.12) 至見體功效為止、人用此法、一日之中、有能服此酒六十量滴 (4.0) 者、過用目力者、此藥有效、肺炎[4]與各類熱症、或致腦力脫失、士的年最效、觀腦力脫失之形狀、常有謂其不能治者、若用士的年醫之、多能救其死亡、用法、以士的年一厘之四十分之一、(0.0015) 加阿刀便一厘之百分之一、(0.0006) 射於皮內、但不可止用一次、當視病者之景況、即用二三次亦可、日久之重症、最要者、不可常用之以激絡部、蓋用此藥、如車夫用鞭

1 Functional disorder
2 Progressive lead palsy
3 Amaurosis
4 Pneumonia

第六章　論激動系藥類

此類藥乃增脊腦中激反應之司所、故多服者行動不穩。


馬前子 NUX VOMICA, 此藥乃一類之樹子、產於印度、內含二鹻、一名士的年、一名步魯先、其功效多本於士的年、故論士的年、即論本藥也。

體功效　服足分劑者、甚有感應之能耳目鼻呼吸、及血壓之力、必俱加增、如不受其正感、則受其惹力矣。

腦部　士的年之正感、乃行於腦部、能感脊腦之動徑、或令覺所受感之能力過度、服過分劑者、即患瘈瘲、服毒分劑、或於瘈瘲時殞命、或瘈瘲後殞命。

呼吸部　士的年爲最能感呼吸司所之藥、不但能加呼吸之速、並能多使肺經舒展。

第三十二圖



此圖表明馬前子能激脊腦動徑、亦有畧激動系幹之能、如A、若服過分劑、則阻肌中動系之末、如B、

絡部　士的年不但加增脉力、且能使之尤速。

身熱度　中分劑、與身之熱度無關、毒分

加水百量滴、(6.60) 其消水與寇卡印不同、以火沸之、並不減少其力、冷水百量滴、(6.60) 能化藥三厘半、(0.21) 若敷於洇膜、不能縮該處之血脂、非若用寇卡印、少有流血之患、若滴於眼內、初覺疼痛、乖效與寇卡印同、治法亦同。

第三十一圖



此圖表明射藥於脊腦潤衣內之法、其針較常用者略長、醫者欲知針果至合宜之處否、必須卸去針筒、只留針於肉內、如有液由空針流出、可知其已入潤衣、後將藥置於針筒內、仍安於針上射之、

由呼吸絡二部、顯種種之病狀者、中此毒者、小便淸長、並內含胎、查其中毒之由、惟因割治之症、必須射藥於尿脘者、多顯此乖效。

解毒法　中毒者若腦系受阻、可用鏗沘、加非、或伊打、士的年、波蘭地等藥解之、如有瘈瘲之勢、宜用解士的年毒之法。見馬前子篇

猶肯綠盐 (EUCAINÆ HYDROCHLORIDUM)

此藥由猶肯用化法而得、體質甚與寇卡印相似、猶肯分爲二種、即甲猶肯、乙猶肯、常用爲痳藥者、乃由乙猶肯取出之綠盐、緣其惹力無多也、製此藥者、謂此藥較寇卡印少有亂絡部之患、若敷於泗膜、不似寇卡印有先白後紅之色、如用爲浸潤痳法、見寇卡印篇　未痳之前、必覺疼痛、良方如左。


乙猶肯	R-Eucainæ hydrochloridi B	一英厘	(0.06)
鈉綠盐	Sodii chloridi	十英厘	(0.6)
蒸水	Aquæ destillatæ	三量兩	(90.0)

用時當置於火上沸之。

眼科常用者、即此藥二厘、(0.12) 加水百量滴、(6.60) 如用爲他處痳藥、乃此藥五厘、(0.30)

謂之無險、曾有醫者訪查用此法於一千七百零八人內、有八人殞命、以此論之、較熏哥羅芳之險尤大、低熱症、服此藥或寇卡流膏祗可作暫時之激藥、如服之日久、不但無益、反致有損、有醫者云、此藥可敵黃熱症之嘔吐、孕吐、患此藥有效、緣其能阻胃覺系也、中鴉片癮者、此藥有解之之能、如常用之、鴉片癮雖去、寇卡印之癮又成矣。

第三十圖



此圖表明可射藥處、三四腰脊骨之間如A、四五腰脊骨之間如B、

藥製與分劑

寇卡流膏 Fluidextractum Cocæ, U. S. Extractum Cocæ Liquidum, B. P. 半至一量錢、(2.0-4.0)


寇卡印綠塩 Cocainæ Hydrochloridum. 一釐之四分之一、至二分之一、(0.015-0.03)

中癮　此藥最易中癮、故當謹慎用之、有此癮者、身體消瘦、血運屢形不過、靈才被阻、狀如酒醉、常有兇惡之幻想、此癮最難斷絕、易於反復、如立斷之、恐致腦力脫失。

乖效　此藥無論服敷、有時致口噤、目盲、惡心、嘔吐、暈仆等患、亦有癡癡似癇狀者、猶有

必發起白飽、形勢甚圓、再於飽旁射之、如是數次、至割處爲止、第二方乃常用者、第一方惟新炎症時可用之、第三方、迭次射之甚妙、此藥之痲效、於身內可存至二十六分鐘之久、遇

第二十九圖



此圖表明用浸潤痲法、

有斷肢者、倘不可用迷蒙藥、則用此法割開皮肉、至本肢之腦系、後用寇卡印之小分劑、以似盟鹽消水化之、射入系鞘內、則本肢即有痲效、若割緊要之症、（如腸熱症兼有穿腸瘍等患）倘不宜用迷蒙藥、可用此法、但宜隨射隨割、連胴包裹之處、宜以刀割開、不可以手撕之、恐有意外之痛、最要者、用時先以法防穢入藥、可免生膿之患、若欲用補皮之法、可以電池之正極、蘸於寇卡印水內、置於將割之皮上、其副極、宜置此皮之邊際、如此、正副二極間之皮、即有痲效、近有醫者、用此藥射於脊腦潤衣內、於四五腰脊骨之間、用寇卡印二厘、(0.12) 加水百量滴、(6.6) 射入十至十五量滴、(0.6-1.0) 速則二分鐘、遲則不過十五分鐘、下體必有痲效、其效可存一至五句鐘之久、但皮膚與所用之針、並藥品俱當潔淨、如患處在四五腰脊骨以上、不宜用此法、因其效只能下行也、然用此法不可

卡菲少許、可免其痛、近今外科之醫生、遇斷指之症、常將寇卡印四至八厘、(0.25-0.5) 加水百量滴、(6.6) 作爲麻藥、用法、先縛其指根、後射於割處、縛指根之故有二、一免血流太過、一免藥速入血、割後宜將縛處稍鬆、容血少流片時、爲將藥冲出也、所用之分劑、不宜過一厘之四分之一、(0.015) 倘必須多用、當將指根多縛片時、緣該處之肌、有解此藥之力、俟藥力稍解、再鬆其縛、可免中毒、近有醫者、用麻藥之法、名爲浸潤麻法、此法所長者、乃因用藥不多、不易中毒也、其方如左。

		一方	二方	三方
寇卡印綠塩	℞-Cocainæ hydrochlor.	四英厘 (0.25)	二英厘 (0.12)	一英厘之五分之一 (0.012)
莫非綠塩	Morphinæ hydrochlor.	半英厘 (0.03)	半英厘 (0.03)	一英厘之十分之一 (0.006)
鈉綠塩	Sodii chloridi	四英厘 (0.25)	四英厘 (0.25)	四英厘 (0.25)
蒸水	Aquæ dest.	四量兩 (120.0)	四量兩 (120.0)	四量兩 (120.0)

用此等方時、外以⿰火非醇五厘、(0.3) 化於百量滴 (6.6) 水內、每方內加三量滴、(0.2) 尋常射藥、必射於皮下、惟此則射於皮間、然宜射於無恙之皮、否則易成膿腫、所射之處、皮

印嗇盐類、油不能化、如欲製成抹膏、必用寇卡印方可、凡眼科之割症、此藥最爲合宜、若眼新炎症[1]、或有微物誤入眼中[2]、以至疼痛者、良方如左。


寇卡印繡盐	℞-Cocainæ hydrochlor.	八英厘	(0.5)
硼强酸	Acid. Boric.	七英厘	(0.46)
烝水	Aquæ Dest.	一量兩	(30.0)—M.

每半句鐘滴一滴於眼內、至痛止爲度。

S. Use with a dropper in the eye every fifteen minutes until relieved.

嘗有患瞭炎症、用此藥而成瞭瘢者、亦有時令眼之瞭膚發乾者、婦人乳頭裂患[3]、於嬰孩未食時、將寇卡印二厘、(0.12) 加水百量滴、(6.6) 敷之有效、但食乳時、當將藥拭淨方可、或曰此法恐有阻生乳之虞、如用於陰道與肛內、不爲甚妙、蓋此二處之洄膜較厚故也、若必須用之、宜以藥十分加水百分、且迭次用之、方有功效、口瘡炎症[4]、如欲用潰藥、先敷寇

第二十八圖



此圖表明寇卡印敷於洄膜上、則覺系之末暫癱而成痲效、覺系如A、洄膜如B、

1 Acute inflammation of eye
2 Foreign body in eye
3 Fissured nipples
4 Stomatitis

寇卡 COCA, U. S. COCÆ FOLIA, B. P.

此藥乃寇卡樹葉、其形似茶、產於皮路玻利非亞二國。

寇卡印 COCAINA

此藥乃寇卡所含之鹼、爲人所常用者。

體功效　服此藥者、越片時、自覺舒暢、常有服後、腦與肌暫增其力者、如敷於洒膜、則必先白而後紅、因其先令血管縮緊、故變白色、及此效一過、則血管鬆大、故變紅色。

腦部　如以此藥敷於覺系末、必暫被癱、若用爲服劑、大有激腦之力、然與覺系毫無關係、服過分劑者、必有瘈瘲之勢、因腦過於受激也。

絡部　此藥之中分劑、略有激心之力、過分劑、則激力特甚。

呼吸部　此藥之足分劑、大有激此部之力、服毒分劑而死者、蓋因此部被癱也。

身熱度　服中分劑者、與身之熱度無關、過分劑、則熱度增加、異乎尋常。

眼　此藥滴於睟上、易於透過、便覺系末失其功用、故爲眼科第一之痲藥、用此藥者、一至五分鐘、便見功效、然瞳雖散大、而睛肌不失其功用、仍有視近之能。

祛　此藥由腎經而祛者少、因所吸之鹽、於身內而改其體質者多。

療效　寇卡印綠鹽 Cocainæ Hydrochloridum. 乃眼科常用之痲藥、將此藥一至四釐 (0.06-0.25) 加水百量滴、(6.6) 滴三至五滴 (0.1-0.3) 於目內、此爲常用之法、寇卡印、油能化之、寇卡

候阿刀便氰鹽 (HOMATROPINA)

此藥乃以化法製成、水十分、能化藥一分、其效與阿刀便同、但較阿刀便見效甚速、而效過亦速、以此藥滴於目內、瞳必散大、越四十八句鐘、即能復原、若阿刀便、必須半月之久、方能復原。

用法　以此藥半至一厘、(0.03-0.06) 加蒸水一量錢、(4.0) 每十分鐘滴一滴於目內、至一句鐘查驗之。

佛茄兒葉 STRAMONIUM, U. S. STRAMONII FOLIA, B. P.

此藥內含一鹼、名佛茄兒印、其效與阿刀便同。

體功效　與顛茄同。

療效　亦與顛茄同。

藥製與分劑

佛茄兒膏 Extractum Stramonii, 一厘之六分之一至二分之一、(0.01-0.03)

佛茄兒流膏 Fluidextractum Stramonii, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3)

佛茄兒酒 Tinctura Stramonii, 五至三十量滴、(0.3-2.0)

佛茄兒抹膏 Unguentum Stramonii, U. S.

佛茄兒印 (Daturina) 一厘之百二十分之一至八十分之一、(0.0005-0.0008)

鮮顛茄膏 Extractum Belladonnæ Viride, B. P. 一厘之四分之一至一厘、(0.015-0.06)

加酒顛茄膏 Extractum Belladonnæ Alcoholicum, B. P. 1厘之四分之一至一厘、(0.015-0.06)

顛茄肛彈 Suppositoria Belladonniæ, B. P. 每彈內有顛茄膏一厘半、(0.09)

阿刀便硫强礬 Atropinæ Sulphas 一厘之二百五十分之一、至四十分之一、(0.0002-0.0015)

阿刀便硫强礬消水 Liquor Atropinæ Sulphatis, B. P. 半至一量滴、(0.03-0.06) 滴於眼內、爲醫眼之特劑。

阿刀便鱗片 Lamellæ Atropinæ, B. P. 每片內有阿刀便一厘之五千分之一、(0.000012)

阿刀便抹膏 Unguentum Atropinæ, B. P.

近有人查明、服此藥者、必阻胃經生液之能、故宜在飯後數句鐘服之。

毒力 中此藥之毒者雖多、而殞命者甚鮮、一因受毒之處不甚緊要、一因祛之甚速、曾有四歲孩童服阿刀便一厘、(0.06) 乃成人百倍之分劑、竟未殞命。

解毒之法 先服吐藥、後用煖身之法、如呼吸漸微、可用士的年激之。

解鴉片毒之力、但不似士的年、與加非印之力大、中草烏頭、與鋑鋏菓礬、或氰藍酸等毒、此藥有效、緣其有激司絡腦所、呼吸司所、以及心經之力、並能保護人之熱度、中蘑菇毒者、阿刀便之足分劑能解之。

藥製與分劑

顚茄葉膏　Extractum Belladonnæ Foliorum, U. S.　一釐之六分之一至四分之一、(0.01-0.015)

顚茄葉酒　Tinctura Belladonnæ Foliorum, U. S.　Tinctura Belladonnæ B. P.　五至十五量滴、(0.3-1.0)

顚茄根流膏　Fluidextractum Belladonnæ Radicis, U. S.　一至二量滴、(0.06-0.12)

顚茄流膏　Extractum Belladonnæ Liquidum, B. P.　一量滴之四分之一至一量滴、(0.015-0.06)

顚茄擦藥　Linimentum Belladonnæ.

顚茄貼膏　Emplastrum Belladonnæ.

顚茄抹膏　Unguentum Belladonnæ.

顚茄汁　Succus Belladonnæ, B. P.　五至十五量滴　(0.3-1.0)

之、每效、如因胱經抽搐、致患遺尿[1]症、此藥大效、如因宮頸抽搐、致患經痛[2]症、或服此藥、或敷顛茄抹膏、或作陰道彈用之、俱有大效、無論成人孩童之乾嗽[3]症、此藥甚妙、大便乾燥[4]有效、緣其於阻腸系、有阻之之能也、緊口抽[5]症、與呃逆[6]症、用之亦可、睛簾炎[7]症、以阿刀便令瞳散大、能免簾珠相粘之患、用法、以阿刀便一至四厘、(0.06-0.25) 加水一量兩、(30.0)滴一滴於眼內、未用驗眼鏡時、用之亦可、但有漲大眼球之力、故患眼脹者忌用、腦力猝衰[8]與腦力脫失[9]等症、或因受傷、或因病重、此藥有激絡部之能、肺炎[10]或腸熱[11]等症、如恐病者有腦力脫失、或司絡腦所失其功用、宜先備此藥於屋內、以便取用、且宜用足分劑、或可救其死亡、肺炎症、稍痛時而生汗不止、心經無力、如用他激心藥無效、用此藥常效、並能止汗、乳腺炎[12]、此藥之足分劑、服敷並用、大效、喉新痛[13]症、喉乾而炎、自覺洄膜脫落者、服足分劑大效、突眼症[14]、此藥或效、如與康畀箭毒、或毛地黃並用、其效尤大、系痛[15]症、此藥之貼膏、或抹膏俱可、惟用抹膏時、當勤於揉摩、方可見效、幼年頭痛[16]、如因過用目力所致、其額必痛、儼若睛眶不能容留睛球者、此藥有效、骿間系痛[17]、顛茄貼膏、貼之有效。

解毒之效　鴉片、加拉巴豆、乍波蘭的等藥之毒、此藥為其體功效之敵藥、雖阿刀便有

1 Urinary incontinence
2 Dysmenorrhœa
3 Nervous cough
4 Constipation
5 Laryngismus stridulus
6 Hiccough
7 Iritis
8 Shock
9 Collapse
10 Pneumonia
11 Typhoid fever
12 Mastitis
13 Acute sore throat
14 Exophthalmic goitre
15 Neuralgia
16 Headache
17 Intercostal neuralgia

妙劑、系痛[1]症亦效、盜汗[2]症尤效、孩童生涎過多[3]症、或成人中錄毒、而流涎者、皆可醫之、臭汗[4]症、或服或敷均效、乳腺炎[5]症、欲止其生乳、將顚茄抹膏敷於炎處最善、盟瀉[6]症亦效、曾有著名醫者、醫白帶[7]症、將顚茄膏二厘(0.12)炭匿酸六厘(0.36)撒於食水絮上、每日納入陰道、挨近踣頸、存至一日之久、患此症而兼疼痛者、良方如左。

鈉輕碳强礬	℞-Sodii bicarbonatis	一英錢	(4.0)
顚茄酒	Tincturæ belladonnæ	三量錢	(12.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	加至十六量兩	(480.0) —M.


病者宜躺卧、墊高其髀、射藥於陰道內。S. Use as a vaginal injection.

歪頸[8]症、以阿刀便射於肌內大效、腸抽搐[9]症、此藥有效、轉筋[10]症、或服或敷皆可、抽搐之㾧[11]症、與莫非並用、乃爲最妙之劑、若用以防症亦可、患此症者、可以顚茄葉作捲吸之、或以煙袋吸之皆可、啼嗽[12]症、如用足分劑、每有功效、肛門圓肌之抽搐[13]症、如因肛裂[14]或因他故、用顚茄抹膏、或製成肛彈用之俱可、尿脘或胱經抽搐[15]症、服此藥、兼敷顚茄抹膏於尿脘下、有效、莖舉硬痛[16]、用之亦可、膽石腎石[17]之痹、以阿刀便之足分劑、加莫非射

1 Neuralgia
2 Night-sweats
3 Idiopathic ptyalism
4 Bromidrosis
5 Inflamed breast
6 Serous diarrhœa
7 Leucorrhœa
8 Torticollis
9 Spasm of intestine
10 Cramps
11 Asthma
12 Whooping-cough
13 Spasm of sphincter ani
14 Fissure of rectum
15 Spasm of the urethra and bladder
16 Chordee
17 Hepatic or renal calculi

嗽 此藥被嗽甚速。

第二十七圖



此圖表明阿刀便如何增血壓、
I 係平常之血壓、
II 因受披路加便之阻、血壓減少、
III 血壓尤減、
VI 因用阿刀便、血壓之力較常甚大、

祛 此藥由腎與育道、祛之甚速、雖服過分劑、亦少有殞命者、如驗人中此毒與否、可將其尿一滴、滴於牲畜眼內、若中此毒、獸瞳必至散大。

療效 生液過多[1]之患、此藥能使之減少、且有解抽之能、如某腺初炎症[2]、大效、亦有激司絡腦所之效、心跳症[3]、服小分劑、或敷顛茄抹膏於前心最妙、腦力脫失者[4]、此為


1 Excessive secretion
2 Local inflammations
3 Cardiac palpitation
4 Collapse

此藥暫阻脊腦也、其痠瘲者、乃因動覺二徑先脫此阻、其司所尙未脫此阻也、服足分劑、能阻動系、亦能平覺系、與志肌無效、與無志肌有解抽之能、亦有阻激反應之力。

絡部　此藥能令脈速、且令血壓加增、脈速之故有三、一因阻顱臟腑系、一因激心肌一因激速系、夫血壓加增者、乃因司絡腦所、與心肌被激也。

呼吸部　阿刀便之中分劑、有激此部之力、然不似士的年、與加非印之大、過分劑、有阻此部之能。

第二十六圖



此圖表明阿刀便能阻顱臟腑系之末如A、亦能激心速系如C、因其激司絡腦所故增血壓之力如B、

育道　此藥有增腸蠕動之力、因其於阻腑系有阻之之能也。

液　此藥能減少全身之津液、惟尿不減、或反有加增者。

身熱度　服此藥之足分劑、每增身之熱度、孩童服之、其熱則增至一二度不等。

眼　此藥能令瞳散大、因其激睛簾之和系、並癱動眼系末、尤有阻睛簾圓肌之能、用之者、有令人患眼騃之虞。

新炎已過方可用之、服小分劑、有激陰陽之效、按此藥之長處、不但能醫病、且能令病者思食、故與莫非迥異、泰西之人服此藥無成癮者、惟印度人有之、並成癲狂、然過數日或數月、自能痊癒。

藥製與分劑　此藥功效無常、雖係妙藥、用之不易、如欲用之、必選已經試驗者方可。

印度麻膏、Extractum Cannabis Indicæ　一厘之四分之一至二分之一、(0.015-0.03)

印度麻流膏、Fluidextractum Cannabis Indicæ, U.S.　四至二十量滴 (0.25-1.3)

印度麻酒、Tinctura Cannabis Indicæ　十五量滴、(1.0)

顛茄根 BELLADONNÆ RADIX　顛茄葉 BELLADONNÆ FOLIA,

此藥內含一鹻、名阿刀便、Atropia 水不易化、常用者、乃阿刀便硫强礬。

體功效　服此藥之足分劑者、面有紅色、喉門乾而赤、瞳則散大、或有雙視者、有時皮生瘕癔、亦或有昏譫者、如服過分劑、昏譫尤甚、語言猛烈、脉速而微、所生之癮與紅熱症之癮相似、過數日則必脫皷、亦如紅熱症然、惟用之於孩童最妙。

腦部　服過分劑、大有激腦之能、以致昏譫、若敷於某處、該處之覺系、必至受阻、試用此藥之過分劑、以灌禽獸、始則脊腦必癱、繼而有似痓之瘈瘲、後則痊癒、其癱者、乃因

馬前子酒	R-Tincturæ nucis vomicæ	二量錢	(8.0)
印度麻酒	Tincturæ cannabis indicæ	二量錢	(8.0) —M.

日服二三次每次十五滴、(1.0) S. 15 drop in water twice or thrice a day.

胃痛症[1]、良方如左。

辣椒酒	R-Tincturæ capsici	一量錢	(4.0)
印度麻酒	Tincturæ cannabis indicæ	半量兩	(16.0)
無臭鴉片酒	Tincturæ opii deodorati	一量兩	(30.0)
哥羅芳浮酒	Spiriti chloroformi	一量兩	(30.0)
拉芬大雜酒	Tincturæ lavandulæ compositæ	加至四兩	(120.0) —M.

每句鐘服一小勺、(4.0) 至痛止爲度。

S. Teaspoonful every hour until pain is relieved.

產後瘖不復原[2]、瘖久炎[3]、痭[4]與抽搐之經痛[5]等症、服此藥、不但止痛、並有平瘖肌之力、腎新久炎[6]二症、可減腰痛、白濁[7]症有效、並免莖舉硬痛[8]之患、初患白濁時不宜用、當俟其

1 Gastralgia
2 Uterine subinvolution
3 Chronic uterine inflammation
4 Metrorrhagia
5 Spasmodic dysmenorrhœa
6 Acute and chronic nephritis
7 Gonorrhœa
8 Chordee

第五章　論激腦藥類

此類之藥服之者、瞳則散大且激顫腦使之昏譫。

印度麻 CANNABIS INDICA

此藥產於印度乃由其帶花之梢取出、採藥者務宜加意、因此花有三類、形甚相同、惟本花有效、若取之不以其時、亦無功效。

體功效　服足分劑、令人不能自主、有可笑之小事則大笑之、可樂之小事、則極樂之、有甚覺憂悶、自以為將死者、亦有自覺呼吸過大、恐肺經崩裂者、此狀一過、必致沉睡、或睡至十五句鐘之久、方能醒覺、服過分劑者、不曉時之短長、一分鐘、常視為一句鐘、其腦之兩半球、各主其意、不能符合、若服過大之分劑、呼吸必緩、然卒無因此藥而殞命者、如敷於洇膜上、先覺惹力甚大、後有痲效、因有此惹力、究不可作痲藥用之。

療效　此藥與他類嗽藥並用、以醫乾嗽症[1]大效、且精神如常、無大便乾結之患、系痛症[2]、此為妙劑、顫癱症[3]、此藥能減其顫患、胱抽搐症[4]、或因胱炎、或因痿症所致、有效、陽痿症[5]、如因腦部所致、與士的年麥奴並用、有效、婦人經絕時或有頭痛者[6]、有效、如兼有大便結燥、並血虧等症、當與阿羅鐵類同服、頭痛症[7]、如因視衣疲弱之故、良方如左。

1 Nervous cough
2 Neuralgia
3 Paralysis agitans
4 Spasm of the bladder
5 Sexual impotence
6 Headaches at the menopause
7 Headache

劑而殞命者、乃先停呼吸部、後停他部、其阻心之力、不似哥拉之大、若常服之、則睡效漸減、分劑二十至六十量滴、(1.3-4.0) 置於藥殼內服之、良方如左。

怕拉第亥	R-Paraldehydi	二量錢半	(10.0)
醇酒	Alcoholis (90 per cent.)	一量兩半	(45.0)
凡匿拉酒	Tincturæ vanillæ	半量錢	(2.0)
烝水	Aquæ destillatæ	一量兩	(30.0)
糖漿	Syrupi	四量兩	(120.0) —M.

每半句鐘服二量錢、(8.0) 至安睡而止。

S. A dessertspoonful every half hour until sleep is obtained.

乖效 久服足分劑者、必睏倦無力、步履不穩、若仍服之、則致下身有癱瘓之虞、既中此患、雖止而不用、其患或有日重一日者、亦或有覺系過度者、情形若此、必致胃經受阻、食物難化、且尿減少、色如紅酒、凡此乖效、多因此藥之積效也、服此藥者、每至第二日、精神疲倦、步履不穩、如與瀉劑同服、可免此虞、嘗有服此藥一次而殞命者、亦有常服而殞命者、均因呼吸受阻也、嘗有服至百二十釐、(8.0) 並無乖效者、亦有服至千四百釐、(63.0) 幸遇名醫調治、仍得不死者。

台歐那 SULPHONETHYLMETHANUM, U. S. 此藥之功用、與索弗拿同、形若魚鱗、無色無味、嘗之畧苦、其大用、乃令人安睡、[1] 服後二十或三十分鐘、即能安睡五六句鐘之久、分劑十五至三十釐、(1.0-2.0) 但服至五六日、宜停二三日、可免積效之患、如大便乾燥、兼服鎂硫強礬方可、此藥水不易化、醇酒能化之、加於湯或茶或酒內服之最妙、常服者、當漸減其分劑、初服此藥、至第二日、每形睏倦、服足分劑者、至二三十日之久、尿含紫色、蓋因血受傷也、如尿色忽紅、立宜止服、當服鎂硫強礬數日、以泄其毒。

怕拉第亥 PARALDEHYDUM. 此藥乃無色之流質、臭之似伊打、嘗之先熱後冷、服之或有惹胃之患、宜置於黑瓶內、嚴密封之、藏於涼處、滾水難化、冷水畧化、醇酒易化、服毒分

1 Insomnia

牙痛症無效、因牙痛而累及面痛者[1]、有效。

服法　此藥宜製成丸服之、化於水內亦可、分劑每二句鐘服三至五厘、(0.2-0.3) 至痛止、或睏睡爲度、嘗有一日服六十厘、(4.0) 則覺過多者、接一日之分劑二十至三十厘、(1.3-2.0) 足矣。

索弗拿 SULPHONMETHANUM, U. S. SULPHONALUM, B. P.

此藥由化法而成、無色、無味、結晶、冷水百分、或滾水二十分、各能化藥一分、若以醇酒、或伊打、化之最易、尋常之酸、不能改其體質。

體功效　此藥之正感、乃行於顱腦中、與絡部無甚關係、如用大分劑、則有阻呼吸之能。

療效　此藥能令人安睡、不寐者[2]、如心無重症、服之有效、癲症而不得睡者、屢效、其安睡之效、小於哥拉、大於怕拉第亥、人有不寐症、服他類睡藥無效者、服此藥有效、總之其益乃在無阻心之患也。

服法　此藥因水不易化、故多置於藥殼內服之、或加於非澁漿內亦可、最妙之法、乃加於滾水內乘熱服之、如至水冷、藥則沉澱矣、此藥之效最緩、故服者宜在未睡之前二三句鐘方可、如臨睡服之、當時不能安睡、至第二日、必覺睏倦、分劑二十至四十厘、(1.3-2.6) 若服至數日、則宜止而不服、或以他藥代之。

1 Neuralgia due to decayed teeth
2 Insomnia

暈船者、以此藥與鋏氰盬各一分、服之大效、未上船之先二日、每日宜用祛膽瀉藥、既上船、宜以此藥與鋏氰盬各三十厘、(2.0) 空腹服之、當躺臥安睡、醒時自不暈矣。

哥拉璵 (CHLORALOSE) 此藥乃以一類之哥拉、與葡糖製成、可代哥拉之用、但其味苦辣、若以水化開服之、則易有惡心之患。

體功效 此藥之體功效與哥拉同、然不似哥拉之猛、其正感乃行於顱腦中、服大分劑、脊腦與心經、皆受其阻、或亦有尿血之患。

療效 此藥之大用、乃醫不寐症、分劑二至七厘、(0.12-0.5) 初用時宜服二厘、(0.12) 過半句鐘便可安睡、服時宜置於藥殼內、多以水送下。

乖效 此藥有時令人雙視、肌顫、亦有搓摸其頭者、人中此藥之癮、或正效減少、乖效漸大、瘖患與瘰症服之、或有痓症之狀、甚至阻其靈性。

布哥拉 BUTYL-CHLORAL HYDRAS, B. P. 此藥之體功效、與哥拉同、其止痛之能較大、阻心之能較小、分劑五至二十厘、(0.3-1.3) 加於糖漿內服之。

療效 因疼痛不能安睡者、此藥較哥拉為宜、面系痛[1]與頭痛[2]、服之有效、如第五對腦系痛、其效尤妙、過用目力之頭痛[3]亦效、頭痛兼惡心者[4]、如非因胃經有病所致、此藥有效、

1 Facial neuralgia
2 Headache
3 Headache due to eye-strain
4 Headache associated with nausea

抽器、以上的年一厘之二十分之一、至十分之一、(0.003-0.006) 或阿刀便一厘之百分之一、(0.0006) 射入皮内、後則每二十分鐘、射毛地黃酒十量滴、(0.6) 待見效方止、宜使病者身高於首、嘔吐時更不可使之昂首、爲使其血易入腦中生命司所也。

哥拉阿米 CHLORALFORMAMIDUM, U. S. 此藥色白、結晶、其味畧苦、水九分、或醇酒一分、各能化藥一分、若化於水内、可久存不壞、其體功效、與哥拉同、但惹胃與腎之能、較哥拉畧小、且阻絡部之力、亦不似哥拉之大、能令人安睡者、因其有平顱腦與脊腦之能也。


療效 凡哥拉能治之病、此藥亦能治之、大有平腦部之力、患不寐症、服後二三刻鐘、即能安睡、兼有止痛之功、系痛症、服之有效、失並和行而疼痛者、亦效、分劑服十至三十厘、(0.6-2.0) 可睡五至八句鐘之久、如一服無效、過三四句鐘可再服之、良方如左。

哥拉阿米	℞-Chloralformamidi	四十英厘	(2.6)
淡氫氯强酸	Acid. hydrochlorici dil.	五量滴	(0.3)
糖漿	Syrupi	二英錢	(8.0)
蒸水	Aquæ	二量兩	(60.0) 「M.

分爲二劑、加水服之。S. Take in two doses in a little water.

皮生瘢瘡。

第二十五圖



此圖表明中哥拉毒者、用毛地黄增血壓之力、且增其脉力、

I 因受哥拉之毒血壓甚微、

II 因射毛地黄、血壓加增、

III 血壓與脉力尤增、

乖效　服此藥者、或致惡心、吐瀉等患、因其有惹力也、有服十至十五厘、(0.6-1.0) 其目至顯紅腫者、亦有生癒、或瘢、或粒、或團瘢、或皰者。

毒力　服毒分劑者必睏倦、不久則昏迷不醒、呼吸先緩而澀、後短而微、其脉先或畧緩、逾時則速如梭、難以診視、面色白紫、頭手皆生冷汗、瞳先縮小、後則散大、全身之肌無力、故不能甦醒。

解毒法　初中此毒者、立與吐劑、並用煖身之法、可以解之、如嘔吐司所業已被阻、則吐藥無效、宜用胃

痙[1]症、或中土的年毒[2]者、此藥大效、因其有阻脊腦動徑之能、用法當以此藥二十厘、(1.3) 與鋏氰鹽六十厘 (4.0) 同服、如有痠瘲之勢、不能下咽、以此二藥化於糢水內、射入肛門亦可、如因痠瘲將藥擠出、當以哥羅芳熏之、俟藥被吸而止、此二藥之小分劑、即哥拉半至一厘、(0.03-0.06) 鋏氰鹽二厘、(0.12) 加於薄荷消水與糖漿內、可醫孩童之痠瘲[3]症、亦可醫孩童疴[4]症、若肌跳[5]與顫癱[6]等症、哥拉有效、酒狂[7]服之亦可、然最宜謹慎、緣其心已受酒阻、如服之太過、恐再受藥阻、以至殞命、腎炎痠瘲[8]症、或曰大效、然腎新炎者、不宜服之、恐腎被惹也、產痠瘲[9]症、如非因腎炎所致、此藥有效、呃逆[10]夜癎[11]、嗬嗽[12]等症、皆可用之、惟瘠症少效、如多用之、有阻心之險。

藥製與分劑

此藥宜加於水或糖漿、或非茴糖漿內服之、但不宜過濃、平穩之分劑、各人不同、約十至三十厘、(0.6-2.0) 均二三次服之、足爲一日之用、有一次服三十厘 (2.0) 而死者、如一日只服一次、二十厘 (1.3) 足矣。

哥拉糖漿 Syrupus Chloral, B. P. 一量錢 (4.0)

中癮 中此藥之癮者、靈才與身力、盡皆減少、有時全身驟然發紅、並有心跳之患、後則

1 Tetanus
2 Strychnine poisoning
3 Infantile convulsions
4 Infantile colic
5 Chorea
6 Paralysis agitans
7 Delirium tremens
8 Uræmic convulsions
9 Puerpural convulsions
10 Hiccough
11 Nocturnal epilepsy
12 Whooping cough

療效 此藥專爲令人安睡、身痛者服之無效、如以十厘、(0.6) 與莫非一厘之六分之一 (0.01) 同服、或可使痛者得以安睡、良方如左。

哥拉	℞-Chlorali hydrati, U. S. / Chloral hydratis, B. P.	二英錢	(8.0)
莫非硫强礬	Morphinæ sulphatis	二英厘	(0.12)
糖漿	Syrupi	二量兩	(60.0)
蒸水	Aquæ dest.	加至三量兩	(90.0) —M.

臨睡時服二量錢、(8.0) 過一句鐘如無效、宜再服之。

S. Dessertspoonful in water, at 10, and at 11 P. M. if necessary.

又方

哥拉	℞-Chlorali hydrati, U. S. / Chloral hydratis, B. P.	一或二英錢	(4.0-8.0)
鉀溴鹽	Potassii bromidi	二英錢	(8.0)
洋有李糖漿	Syr. Pruni virginianæ	一量兩	(30.0)
水	Aquæ	加至三量兩	(90.0) —M.


臨睡時服二量錢。(8.0) S. Dessertspoonful at night.

第二十三圖



此圖表明哥拉能阻心肌、如E、

第二十四圖



此圖表明哥拉能阻延腦中之呼吸司所、如F、

腦部　此藥有令人安睡之能、緣其能平腦中之覺所、兼有平脊腦動徑、並全身動系之能、常用之分劑、不阻知覺、過分劑則阻之、小分劑或使皮膚之知覺加增、亦有阻激反應之效、緣其能平脊腦動徑故也。

絡部　健壯者服十至二十厘、(0.6-1.2) 與此部無甚關係、如服過分劑、血壓必減、脈速而微、因其有阻心之能也。

呼吸部　服中分劑、與此部無涉、毒分劑、呼吸漸緩而促、以至殞命、乃因呼吸先停、霎時而心亦停矣。

身熱度　此藥有減熱度之能、如服毒分劑、乃速其死也、設用毒分劑以灌獸類、用法煖其身、亦可救其生命。

祛　此藥藉腎而祛、服過分劑者、腎經被惹、尿必帶血、或有時含糖。

此藥散、與硼砂散各一分、敷患處亦可、若以此藥一分、加酒十五分、水八十五分、用空針射入皮內可作該處之痲藥、牙痛[1]患、如以此藥化於丁香油內、以絮蘸之、塞入牙隙有效、或用伊打與此藥各一分敷之亦效、不能安枕[2]、或系痛[3]者、可以此藥與安替派林各半、置於藥殼內服之、分劑三至六厘、(0.2-0.4) 此二藥相合則成流質、然與藥力無損。


分劑 哥利吞 (Chloretone) 五至二十厘、(0.3-1.3) 製成三厘 (0.2) 之丸、外裹糖衣、服之最妙。

哥拉 CHLORALUM HYDRATUM, U. S. CHLORAL HYDRAS, B. P.

此藥於英美揀藥冊、雖命名不同、仍係一種色白、結晶、別具一種氣味、宜置於嚴密瓶內、藏於涼暗之處。


體功效 此藥敷於泗膜、先則署紅、痛如火燒、後則發炎。

第二十一圖



此圖表明哥拉有使人安睡之力、因其能平顱腦靈所也、如A、

第二十二圖



此圖表明哥拉有阻脊腦動徑之力、如B、亦有阻動系之力、如C、但不能阻肌、如D、

1 Toothache
2 Restlessness
3 Neuralgia

體功效　此藥有平腦安睡之能、亦有時令人昏譫、與絡部無甚關涉、服過分劑、激反應之能必減、非因系幹被癱、乃因脊腦受阻、當用披路加便以解之、因披路加便乃此藥體功效之敵藥也。

療效　新狂癪等症[1]、如不能睡、服此藥大效、亦可用空針射之、分劑一釐之百分之一、至九十分之一、(0.0006) 因分劑不大、並無異味、故病者易於下咽、有時患狂者、用之無效、或反有乖效、遺精症[2]、臨睡時服一釐之百分之一、(0.0006) 有效、兼有喉症者忌服、恐有喉嚨縮緊之虞、有心症者忌服、緣其有阻心之能也、患瘮症者亦忌服、因其有增瘮之力也、揀藥冊中之此類藥如左。

亥歐辛氰塩 Hyoscinæ Hydrobromidum,　分劑與亥歐辛同。

哥利吞 (CHLORETONE)　此藥乃係新出者、有平腦安睡之能、其效與哥拉同、投以常用之分劑、則無阻心肺之力、不但無惹胃之患、且有平胃之能、此與哥拉不同者也、如因胃經受惹而嘔吐者[3]、有效、胃生疽者[4]亦效、當未熏伊打之前一句鐘、令病者服此藥散十至十五厘、(0.6-1.0) 可免熏後嘔吐之患[5]、胃瘍[6]、或胃系痛[7]、此藥能止其痛、且有痲效、並有免腐之能、故可以此藥一兩、(30.0) 脂油九兩、(270.0) 製成抹膏、爲燙傷[8]碰傷[9]之用、或用

1 Insomnia of acute mania or hysteria
2 Spermatorrhœa
3 Vomiting due to gastric irritation
4 Gastric carcinoma
5 Vomiting after etherization
6 Gastric ulcer
7 Gastralgia
8 Burns
9 Bruises

療效 各類抽搐之痛[1]、或血壓之力不足[2]、此藥有效、凡顛茄所醫之症、此藥足可代之、乾嗽[3]、嘀嗽[4]、疖[5]等症、或較顛茄尤妙、胃泗膜久炎[6]、或胃瘍[7]等症、鬧羊花膏與銀氰强礬同服有效、無論成人孩童之遺尿症[8]、如因脫被惹、服之有效、最要者、在用此藥之先、醫者宜令其尿之酸鹼如常、否則不能見效。

藥製與分劑

藥製		分劑	
鬧羊花酒	Tinctura Hyoscyami,	十至四十量滴	(0.6-2.6)
鬧羊花膏	Extractum Hyoscyami. U. S. Extractum Hyoscyami Viride, B. P.	二至八厘	(0.12-0.5)
鬧羊花流膏	Fluidextractum Hyoscyami, U. S.	二至十量滴	(0.1-0.6)
鬧羊花汁	Succus Hyoscyami, B. P.	三十至六十量滴	(2.0-4.0)
亥歐賽民硫强礬	Hyoscyaminæ Sulphas,	一厘之六十分之一至五十分之一、	(0.001-0.0015)
亥歐賽民溴盐	Hyoscyaminæ Hydrobromidum,	一厘之六十分之一至五十分之一、	(0.001-0.0015)

亥歐辛 (HYOSCINA)

Hyoscinæ Hydrobromidum

此藥係鬧羊花之鹼、乃為流質、泰西所常用者、即亥歐辛溴盐。

1 Spasmodic pain
2 Arterial relaxation
3 Nervous cough
4 Whooping-cough
5 Colic
6 Chronic gastric catarrh
7 Gastric ulcer
8 Incontinence of urine

緣其易於消化也、又有寇苐印硫强礬、Codeinæ Sulphas, U. S. 分劑半至二厘。(0.03-0.12)

體功效　此藥之體功效、與莫非同、但其睡效、不如莫非之大、用足分劑、能令獸類痙而成癱、較莫非尤速、惟阻肺與育道液之能無多、故鮮有大便乾燥之患。

療效　有醫者用之爲平腦劑、亦有用之醫乾嗽症者、無論何類之乾嗽、皆可用之、日服三或四次、每次半至二厘、(0.03-0.12) 加於糖漿內服之、或謂此藥於糖尿症大效、亦有謂少有效者、然遇此症、當試用之、或能有效、宜用甚大之分劑、先服一或二厘、(0.06-0.10) 後當日增一日、待病退而止、嘗有一日服至二三十厘 (1.3-2.0) 者、英揀藥册中、另有寇苐印糖漿 Syrupus Codeinæ, B. P. 分劑一至二量錢、(4.0-8.0)

顚羊花 HYOSCYAMUS, U. S. HYOSCYAMI FOLIA, B. P. 此花產於英美二國、入藥者乃其葉、內含二鹼、一名亥歐辛、一名亥歐賽民、亥歐賽民之體功效、與阿刀便同、能令瞳散大、阿刀便之力、存於眼內半月之久、此藥僅存九日、若欲使瞳散大、宜以此鹼二厘、(0.12) 加水一量兩 (30.0) 用之、有時瞳未散之前、眼忽作痛、乃因睛肌轉筋之故、若遇此患、宜勤用之、使此患速過、惟平腦之力、較大於阿刀便。

莫非肛彈 Suppositoria Morphinæ, B. P. 每彈內含莫非一厘之四分之一、(0.015)

莫非衣必格餅 Trochiscus Morphinæ et Ipecacuanhæ, B. P. 一至四枚、每餅內含莫非一厘之三十六分之一、(0.002)

莫非醋礬消水 Liquor Morphinæ Acetatis, B. P. 十至六十量滴 (0.6-4.0)

莫非射皮內藥 Injectio Morphinæ Hypodermica, B. P. 一至五量滴、(0.06-0.3) 每一十一量滴 (1.4) 內有莫非菓礬一厘。(0.06)

不符之藥 鋏錳上礬、炭閏酸、加勅酸、鋏鋼鏭等之礬類、(鏭類中惟鏭綠塩可合用) 並鐵綠酒、皆與莫非相敵、不能合用。

赫囉印 (HEROIN) 此藥乃由莫非用化法所成者、形似砂粒、色白、觀之無味、嘗之畧苦、乾嗽症有效、此藥與莫非不同、因其有激呼吸之能、服之者、呼吸畧遲而有力、分劑一厘之二十分之一、至六分之一、(0.003-0.01) 用大分劑、不如用小分劑而勤服之爲妙、此藥不令人昏迷、並不使大便結燥、但不易融化、故多用赫囉印綠塩、如以此藥置於水內、加醋酸少許、亦可化之、且可製丸服之。

寇苐印 CODEINA 此藥乃鴉片之一蹠、間有含莫非者、所常用者、乃寇苐印硫强礬、

電極不久停於一處、非但皮不受傷、並免其過力、如電器不便、不得不用以上二法耳、又有以冷水潑其身者、但用此法、恐過減其人之熱度、宜謹慎用之。

莫非 MORPHINA 此藥乃鴉片最要之鹼、其療效詳見鴉片篇、但不常用、緣其不易融化也、今所常用者、乃其盐礬等類。

藥製與分劑

莫非硫强礬 Morphinæ Sulphas, U. S. 一厘之八分之一、至二分之一、(0.008-0.03)

莫非醋礬 Morphinæ Acetas. 同上

莫非綠盐 Morphinæ Hydrochloridum. 同上

莫非菓礬 Morphinæ Tartras, B. P. 同上

莫非雜散 Pulvis Morphinæ Compositus, U. S. 十厘、(0.6) 內有莫非硫强礬、樟腦、甘草、錯炭强礬等藥、受風者服之有效。

莫非氯盐消水 Liquor Morphinæ Hydrochloridi, B. P. 十至六十量滴 (0.6-4.0)

莫非菓礬消水 Liquor Morphinæ Tartratis, B. P. 同上

哥羅芳莫非雜酒 Tinctura Chloroformi et Morphinæ Composita, B. P. 五至十五量滴、(0.3-1.0)

而有力、皮熱而乾、面變紅色、瞳則縮小、形狀至此、人若近其耳呼喊之、或力撼之、雖能醒覺、隨仍酣睡、其形狀與顱腦積血者同、漸次面變紫色、呼吸甚遲、每分鐘僅有四五次、先則遲而長、此時遲而短、其肌鬆懈、皮生冷汗、則無法能使其復甦矣、終則其瞳擴大、呼吸停止、以至殞命。

解毒法　中此毒者、宜先用鋅硫强礬三十厘、(2.0)置於溫水內服之、令其嘔吐、待一刻鐘、如不嘔吐、可再服之、若景況甚險、不用吐藥、或用胃抽器、取淨胃中所存之物、尤妙、如毒已竦入血內、血仍將所含之毒、送入胃中、不可專用以上之法祛之、宜以鋏錳上礬一至三厘、(0.06-0.2)化於一盃水內服之、蓋此藥乃化學中敵鴉片毒之藥也、亦當飲濃熱之加非或茶數杯、因能助其不睡、並有激呼吸絡二部之功也、如呼吸漸緩、可射士的年一厘之三十分之一至十分之一、(0.002-0.006)於皮內以激之、倘仍見緩、可再射酒與錏洮消水、有效、緣其有激心與呼吸之能也、或熱度漸減、當以煖身之法煖之、且因呼吸司所受阻、功用已失、故當常令其呼吸、若聽其沉睡、必致呼吸停止、以至殞命、如用以上各法、仍不能使之醒覺、當以樹之小枝撻其兩腿、或以二人扶掖而行、可免其沉睡、然此二法究不甚妙、一恐皮膚受傷、一恐過用其力、最妙者、乃以電器激之、使

身和平、但不宜加於前方內、因用時多寡無定也、近有以土的年代此膏之用者、其效尤妙、分劑、一厘之六十四分之一至三十二分之一、(0.001-0.002) 製成丸藥、日服三四次、酌癮之大小用之、有重癮者、並當投以索弗拿、台歐那等睡藥、否則不能安睡、恐生返悔之心、且戒煙者之育道、必不能和平、當以合宜之飲食養之方可、外有輔助之法、乃不令其獨自悶坐是也、使數戒煙者同居一室、庶免煩悶之患、醫者宜常看望之、如有熱水袋、可令隨意置於腹上、以止腸弄之痛、可免多服藥之弊、且當以合宜之書籍、使之閱看、亦解悶之一法、如有妥實之人、常與之談論更妙、夜間尤爲緊要。

乖效　有服此藥後、數句鐘之久、不能安睡者、亦有正效已過、惡心或嘔吐者、更有非常之憂悶者、無論服此藥或莫非、若與氰甘油一厘之二百分之一、(0.0003) 或鋏氰盐二十厘、(1.3) 同服、俱能敵此乖效、若用無臭鴉片、其乖效較少、設或有之、則用加非印、或他類激藥、稍能解釋、有服此藥後、皮膚作癢、或生癬、後則皺脫者、孩童服之多有乖效、嘗有用莫非一厘之八分之一、(0.008) 射入皮內而殞命者、必因射入盂內之故、然此乃罕見之事。

毒力　服此藥之毒分劑、初覺恬然、過片時則睏倦、後則沉睡、且呼吸遲而甚長、脉則遲

有流淚鼻涕、以至抽搐、瀉腹等患、且脉微細難診、中癮者、雖素誠樸、必致性情改變、誑哄欺瞞、無所不至、有人欲斷此癮、求醫家治之、必多有遮蓋隱瞞之情、扶侍斷癮者、務用平素妥實之人、晝夜留心、恐有竊食煙泡與灰之事、如忽有精神、醫家必疑其別有情形矣。

戒法　戒鴉片乃世界之難事、因必有系痛、嘔瀉、腸疳、抽搐、吐痰、鼻涕、流淚、煩悶、遺精、血薄、不安、不寐、身痛、不思飲食、生命司所受阻等患、以上諸患、雖不能免、醫者若先投以瀉劑、再以合宜之藥治之、必能減少其苦、良方如左。

貴林硫强礬	℞-Quininæ sulph.	一英兩	(30.0)
易化鐵硄强礬	Ferri phosph. solub.	一英兩	(30.0)
阿刀便硫强礬	Atropinæ sulph.	一英厘	(0.06)

共成二百五十丸、日服三至六丸、酌癮之大小用之。

Fiant pilulæ No. CCL. S. Three to six pills daily.

另有印度麻膏、製成丸藥用之、每丸內有此膏一厘之四分之一、(0.015) 此丸能使人

無臭鴉片酒 Tinctura Opii Deodorati, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

鴉片葡酒 Vinum Opii, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

鴉片醋 Acetum Opii, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

以上各藥、除鴉片樟腦酒、皆有鴉片十分之一、故分劑相同。

鴉片表散 Pulvis Ipecacuanhæ et Opii, U. S. Pulvis Ipecacuanhæ Compositus, B. P. 五至十厘、(0.3-0.6) 內有鴉片散一分、衣必格散一分、乳糖八分。

衣必格鴉片酒 Tinctura Ipecacuanhæ et Opii, U. S, 五至十五量滴 (0.3-1.0)

鴉片流膏 Extractum Opii Liquidum, B. P. 五至三十量滴 (0.3-2.0)

鴉片雜散 Pulvis Opii Compositus, B. P. 二至十厘 (0.12-0.6)

鴉片錏沘酒 Tinctura Opii Ammoniata, B. P. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

鹼雜丸 Pilula Saponis Composita, B. P. 二至四厘 (0.12-0.25) 此丸內亦有鴉片。

鴉片擦藥 Linimentum Opii, B. P.

鴉片貼膏 Emplastrum Opii, B. P.

中癮 吸鴉片者、久必成癮、食之亦然、成癮後、必日增一日、不然、內則煩悶、外則疲乏、兼

有乖效、雖莫非、寇苐印、於此症俱效、但不如此藥之妙、患糖尿者、最易動怒、皮膚作癢、並累覺飢渴、若服此藥、可減以上諸患、曾有患該症者、一斷此藥、則昏迷不醒、以至殞命、患洇瀉症[1]者、宜先服萆麻油、或鎂硫強礬、瀉淨腸內之洇液、後服此藥、有效、孩童暑瀉症[2]、若以莫非一厘之八十分之一、至五十分之一、(0.001) 射入皮內、或有立效者、若不用射法、服鴉片樟腦酒亦效、總之止痛莫妙於莫非、止瀉莫善於鴉片。

藥製與分劑　近有人查明此藥與其[illegible]、皆有阻胃生液之能、服之則胃液之鹽綠酸必減、胃中所存之食物、不易消化、故必飯後二三句鐘服之、最妙。

藥名	Latin	分劑	
鴉片散	Pulvis Opii, U. S.	一厘之四分之一至一厘	(0.015-0.06)
鴉片砂藥	Opium Granulatum, U. S.	一厘之四分之一至二厘	(0.015-0.12)
無臭鴉片	Opium Deodoratum, U. S.	一厘之二分之一至一厘	(0.03-0.06)
鴉片丸	Pilulæ Opii, U. S.	每丸內有鴉片一厘	(0.06)
鴉片膏	Extractum Opii,	一厘之四分之一至二分之一	(0.015-0.03)
鴉片樟腦酒	Tinctura Opii Camphorata. U. S. Tinctura Camphoræ Composita. B. P.	一量錢至半量兩	(4.0-16.0)
鴉片酒	Tinctura Opii	十至三十量滴	(0.6-2.0)

1 Mucous diarrhœa
2 Summer diarrhœa of children

S. Dessertspoonful at 9 P.M. and, if needed, again at 10 or 11 o'clock.

腸熱與肺炎症或有不能睡者[1]、以莫非射入皮內、可使之安睡、但不如以冷水沐浴爲妙。

止炎　此藥有止炎之功、此功爲人所難解、如潤膜炎之諸症、即腹統膜炎[2]、顱腦衣炎[3]、心統膜炎[4]等症、此藥之足分劑、或微分劑、皆效、近有謂腹統膜炎症、未必有效者、咳血[5]後之乾嗽、與尋常之乾嗽、以莫非一厘之十二分之一、(0.005) 加糖漿服之、有效、痘熱[6]症、如皮膚作癢、此藥可止之、胱炎淋濁[7]刺痛、或肛炎[8]等症、以鴉片膏一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.030) 製成肛彈、用之有效、人患嘔吐[9]、除因服此藥而致者、可以無臭鴉片酒三十量滴、(2.0) 加糖水四量兩、(120.0) 鈉氰鹽四十厘、(2.6) 射入肛內、大有功效、肌痺[10]、受風[11]等症、如以鴉片表散五至十厘、與熱茶同服、並將其兩足浸於熱水內、甚效、筋扭[12]或跌打傷[13]、或稱痏傷 以鴉片鉛水敷之最妙、如皮已破、只敷鴉片酒可也、無論內外燙傷[14]、此藥有止痛之功。

液多諸症　糖尿[15]、盟瀉[16]、尿過多[17]或他類液生過多等症、此藥有效、惟汗過多症無效、或謂醫糖尿症、此藥先減其尿、後減其糖、但當日加其分劑、否則難以見效、此等病人、少

1 Persistent insomnia of typhoid fever or pneumonia
2 Peritonitis
3 Meningitis
4 Pericarditis
5 Hæmoptysis
6 Small-pox
7 Strangury
8 Rectal inflammation
9 Excessive vomiting
10 Muscular rheumatism
11 "Colds"
12 Sprains
13 Bruises
14 Burns
15 Diabetes
16 Serous diarrhœa
17 Diabetes insipidus

茄並用大效、如以莫非與阿刀便射入皮內、其效尤速、此藥當痛時服之、不似常人易中其毒、人當痛極之時、倘不可以射莫非、宜將莫非、以熱水或酒化服、依以上之法、用鴉片酒亦可、若不能用以上之法、可以鴉片流膏、或鴉片酒與糭水、射入肛內、有效、如痛在小腹內、或用射肛之法、或以鴉片肛彈、納入肛內、最妙、[1]骳大系痛、或[2]肌抽搐、最善之法、乃以莫非射於痛處之皮內、如痛處甚大、只在皮內可用布蘸鴉片鉛水、覆之、有效、常患痛症者、用之最宜著意、恐致病者久服成癮。

睡效　此藥雖有令人安睡之效、但非因疼痛不能安睡者、不宜用之、如不能不用、宜以哥拉、印度麻、與此藥遞換用之、可免成癮之患、有服哥拉與莫非之小分劑、則安睡者、良方如左。

莫非硫强礬	℞-Morphinæ sulph.	二英厘	(0.12)
哥拉	Chlorali hydrati	一英錢	(4.0)
糖漿	Syrupi	一量兩	(30.0)
蒸水	Aquæ dest.	加至二量兩	(60.0)

晚九句鐘服二量錢、(8.0) 如不見效、十或十一句鐘可再服之。

1 Sciatica
2 Muscular spasm

夫脉遲者、乃因顱臟腑系之本末受激也、有力者、乃因心肌與結受激也、血壓之力畧增者、或因心經受激耳、服毒分劑者、脉必漸速而微、此因心與司絡腦所受阻、亦因呼吸司所受阻、蓋缺氫之故也。

呼吸部　此藥之微分劑、或有激此部之力、毒分劑、其力足使此部受阻、令人殞命。


身熱度　此藥之足分劑、可畧增人之熱度、毒分劑、乃減人之熱度。

胭廢　此藥有護胭之能、故用之者、所祛之尿腥基、(肌肉之渣滓)較他人必少。

祛　服過分劑、由大小便可祛數分、其大半於肝經內被氫改變。

瞳　此藥在腦內、能激動眼系、故使瞳散大。

第二十圖



此圖表明鴉片有使人安睡之能、因其阻顱腦中之靈所如A、其能止痛者、乃因阻顱腦中之覺知司所如B、

腸胃液　此藥能阻腸胃之運動、故其液減少、大便乾燥、雖能阻身內各液、而不能阻汗。

療效　此藥乃止痛[1]之妙劑、惟醫腦系痛症、安替派林藥類、與此藥之效同、且無乖效、但大腦炎症、不可用之、新顱腦衣炎[2]症、或因受傷、或忽得此症、此藥有止痛之功、腎肝疰[3]經痛[4]等症、與顛

1 Pain
2 Meningitis
3 Renal or hepatic colic
4 Dysmenorrhœa

第四章　論睡藥類

此類藥能令人安睡、亥歐辛雖係鬧羊花之鹼、但鬧羊花無令人安睡之能、亥歐辛則有之、故論此鹼於本章也。

鴉片 OPIUM　此藥產於印度波斯土耳其中國等處、乃係罌粟之汁、每百分內、必含莫非九分、方爲合宜、若鴉片散、每百分中、必含莫非十三至十五分、方爲合宜、其中所含之鹼、分爲十七種、最要者、乃莫非與寇第印。

體功效

腦部　此藥有平顱腦之力、亦有激脊腦之能、服小分劑、可平此部、足分劑、能令人酣睡、亦有此部受激、而不安靜者、又有此部雖平、而不酣睡者、試以此藥射於蛙身內、因脊腦受激、常有瘈瘲似痓之狀、試再以此藥射於犬身內、激反應之力必增、並有睏倦之狀、孩童服之、其平力行於顱腦、激力兼行於脊腦、腦中平激之力相等、故不能安睡、若服過分劑、無論人或獸、必致顱脊二腦受阻、令其睏睡、覺系少有知覺、動系止而不動、以至殞命。

絡部　此藥之小分劑、與此部無甚關係、大分劑、能使脉畧遲而有力、血壓之力畧增、

𤍤氣綠塩 (ETHYL CHLORIDE) 此藥乃以醇酒與氣綠酸、相合而成、味似伊打、其氣易散、如置於噴霧具內、噴於患處、則有痳效、因其有凍腡之力也、如吸此藥之氣、必至迷蒙、孩童用之、乃三十至四十五量滴、(2.0-3.0) 成人六十至七十五量滴、(4.0-5.0) 初用時不宜太驟、勿令空氣羼入、不然則無效、宜用嚴密之熏具、具內置絮少許、滴藥於其上、如熏具不便、可用溜筒、(見第十九圖) 合於病者之口鼻、以手握嚴、恐有罅隙處而空氣羼入也、越片時、可令空氣畧入方妥、售此藥者、常置於玻璃管內、管之兩端、扣以螺帽、用時去一螺帽、以手握管、藉手之熱度、令藥噴出、熏至數分鐘、即有迷蒙之勢、或謂吸藥者、脈與呼吸、皆無異於尋常、熏一二量錢、(4.0-8.0) 迷蒙之效、可存五至十分鐘、如欲迷蒙之效久存、則宜多用、但受熏者、瞳與瞭之激反應之力、至終仍存、孩童不然、如用之以懈肌力、則不合宜、去熏具後、病者甦醒甚速、且少乖效、然偶有嘔吐者、此藥入藥年代不久、故用之者少、但用者謂爲穩固之迷蒙藥、因價甚昂、故人不欲用之、有醫者查考、吸此藥者、二千五百五十人中、殞命者一人、亦有醫者查考、千六百人中、殞命者一人、或言此二人之殞命、乃因心經有症之故。


存於黑玻璃瓶內、如藥質純淨、且用之合宜、決無乖效。

體功效　此藥之阻力、只行於呼吸部、如不用之太過、此部亦不受阻。

療效　此藥用爲割小症之迷蒙藥最妙、（如割瘡放膿等類）不可用之以割大症、因吸之過多、呼吸受阻也、婦人分娩時、吸之可減其痛、蓋因此藥之力、去之甚速、較吸他類迷蒙藥、少有產後流血之患、其擅長者、只用數吸、其效即顯、並鮮有乖效、熏後或有似痓抽搐者、然片時即止、少有嘔吐之患、或口存蒜味數日之久、或云亦有熏此藥而殞命者。

用法　以四十五量滴至三量錢、(3.0-12.0) 傾於布上、或熏具上、合於病者之口鼻吸之、此分劑足能令人迷蒙、不可如哥羅芳漸次滴用。

第十八圖



此具用時去一螺帽則藥氣噴出

第十九圖



此圖表明如何用溜筩爲熏具

藥之險、較疼痛之險爲輕也。

乖效並治法　熏此藥而有危險者、多顯於男、少顯於女、每六人中、或有婦女一人、熏此藥時、心經或呼吸偶有停止、有未停之先、面色變靑者、亦有並無顯兆者、如遇此等乖效、務當止熏、並用代引呼吸之法、宜射伊打、與伯蘭地於皮內、但當均開用之、且宜以間流電池之兩極、磋磨其身、最要者、不可將此二極久停於膈、或膈系之上、又宜上提其腿、下垂其頭、若倒懸之狀、見第十三圖　用布捲纏其腿、亦當擠按其腹、使血流入心腦二處、更當以阿刀便士的年、毛地黃、射入皮內、此數藥能激絡與呼吸二部、其中最要者、乃士的年、若以臂上㓟𥂁𥂁射之、亦效、用代引呼吸法時、如有人以鉗上提其舌、每分鐘十至十四次、亦爲激膈之法、曾有人形狀似死、僅搓摩其前心、乃得復甦、倘遇乖效、醫者當以耐心待之、不可輕易絕望、如用以上之法救之、過一句鐘之久、則無望矣、熏後而嘔吐者、每百人中約有十五人、然不足爲險。

溢氣𥂁 (ETHYL BROMIDE)

此藥乃以醇酒、硫强酸、鉩氣𥂁相合、烝之而成、係無色之流質、味香如哥羅芳、以試紙試之、其色不變、其氣易散、不散者不入藥用、傾於掌上、散後如仍存似油之痕跡、必非佳者、則不可用、此藥不宜見光與空氣、燈光亦能改變其氣、常

啦芬大雜酒 Tr. Lavandul. Comp. 加至三量兩 (90.0)

每二十分鐘、服二量錢、(8.0) 至四次而止。 Dessertspoonful in water every twenty minutes for 4 doses.

盟瀉[1]症、先服瀉藥一劑、後用哥羅芳酒、與鴉片、並斂藥類同服、大效、腎肝二經之𤵸鱮[2]此藥數次、不但病可暫瘉、且因有解抽之力、亦或可除病根、若以此藥加擦藥類內、其效尤妙、腰痺[3]與系痛[4]等症、擦之有效。

藥製與分劑

哥羅芳擦藥 Linimentum Chloroformi

哥羅芳水 Aqua Chloroformi U. S. 半至二量兩 (16.0-60.0)

哥羅芳酒 Spiritus Chloroformi U. S. 二十至六十量滴 (1.3-4.0)

哥羅芳勻藥 Emulsum Chloroformi. U. S. 二至四量錢 (8.0-16.0)

哥羅芳莫非雜酒 Tinctura Chloroformi et Morphinæ Composita, B. P. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

禁用之狀 心變脂、心痕、腺瘤等症、與有熏藥之癖忌者、忌用、有心門病者、如謹慎用之尙可、然不若用伊打爲妥、有以上諸症、或兼有當割之症、用迷蒙藥、較不用爲善、因用

1 Serous diarrhœa
2 Renal or hepatic colic
3 Lumbago
4 Neuralgia

五分、藥氣五分爲最當、故宜漸次滴之、若用之過猛、難保無險、如與氳兼用、而危險較少、熏時宜切記者有五、一熏具內宜置食水絮些須、滴藥於其上、二病者宜䮞臥牀上、鬆其衣帶、令呼氣於熏具之內、熏具距鼻之遠近、以自然之呼吸爲準、三宜令病者有自然之呼吸、漸次受藥、不可猛吸、此爲最要、四如呼吸不能出於自然、因空氣不足之故、宜暫行停止、容其得吸空氣、而後熏之、五病者已至迷蒙時、瞭無知覺、肌亦鬆軟、或有鼻鼾者、在鼻鼾時、瞭或仍有知覺、則宜止熏、過數秒鐘、瞭則自無知覺矣、如人屢經受熏、再熏時、仍當謹愼、如初、蓋被熏而殞命者、多在未至迷蒙時、爲人所不料、未熏時、先以阿刀便射入皮內、或用臂上棚、亦可能免絡部舒鬆之患、用阿刀便尤妙、用此法於不易受熏者、實有功效、健壯者熏此藥、如不安帖、較虛弱者尤險、因其全身用力、則呼吸甚大、絡部或至忽然受阻、服此藥者、口與胃覺有熱力、發有服之過多而殞命者、乾嗽症[1]、以哥羅芳酒、或哥羅芳水、與他嗽藥並用、大效、腸胃脹症[2]、用此藥一至二量滴、(0.06-0.12) 或哥羅芳酒十至二十量滴、(0.6-1.3) 有效、各類之腹痛症、良方如左。

	R-Spt. Chloroformi		
哥羅芳酒	R-Spt. Chloroformi	半量兩	(16.0)
樟腦酒	Spt. Camphoræ	二量錢	(8.0)

1 Nervous cough
2 Flatulence

第十七圖




此圖與第十六同惟以手按其前胸令其肺縮緊能呼氣也

第十五圖




此圖表明宜如何扶病者之頭使之易於呼吸如此提上會壓且使膠簾離舌則氣易於入肺

第十六圖



下垂病者之頭兼用代引呼吸之法將病者之腿上提以手擠其兩肋使之胸膛向前令其肺脹能吸氣也

第十四圖



此具與拉來氏之熏具同、內係白氈、外係牛革、革有小孔、以滴哥羅芳、置雞毛於小口、以試病者之呼吸如何。

有心症、伊打較此藥妥善、若兼有腎症、此藥較伊打妥善、緣其分劑較小也、如兼有血囊、或脉變壞症、用此藥熏之最妙、因其有阻心之能而伊打有激心之力、故受熏者、多不安帖、恐血囊或血脘有崩裂之處、成人或孩童、若已有氣脘炎症、此藥較伊打合宜、因其少有惹泗膜之力、若遇須剖開髏骨之症、此藥最妙、如用伊打、病者嘔吐時、腦衣必多有積血之患、若遇須割總氣脘症、宜用此藥、勒疝症[1]、以此藥熏之、或能收縮、因人至迷蒙時、其肌鬆軟也、婦女分娩時、熏此藥少有乖效者、其故有四、一因常用者乃小分劑、二因婦人至此時、心經畧長、多能敵此藥之毒、三因婦人當此時、必樂熏迷蒙藥、並無懼心、四因產痛激發司絡腦所、此藥少有阻之之力、孩童啼嗽症[2]、滴此藥數滴於掌上、鼻之有效、倘病重日久、最宜謹慎、因此症使心經鬆軟、難敵此毒、故必滴於掌上鼻之、可免多用之患。

用法　熏此藥者、用手巾一塊、距鼻三四寸、漸次滴下、如有熏具尤妙、熏時空氣宜九十

1 Strangulated hernia
2 Whooping-cough


習用此藥者、較用伊打、多有危險、然亦多有裨益、用之較少、而其效較速、且其味不惡、於氣管喉嚨、並無惹惡力、熏後少有嘔吐者、此藥用爲迷蒙、雖不如用伊打之穩妥、然習用者、無甚危險、但熏時宜留意其呼吸、視人呼吸之大小、則知用藥之多少、緣熏之過多者、先停呼吸、後停心經、乃其常理、用藥之室、宜多有淸氣、倘熏時呼吸不正、或身不安帖、宜暫停止、如特有一診脉者、專司其脉、以便熏藥者、專視其呼吸、更妙、如病者兼

第十二圖



此圖乃厄司馬克氏之熏具、與哥羅芳瓶、熏具係銅絲架、覆之以布、將瓶內哥羅芳、滴於其上。


第十三圖



此圖乃拉來氏之熏具、以竹四片相合而成、以絨覆之。

所受阻、血脂鬆軟、且因坐熏、則血更難運至生命司所也、遇此險狀、如以鹽消水射入盂內、無甚功效、因其愈射鹽水、盂盪愈鬆也、宜在未熏之前、射阿刀便於皮內、使司絡腦所、少受其阻、因阿刀便爲最能激此部之藥也、如因受傷流血過多、宜用布帶纏其兩腿、如脈微細、宜用擠腹之法、總之無論何症、熏時不可墊高其首。

第十一圖



此圖表明熏哥羅芳時、用脈針顯出脈與血壓如何受阻、第一行、畧顯血壓之力減少、第二行、尤顯血壓之力減少、第三行、血壓之力全無、至此則脈甚微、呼吸在X時停止、而心仍舒縮、然血壓之力、必先衰微、後顯於脈、再後顯於呼吸、末後心則停止。

身熱度　熏此藥時、人之熱度、必漸減少。

祛　此藥由肺腎而祛、如腎經祛之過多、則易於發炎。


療效　此藥之大用、乃在迷蒙、不

盾醫院、則謂因心經被癱之故、故熏時惟著意診脉而已、泰西各國、多有醫者考驗此二論、前二十餘年、印度亥德拉巴之總督、招集著名醫生、仍復考查、以倫盾名醫主理其事、此醫始以前次考定者爲非、終則又以爲可信、遂明言被熏而殞命者、大半因呼吸被癱、亦或有因心經被癱者、仍多有醫者、不服此理、該總督又請倫盾名醫二人、美國名醫一人、（即著此書者）復行查驗、務須盡致、令人無不佩服、考查多日、其識見只有一事相同、乃謂熏時司絡部受阻、以致血壓之力、大爲減少、而英之二醫、復以爲心經受阻之故、究之被熏而殞命者、非因心經受阻、亦非因呼吸受阻、實司絡腦所受阻、致使其人之血、散佈遍身之細脉與微、以致生命司所無血、如放出然、若人身之脉與盂舒鬆、則能容血至數倍之多、如不服此理、當思用塩消水射入血脘時、若絡部鬆軟、雖所射者、較血多至數倍、而血壓仍不見增、因微與盂舒鬆、則能容水甚多也、故熏此藥時、亦因絡部鬆軟、血多積於微盂之內、致使心經空虛、可知其人殞命、非因心經呼吸受阻、實因生命司所無血、致使各部挨次被癱也、可引一據、證明此理、如熏犬至呼吸停時、使其頭下垂、手擠其腹、令血流出大盂、入於心腦二處、並用代引呼吸法、則可救之、復生、曾有名醫、以此法救過性命若許、泰西之醫報、屢言人坐熏而殞命者、因其司絡腦

也、然亦有心先停而殞命者、若以此藥敷於動覺二系、有效、然醫者不用之爲痳藥、因其惹力過大也、其效與系幹無關。


呼吸絡二部　此藥自用爲迷蒙藥、直至於今、其所以能感此二部者、醫家所論不同、厄丁布耳醫院、論人被熏而殞命者、乃因呼吸部被癱之故、故熏時當於此部留意、倫

第七圖




此圖表明熏哥羅芳受阻之效司絡腦所受阻如A心經受阻且鬆大如B呼吸司所受阻如C

第八圖




此圖表明哥羅芳迷蒙之效、阻腦內覺知司所如A後阻靈司所如B再後阻動司所如C

第九圖



此圖表明熏哥羅芳先阻脊腦覺徑如D

第十圖



此圖表明後阻脊腦動徑如E

將白灰撒於其內、合勻過淋、倘尙有雜質、再以此法過之、便可用爲熏藥、試以此藥傾於掌上、乾時齅之、若有油味、必其製法不善、不可用爲熏藥、此藥必須淸澈如水、以試紙投於其中、終不改色、置於掌上而無惹力、傾於表鍋內、必散之無餘、且無存味、其重率乃 Specific gravity 1.401-1525 如加銀氣强礬、而無沉澱、加鋏洮熱之、而無古銅色、加濃硫强酸合勻、雖有灰色而不甚深、如此方可用爲熏藥、如夜晚熏人、室內有煤氣燈、亦能使此藥之氣、變爲氯與氯酸、必致病人之氣胞受惹。

體功效　此藥敷於皮膚、或微有熱力、以表鍋覆之、該處必起皰、人熏此藥、口內覺燥、厥後全身之肌力必懈、再後則無知覺、肺之呼吸、先大而長、後則漸急而短、或有因腦部受激、而脉力加增者、過片時、脉速而力減、此藥無惹喉口腦系之力、故初用時、罕有停呼吸之患、但其瞳先則畧散、至迷蒙時、乃復縮小、如再散大、乃爲險兆、恐驟然而死、熏此藥時、或有手舞足蹈之勢、而强壯與嗜酒者、尤易有之、若遇此狀、仍勤熏之、不爲無險、總之以此藥熏人、不可散盡其肌力也。

腦部　此藥之正感、先行顱腦、後則脊腦覺動二徑、延腦覺動二徑、挨次受阻、若延腦動徑、受阻過甚、其人必致殞命、蓋司絡腦所旣受其阻、呼吸部亦必因之被癱、乃常理

炭尼利、並伯蘭地之小分劑、或免此患、如與𦤀同用、亦為免此患之法、孩童與虛弱者、熏後或有氣脘炎症、此多因受寒而致、非盡因洄膜受惹也、亦有熏後患肺炎症者、或因此藥激惹之能力所致、然多因嗓口失其功用、令食物或血入肺所致也、未熏之前、口宜漱淨、熏後不可下咽口中之液、或有熏後而小便不利者、惟割腹中之病多有之、此乃險兆、如射𦤀甘油於皮內、射似𥂕鹽消水於肛內、或可治之、若腎經無重症、且熏之不多、則與腎無傷、有名醫云、腎經之病、若不至垂危、亦可用之、有糖尿症者忌用、如用之、恐不復甦、孩童或年邁者、熏後氣脘洄膜、過於生液、致難呼吸、乃常有之患、如遇此患、宜用阿刀便之足分劑、射入皮內、有效、或有熏後而患單癱症者、非因此藥之故、乃因迷蒙時、該處之系被壓、致失功用、如用善法、亦可調治之。


哥羅芳 CHLOROFORMUM,

此藥初製於美國、俗革蘭之名醫、始用之為迷蒙藥、係無色之流質、味熱而甜、鼻之署香氣最易散、且有免腐之能、分為二種、一純者、一不純者、不純者不入藥用、此藥宜存於冷暗之處、如置於透光處、不久有變為𣱿氫綠鹽與氫綠酸及綠者、則不可復用為熏藥矣、如欲試此藥、可以藍試紙、蘸於藥內、若已變成𨫼氣綠酸、此紙必變紅色、如以銀𦤀强礬、置於其內、若已變綠、則有白澱、如欲去淨藥內所變者、可

千五百五十三人內、被熏而殞命者、有二十五人、是每萬六千三百零二人中、有一殞命者也、如用之過分、有時令人面顯紫色、亦有頸盂如脉脂之舒縮者、此因血內缺氳、與心經鬆軟之故、亦有時心經或呼吸驟然停止、然不多見、被熏而殞命者、多因其心或腎有重症之故、熏此藥者、血壓必增、亦有因之中瘋者、然亦無幾、如遇以上各患、宜立止而不熏、並用代引呼吸法、如面顯白色、宜令其身高於首、若面色紅紫、不可如此、因紅紫乃停呼吸之兆也、至此形狀、當以士的年、阿刀便、毛地黃等藥、用空針射於皮內、如果甚險、可以錏洸消水、射入盂內、雖見效甚速、而危險較大、或有用伊打射之者、雖有時見效、究不合當然之理、因其人已受此藥過多、再以此藥射之、不更險乎、其所以見效者、乃因臊內積痰、或初用此藥時、熏之過猛、少得空氣、以至呼吸受阻、非因熏之過多也、若射酒於皮內、以醫此患、亦不甚妙、因其效與此藥相同、如能用以上所言之藥、酒則不必用矣、並當搓摩其身、使血運行、亦當溫煖遍身、且膈為呼吸最要之肌、每分鐘當上提其舌十五次、此乃激膈之妙法、並宜用此藥澆其胸、使有激反應之呼吸、因此藥較冷水尤冷、故激反應之能力更大、並免濕病者之衣、熏此藥亦有嘔吐、不此者、故於未熏之先、當令病者十二句鐘之內、勿進飲食、熏後可食冰塊些須、與阿司

熏此藥有效、他類肌抽搐之患、亦可用之、有醫者云、腎炎腦中毒症[1]、如用足分劑、或服或射皮內、有效、倘心經或呼吸受阻、此法尤妙、勒疝症[2]可以此藥熏之、緣其有鬆肌之能、醫者或可上推其疝、令腸復原、有畏服魚肝油者、如以此藥二十滴、(1.30) 用冰水送下、或滴於藥殼內、與魚肝油同服、或服油後、一刻鐘服之、皆可。

第六圖



此圖係阿拉色熏具

藥製與分劑

伊打 Æther, 三十量滴至半量兩、(2.0-16.0) 如不用冰水或藥殼服之、恐難下咽、緣其氣有過激喉門之力也。

伊打酒 Spiritus Ætheris, B. P. 一至二量錢。(4.0-8.0)

禁用之狀　人患氣腤炎、或腎新炎症、不宜用之、緣其激力過大也、腹統膜炎、或胃炎症、亦不可用、因其有令人嘔吐之患、血囊與脈變壞症、仍不可用、緣其有增血壓之力、恐致血腤崩裂、糖尿症亦不宜用、恐其人不能復甦、血虧症、如紅脒紅腥缺半者、用之亦不妥善。

祛　此藥由肺、腎、而祛。

乖效　此藥較哥羅芳雖爲穩妥、然未嘗無險、有醫者業已查明、用此藥於四十萬零七


1 Uræmia
2 Strangulated hernia

熱九度、若人受熏過重、一句鐘則減熱四度、因其腦部受阻也。

療效　此藥若作迷蒙之用、則宜熏之、如無熏具、當以手巾硬紙各一、捲作漏巵之形、小口置海絨、滴此藥於其上、大口合於口鼻熏之、若遽然合之太嚴、其人或生懼心、或形氣悶、如漸次合嚴、則免此二患、至能受時、宜急用之、可令藥氣少與空氣攙雜、此等用法、與用哥羅芳迴乎不同、宜防此藥與其氣入病者目內、緣其有惹目之力也、如以濕布覆於目上、可免此虞、熏此藥之具甚夥、最合用者乃阿拉色所製、近有醫者、以熏哥羅芳之具、(見下圖)合於病者之口鼻、滴此藥於其上熏之、但用時宜連滴不止、否則病者必立即甦醒、此法見效甚速、且少有危險、其長處乃在吸之之時、藥與空氣相雜、不易中毒也、此藥與氯如何用法、詳見氯篇、未熏藥前、病者於十二句鐘之內、當勿進飲食、則熏時與熏後、可免嘔吐之患、熏時口內不可含易咽之物、恐入氣管、以致殞命、有醫者以此藥與酒及哥羅芳相合熏之、非爲妙法、如以此藥置於噴霧具內噴之、能令割處甚冷、可作痳藥之用、如欲用針刺腹或胸、此法最易、皮系痛症、用此法冷之、有效、此藥亦可作服藥、孩童或成人之疛[1]、或腸胃脹[2]等症、服之有效、而伊打雜酒尤效、腦力脫失症[3]、如心力虛弱、此藥合宜、或射或服或熏皆可、較用炭氰弱礬、見效或速、呃逆症[4]、署

1 Colic
2 Flatulence
3 Collapse
4 Hiccough

第四圖



此圖表明熏伊打者因經挨次受阻而成迷蒙之功顱腦知覺之功用如(A)靈之功用如(B)動之功用如(C)脊腦覺徑如(D)脊腦動徑如(E)

第五圖



此圖表明上提其舌令會厭離喿口使空氣易於入肺之法

非緣其變血、或改腦部之元膋、且與系幹並無關涉。

絡部　此乃激心之藥、效來甚速、而去之亦速、因其有激心與司絡腦所之力、能使脉速而力增、如用之過多、則心經受阻。

呼吸部　人初吸此藥時、因喉與肺之系末過於受激、其呼吸必不安舒、膈與胸之動法、異乎尋常、熏此藥未至割治時、其喉尚有激反應之力、如緊不甚通暢、膈必縮緊、骿肌向內而凹、腹內各臟、被逼而下、見此形狀、須上提其頦、令嗓通暢、使空氣多入肺中、雖腹內各臟未盡如初、然較前大有裨益、骿肌如常矣、如仍用此藥、呼吸止在胸間、膈必鬆而不縮、亦有過鬆者、吸氣時、膈則上凸、並上引腹內之各臟、而顛倒腹間呼吸之動法、此乃激呼吸之力、多行於司膈之司所、若用之太過、此司所先被癱矣、醫者熏此藥時、宜視膈與胸之動法、並瞳之大小、且宜勤診其脉、此皆緊要之理、如膈停而不動、乃險兆也、若欲再用此藥、務須謹慎、蓋因此藥而殞命者、膈先被癱、胸則補膈力之不足、及胸被癱、頸肌又補胸力之不足、至終頸肌被癱、則殞命矣、總之用之適中、乃能激發呼吸、若過用之、則呼吸司所被癱。

身熱度　受此藥而迷蒙者、如時刻過長、必至熱度減少、試以此藥熏犬、一句鐘必減

之、血壓必增、恐有中瘋之患。

伊打 ETHER 此藥之純者、乃伊打九十六分、醇酒與水共四分所成、不純者、不用爲熏藥、英之純伊打、則無酒水羼雜、製法、將醇酒與硫强酸相合而成、乃無色之流質、其氣易散、別具一種烈味、嘗之有熱力、易於燃着、故用時宜去燈火五尺、緣此藥之氣、較空氣沉重、故割症室中之爐火、必高過割症之案方可。

體功效 此藥之功效、最速而短、其力多與酒同、較酒力尤速、若置於皮膚上、該處必覺甚冷、故醫者可用爲一處之痲藥、如以此藥或其氣、置於泗膜上、惹力甚大、當人被熏之初、大半呼吸被噎、故面與目必發赤、有欲避之狀、然不久即過、則帖然矣、及至呼吸甚長、脉畧速而有力、眼之激反應仍存、此勢一過、其人仍有嚷鬧辱罵、或喜笑哀哭、或惱怒尋鬬等不安之勢、此等情形、各人不同、有時必須用力管束方可、如仍用此藥、越片時則靈性無覺矣、至此即宜割治、如未至此時而割治者、其人決不安帖、但用此藥時、不宜散盡肌力、若一散盡、則呼吸之肌、必受其阻、以至殞命。

腦部 此藥之功效、先行於顱腦之中、後行於脊腦、覺動二徑、延腦覺動二徑、如用毒分劑、必致呼吸司所被癱、因而殞命、夫此藥能令人迷蒙者、乃因其有暫阻知覺之能、

令人缺氧、故血壓畧增、其所以能令人迷蒙者、或因熏時、其人血內缺氧之故、且因本藥原有迷蒙顱腦之能、按此藥與他迷蒙藥不同、最奇者、受迷蒙之人、其腔激反應之力仍存、昔有人謂熏此藥者、必暫有糖尿症、近有人查明此理不足爲證、有熏後而成糖尿症者、緣小腦下房底受損故也、亦有熏後或頭暈一二句鐘者、然中患者卒鮮。

療效 割瘤或指筋鞘炎等、用此藥迷蒙之最爲合宜、近有醫者欲用迷蒙藥、先用此藥、後用伊打或哥羅芳熏之、此乃省工之法、用此藥之難有二、一迷蒙之效不久、二不易攜至他處、然其見長之處、少有因熏而殞命者、較寇卡印尤無危險、因其不易攜帶、故常以寇卡印代之、此藥常用爲摘牙之蒙藥、用時宜以片木置於上下牙之間、以免其閉口、易於下鉗也、然此木宜以繩繫之、可免下咽之虞、此藥與氧並用之益、與伊打或哥羅芳與氧並用之益同、但其效畧遲、今將此藥與氧並用者、開列於左、一如孩童專吸此藥、全身不能安靜、與氧同用、可免此患、一如血虧與虛弱者、專吸此藥、易於抽搐、效亦不長、故宜與氧並用、一用過此藥之人、初用時、如效來甚速、而去之亦速者、若以此藥與氧並用、可令迷蒙之效畧長、一已用此藥、而覺有危險之狀者、可與氧並用、一年邁或喉門榾過大、有心症、或肺症者、皆宜與氧並用、惟年邁而脈變壞症、忌用、如用


第三章 論迷蒙藥類

此類之藥、其氣易散、人吸之則失其知覺、被𠻳極速、由肺而祛之亦速、用時如止而不熏、不久即甦、若於未熏之前半句鐘、以莫非射於皮內、則蒙效較長、如服哥拉後、以伊打熏之、則迷蒙之初程必易過、而迷蒙之效尤長、其大用乃爲止痛、外科割症時常用之、如用於產科、可減分娩之痛、然不可多用、恐有產後痸之險、脫節或勒疝症、如患處之肌抽搐、以此藥熏之、易於施治、蓋熏時肌則鬆軟、不致抽搐也、膽石或腎石之痱、熏之屢效、不但止痛、且令含石之膽鬆軟、其石易出也。

氰氣下治 (NITROUS OXIDE) 此藥又名喜氣、齅之無味、嘗之畧甜、製此藥時、所用之器具甚多、故醫者難以自製、泰西所售者、皆用壓力製成流質、置於鐵管內、故醫者可購而用之。

體功效 此藥如少用而緩吸之、其人必至喜笑、故俗名喜氣、若多用而速吸之、則少見喜笑之容、用法乃以氣管置入口內、將鼻捏住、令其用長氣呼吸、不久面先發紅、後則發白、再後頜骨下垂、至此則全身迷蒙、醫者宜速行割治、但當用精純者、以免意外之患、若有禁用哥羅芳伊打二藥之故、此藥最宜、近有人言此藥於絡部無正感、然吸之

此圖乃熏氣養下洽之具、近今始出、具之中間有一鐵筒如M、上端有一吸具如K、二者連以大庫秋管、兩旁有二鐵筒如AB、一貯以養、一貯氣下洽、二筒之旁、各有庫秋



袋如CD、以二小庫秋管、連於二筒上、上端各有合頁如EF、用時可隨意啟閉、氣由二筒入庫秋袋、由二袋入中間之鐵筒、由此筒入大庫秋管、通至吸具而熏之、用此具時、熏養或氣之多寡、可隨醫士之意。

洋升麻膏　Extractum Cimicifugæ, U. S.　一至五厘。(0.06-0.3)

洋升麻流膏　Fluidextractum Cimicifugæ, U. S.
Extractum Cimicifugæ Liquidum, B. P.　十至三十量滴。(0.6-2.0)

洋升麻酒　Tinctura Cimicifugæ, B. P.　一至二量錢。(4.0-8.0)

洋升麻 CIMICIFUGA, U. S. CIMICIFUGÆ RHIZOMA, B. P.

此藥乃美國一類蓄根之草、入藥者係該草之根、內含一樹、並一氣易散之油、如欲用此藥之酒、或流膏、當隨製隨用、並當用本年所產者、因其力易失也。

體功效　試將此藥之大分劑、射於禽獸之皮內、則脊腦覺徑被癱、故激反應之能減少、雖肌與腦系不受阻、而心與司絡腦所俱受其阻、終則因呼吸停止而殞命、服小分劑、微有激心之力、足分劑、鮮有不額痛者、但其體功效、與療效無甚干涉。

療效　醫肌跳[1]症之妙劑、砒爲第一、此藥居第二、如無他恙、此藥尤妙、但宜防其大便乾燥、並當常與鐵類同服、若有痺[2]症之根、用之最爲合宜、有醫者以此藥爲治系痛[3]之妙劑、若卵腺之系痛、用之尤妙、婦人經閉[4]、瘏痛[5]、瘏不復原等症、或降階時覺卵腺或瘏作痛、此藥俱效、心變脂[6]症、如用毛地黃無效、可用此藥爲平心之劑、以其大有激瘏之力、故懷孕者宜慎用之、可免小產之虞、然有醫者、特用此藥爲免小產之劑、且因其有激瘏之能、可代麥奴之用、或較麥奴尤妙、因其當生產之時、令瘏之縮力、仍如尋常、不似麥奴之猛、然少有用之爲縮瘏者、過用目力之頭痛[7]、用之有效。

藥製與分劑

1 Chorea
2 Rheumatism
3 Neuralgia
4 Amenorrhœa
5 Subinvolution and tenderness of the womb
6 Fatty heart
7 Headache

服法 此藥宜置於藥殼內、或冰水內、然後服之、方免伊打之氣味散佈、如不用極冷之水、恐其氣味散佈而不易服也。

分劑 成人一至二量錢 (4.0-8.0) 因其氣大有激喉之力、故嬰孩不易服之。

酵母花 HUMULUS, U. S. LUPULUS, B. P.

入藥者、乃其花子、此子湊合成毬、內含一氣易散之流蜮、名酵母花精、並含一苦酸、名酵母花酸、因英美二國之命名不同、以致多有舛錯。

療效 癔[1]痵[2]二症、可用為解抽平腦之藥、莖舉[3]症、有效、用糊藥時、如以此藥加於其內、其效尤大、若因痵症致不能安睡、用此花作枕、睡時以酒濕之、或效、此法因人虛想而出、然能令人安睡者、或因酒氣之故耳。

藥製與分劑

酵母花酒 Tinctura Lupuli, B. P. 半至二量錢。(2.0-8.0)

酵母花精 Lupulinum. 二至五厘。(0.12-0.30)

酵母花精脂桶 Oleoresian Lupulini, U. S. 十至四十量滴。(0.6-2.6) 置於藥殼內服之。

酵母花精脂桶流膏 Fluidextractum Lupulini, U. S. 三十至百二十量滴。(2.0-8.0)

酵母花精冲藥 Infusum Lupuli, B. P. 一至二量兩。(30.0-60.0)

1 Hysteria
2 Nervousness
3 Priapism

熱茶、或熱檸檬水、則當多以被覆身、無論成人孩童、用之爲表劑、有效、孩童腦部過於受激、因而作燒、有效、以其有退熱之力、並有解抽之功。

分劑　成人每服二十至六十量滴、(1.3-4.0)　一正歲之孩童、每服五至十量滴、(0.3-0.6)　以冷水服之。

伊打雜酒 SPIRITUS ÆTHERIS COMPOSITUS,

此藥乃以伊打伊打油與酒相合而成。

療效　此藥用爲祛風之劑、最爲有力、且因其中之酒及伊打、能激腸胃而增其蠕動、故大有醫呃逆[1]之能、心痛急症[2]、當患時服之最妙、如吸煙過度或食物不化而致心跳者[3]、此藥俱效、若嬰孩忽顯腦力脫失、良方如左。

伊打雜酒	℞—Spiriti ætheris compositi	十三量滴	(0.8)
錏沘香酒	Spiriti ammoniæ aromatici	十三量滴	(0.8)
陳皮酒	Tincturæ aurantii	十三量滴	(0.8)
樟腦水	Aquæ camphoræ	一量錢	(4.0)

此方係一次所服之藥。S. Give at one dose.

1 Hiccough
2 Angina pectoris
3 Tobacco heart

若尿少而色深、至使胱過於受激者、良方如左。

鉀檸礬	℞—Potassii citratis	一或二英錢	(4.0-8.0)
燃氰弱酒	Spiriti ætheris nitrosi	半量兩	(16.0)
蒸水	Aquæ destillatæ	加至四量兩	(120.0)

每五句鐘、服二量錢、(8.0) 至尿色變淺爲止。 S.—Dessertspoonful every hour until the urine becomes clear.

尿色變淺後、宜改服顛茄、如復變深色、可再服前方、若孩童虛弱、致脊腦司所受阻、可以左方代顛茄之用。

砒弱酸	℞-Arseni trioxidi Acidi arseniosi	一英厘之四分之一	(0.015)
馬前子膏	Extracti nucis vomicæ	二英厘	(0.10)
貴林硫强礬	Quininæ sulphatis	二十英厘	(1.3)

共成二十丸、日服三丸。 Fiant pilulæ No. XX. S.— One pill t. i. d. after meals.

此藥若用爲利小便之劑、宜以冷水服之、並不可多以被覆身、如用爲表藥、服後當飲

樟腦酸	℞—Acidi camphorici	四英錢	(16.0)
醇酒	Alcoholis	二量兩	(60.0)
非湉水	Mucilaginis acaciæ	三量兩	(90.0)
陳皮糖漿	Syrupi aurantii	加至六量兩	(180.0)

汗前一句鐘、服一量兩之四分之一、或四分之二、(8.0-16.0) S.—Dessertspoonful to a tablespoonful one hour before sweat is expected.

此方於臭汗症少效。

燧氰弱酒 SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI,

此藥乃以酒水與燧氰製成、功用多在燧氰、藥行中如不用合宜之瓶、謹愼存貯、則燧氰必至散失、其中僅存酒與水而已、若試藥力果散失否、可將此藥半量兩、(16.0) 加安替派林一或二厘、(0.06-0.12) 如先變紫色、後有綠色沉澱、則知其力未嘗散失。

體功效 此藥有平絡腦二部之效、並有發表、及利小便之能、如頻服足分劑、必致皮變紫色。

療效 泰西之人、常以此爲家藏備用之藥、用之合宜、功效甚妙、雖誤用之、亦少有妨礙、有醫者以爲少有功效而輕視之、然無效之故、因用之不恰、或藥力散失、孩童遺尿[1]患、

1 Incontinence of urine.

而成、結晶如針、或如鱗、色白、透光、味似樟腦、水不能化、酒、伊打、哥羅芳、三者俱易化之。

體功效　此藥之效似溴類、並似樟腦。

療效　此藥有止痛之功、若與他藥並用、其效尤妙、腰痺[1]症、或腦部不平而作痛者、服之有效、癪[2]症之婦女如不能睡、亦效、因其有暖胃之功、並睡藥之力、故戒酒者服之亦效、因其惹力過大、故胃炎症不可服、遺精[3]症、服之大效、酒狂[4]症、倘胃經受阻、並多筋跳之患、服之有效、啼嗽[5]症、或效、瘁[6]症、多因腦部受阻、致患系痛者、以及癇[7]症、小癇、肌跳[8]等症、亦或有效。

服法　成丸服之、但不可用爲射藥、因其惹力過大也、分劑五厘。(0.3)

樟腦酸 ACIDUM CAMPHORICUM, U. S.

此藥之製法、乃以氮強酸加樟腦而成、肺癆症之盜汗[9]者、此爲最妙之劑、有名醫云、此類症他藥所不能治者、惟此藥能治、且無危險、但宜於汗前一二句鐘、服二十或三十厘、(1.3-2.0) 如汗出甚多、可服六十厘、(4.0) 但用大分劑、有惹胃之患、宜分二次用之、相隔二句鐘、因其水不易化、可置於藥殼內服之、且有良方如左。

1 Lumbago.
2 Hysteria.
3 Spermatorrhœa.
4 Delirium tremens.
5 Whooping cough.
6 Influenza.
7 Epilepsy.
8 Chorea.
9 Night-sweats of phthisis.

後以樟腦油擦之、可免生膿之患、婦人經絕時患頭痛喜睡者、曾有著名醫者云、以此藥加花露水、擦於頭上、大效、婦女行經、或絕經時、如頭上有一處甚痛、若用錏沘消水、與樟腦酒各一分、製成洗藥、擦之有效。

藥製與分劑

樟腦水 Aqua Camphoræ, 半至二量兩。(15.0-60.0)

樟腦酒 Spiritus Camphoræ, 三十量滴。(2.0)

樟腦 Camphora, 一至三厘。(0.06-0.20)

樟腦雜酒 Tinctura Camphoræ Composita, B. P. Tinctura Opii Camphorata, U. S. 十五至六十量滴。(1.0-4.0)

最易服者、乃樟腦酒、或樟腦丸。

樟腦擦藥 Linimentum Camphoræ,

鹼擦藥 Linimentum Saponis, 此藥內之樟腦、較少於樟腦擦藥。

樟腦蠟抹膏 Ceratum Camphoræ, U. S.

樟腦錏沘擦藥 Linimentum Camphoræ Ammoniatum, B. P.

樟腦氣弱鹽

CAMPHORA MONOBROMATA, U. S. 此藥之製法、乃以樟腦與氣入於鐵管內、爇熱

1 Drowsiness and headache of menopaus.
2 Headache.

(10) 於皮內、但用時最宜謹慎、所用之油、亦務求純淨、有著名醫者云、癆症之腦部受阻、或積效之患者、常用此法治之、呃逆[1]症、此爲妙劑、如用力太過而致心跳[2]症、與細氣管[3]久炎、或氣管洒膜久炎[4]、服之皆效、鼻洒膜久炎症、聞樟腦酒、有補助洒膜生液之功、口出臭氣者、用之漱口有效、人患傷風[5]症、初患時、聞樟腦酒大效、並有良方如左。

樟腦	℞-Camphoræ	二英釐	(0.12)
顛茄流膏	Fluidextracti belladonnæ U. S. Extracti belladonnæ Liquidi, B. P.	一量滴	(0.05)
貴林硫强礬	Quininæ Sulphatis	二英釐	(0.12)

Fiant tabellæ No. X.

S.— One every hour for four or five doses.

共成十丸、隔一句鐘、服一丸、每日只可服五次。

如於初患時服之、可減頭痛[6]、呃嚏[7]、鼻嚏等患、若不早用無效、無故鼻嚏流涙[8]不止、並呃嚏不斷者、宜以樟腦散、或樟腦塊、置於滾水內、齅之、或齅樟腦酒亦可。

敷用　患停瘍[9]者、可用此藥激之、對磨癬[10]、以白石粉與樟腦散敷之、有效、因筋扭[11]、或因痺[12]症、以致骨節炎[13]者、用樟腦擦藥有效、系痛症[14]、擦之亦有效、癤[15]初起時、日敷樟腦酒二次、

1 Hiccough.
2 Cardiac palpitation.
3 Capillary bronchitis.
4 Chronic bronchitis.
5 Cold.
6 Headache.
7 Sneezing.
8 Coryza.
9 Indolent sores.
10 Intertrigo.
11 Sprains.
12 Rheumatic joints.
13 Inflamed joints.
14 Neuralgia.
15 Boils.

八厘。(0.24-0.5)

樟腦 CAMPHORA, 此藥原出於中華日本等處、由樟木取出、泰西所售者、乃屢用升法製成、純者色白、或淡紅、其氣易散、味熱而臭烈、別具一種氣息、最易燃著、其煙色黑、冷水千分、或醕酒一分、各能化藥一分。

體功效　服過分劑、必致頭暈、耳鳴、譫語、後則瘈瘲、有如癎症、脉速而微、皮冷而紫、全身生汗、或覺腹內燒痛、中毒日久者、腎必發炎、若服小分劑、則能增人氣力、脉畧速而有力、亦覺胃暖、腦部清明、全身暢快、服足分劑、有謂爲平陰陽藥者、有謂爲激陰陽藥者、大概服過分劑、有激陰陽之力、此藥於人身內改其體質者居多、由腎而祛、亦有由汗與呼吸而祛者。

療效　此藥服敷皆可、孩童或婦女服之、可作平腦[1]或解抽藥[2]、若經痛[3]之婦女、有頭痛[4]或痵患[5]者、此藥有效、如與阿司炭尼利、或安替派林同用、甚效、若製成輪藥、服之尤妙、霍亂[6]與似霍症[7]、可用之、各類盟瀉症[8]、亦可用之、惟各類泗瀉症少效、莖舉硬痛[9]、與鋏氣盐同用有效、有著名醫者、於各類低熱症[10]、嘗以此作激力藥用之、無論何症、致腦部驟然受阻[11]、有效、倘病勢已危、恐服藥不及、宜以樟腦一分、用洋橄欖油九分化之、射十五滴

1 Nervous Sedative.
2 Antispasmodic.
3 Dysmenorrhœa.
4 Headache.
5 Nervousness.
6 Cholera.
7 Cholera morbus.
8 Serous diarrhœa.
9 Chordee.
10 Adynamic fevers.
11 Sudden nervous depression

之最妙、孩童腸胃脹之疛[1]、亦可用之、孩童之氣臌症[2]、或腸熱症之氣臌[3]、可用爲射肛藥、氣脘痾炎症[4]、可用爲祛痰藥、孩童腦部過於受激、亦常有效。

藥製與分劑

阿魏丸 Pilulæ Asafœtidæ, U. S. 每丸內有此藥三厘、(0.2) 每次可服一二三丸。

阿魏勻藥 Emulsum Asafœtidæ, U. S. 半至一兩。(15.0-30.0)

阿魏酒 Tinctura Asafœtidæ, U. S. / Tinctura Asafetidæ, B. P. 三十至六十量滴。(2.0-4.0)

阿魏肛彈 (Suppositoria Asafœtidæ) 每彈內有此藥八厘。(5.0)

年邁人食後、因氣虛致腸胃脹滿[5]者、良方如左。

馬前子膏 ℞-Extracti nucis vomicæ. 五英厘。(0.3)

寇拉膏 Extracti kolæ. 五英厘。(0.3)

阿魏 Asafœtidæ / Asafetidæ 四十英厘。(2.6)

共成二十丸、早晚各服一丸。 Fiant pilulæ No. xx. S.— One night and morning.

阿虞雜丸 Pilula Galbani Composita, B. P. 此丸乃以阿魏阿虞沒藥等製成、分劑四至

1 Colic of children.
2 Tympanites of children.
3 Tympanites of typhoid fever.
4 Bronchitis.
5 Intestinal flatulence.

鋅甘松礬 Zinci Valeras, U. S. 半至三厘。(0.03-0.2)

鐵甘松礬 (Ferri Valeras) 一至三厘。(0.06-0.2)

貴林甘松礬 (Quininæ Valeras) 二至十厘。(0.12-0.6)

錏甘松礬 Ammonii Valeras, U. S. 二至十厘。(0.12-0.6)

痵[1]癪[2]二症之良方如左。

貴林甘松礬	℞-Quininæ valeratis.	二十英厘。	(1.3)
鐵甘松礬	Ferri valeratis.	二十英厘。	(1.3)
錏沘甘松礬	Ammonii valeratis.	二十英厘。	(1.3)

共成二十丸、日服三次、每次服一至二丸。 Fiant Pilulæ No. xx.
S.— One or two pills three times a day.

阿魏 ASAFŒTIDA, U. S. ASAFETIDA, B. P.

此藥產於阿弗干、乃以樹汁製成、兼紅黃白三色、味似蒜、其臭頗烈、服之而胃覺暖、有平育道之功、亦可為祛風之藥。

療效 此藥常用為祛風藥、其功多顯於大腸內、年邁者[3]因胃不消化、致腸胃氣脹症、服

1 Nervousness.
2 Hysteria.
3 Indigestion and flatulence.

氣易散之油、亦含一酸、油名甘松油、酸名甘松酸。

體功效 此藥畧有阻腦之力、能令腦部平靜、服過分劑、脉則畧速、身自覺暖、並有時嘔吐、如所服之分劑過大、必致瀉腹、知覺亦受其阻。

療效 婦女腦部受激[1]、致患不寐症[2]、或專用此藥、或與他藥並用、有效、癪[3]症亦有效、酒狂[4]症、與莫非兼服、乃為常用者。

藥製與分劑

甘松流膏 Tinctura Valerianæ, U. S. 六十量滴。 (4.0)

甘松錏淡酒 Tinctura Valerianæ Ammoniata, 半至一量錢。 (2.0-4.0)

甘松冲藥 (Infusum Valerianæ) 二量兩。 (60.0) 此藥不入揀藥册。

甘松酒 Tinctura Valerianæ, U. S. 一至三量錢。 (40-12.0)

甘松油 (Oleum Valerianæ) 二至四量滴。 (0.12-0.25)

甘松酸 (ACIDUM VALERIANICUM)

此藥乃無色之油、味甚猛而濃、入藥者、惟此酸中之錏、鐵、貫林、錏等礬、有平腦之力、與補藥之功。

藥製與分劑

1 Nervous excitement.
2 Insomnia.
3 Hysteria.
4 Delirium tremens.

第二章　論解抽藥類

此類藥人所常用者、因其性和平也、腦力虛弱、易生惱怒者、用之有效、如不甚重者、名曰痵症、甚重者則至於癀症、因此類藥能補腦力、故有謂爲補腦藥類者、其中僅有樟腦與伊打雜酒、畧含毒力、然必用過分劑、其毒力方顯。

麝香 MOSCHUS, 此藥多出於西藏、乃麝鹿陽莖前袋所含者、香味甚濃、舖中所售者、多係不純。

療效 此藥有補力之效、並有解抽平腦之功、各類低熱症[1]、如其力過於微弱、腦部甚受阻者、宜以此藥五至十厘 (0.3-0.6) 加糖水、射入肛內、有效、如腦部受激或腦力脫失[2]、此藥有效、但不可早用、惟病至危急時用之、可使病者出此危險、若早用之、則藥力漸失、及至病危之時、反無功用矣、呃逆[3]重症、此爲最妙之品。

藥製與分劑

麝香酒 Tinctura Moschi, U. S. 四十至六十量滴。(2.6-4.0)

麝香散 Moschus, 五至十五厘。(0.3-0.6)

甘松 VALERIANA, U. S. VALERIANÆ RHIZOMA, B. P. 此藥有數種、出歐洲中華等處、入藥者係該草之根、內含一

1 Low fevers.
2 Nervous excitement or nervous collapse.
3 Hiccough.

硫弱酸	Acidum Sulphurosum.	銾綠強塩	Hydrargyri Chloridum Corrosivum. U. S. Hydrargyri Perchloridum. B. P.
祑毛	Formalin. 鋏錳上礬 Potassii Permanganas.	輕養強洽消水	Aqua Hydrogenii Dioxidi. U. S. Hydrogenii Peroxidi Liquor. B. P.
納他連	Naphtalenum. 納透 Betanaphthol.	炦醇	Phenol, U. S. Acidum Carbolicum, B. P.
來蘇	Liquor Cresolis Compositus.	硼強酸	Acidum Boricum.

義斯蘭苔 Cetraria.　洋石花菜 Chondrus (Carrageen)　甘草 Glycyrrhiza.

胡麻子 Linum.

潤皮藥 EMOLLIENTS,　豬脂 Adeps.　蔻蔻脂 Oleum Theobromatis.

鯨頭油 Cetaceum.　白蜂蠟 Cera Alba.　黃蠟 Cera Flava.

胡麻子油 Oleum Lini.　洋橄欖油 Oleum Olivæ.　棉子油 Oleum Gossypii Seminis.

羊毛脂 Adeps Lanæ.　甘油 Glycerinum.　軟煤油蠟 Petrolatum, U. S. Paraffinum molle, B. P.

糊藥 Cataplasmata.

改酸藥 ANTACIDS,　鈉輕炭強礬 Sodii Bicarbonas.　錯弱礬 Calx.

澱錯碳礬 Calcii Carbonas Præcipitatus.

殺腸蟲藥 ANTHELMINTICS,　士拜枝喇 Spigelia.

藜蘆 Chenopodium.　山道年 Santoninum.　非利瑪 Aspidium, U. S. Filix Mas, B. P.

東瓜子 Pepo.　松節油 Oleum Terebinthinæ.　石榴 Granatum.

洋蘇冰 Thymol.　卡瑪拉 Kamala.

化食藥 DIGESTANTS,　胃化腥精 Pepsinum.　脏梅 Pancreatinum.

糟膏 Extractum Malti.　木瓜精 Papain.

滅瘴毒藥 DISINFECTANTS,　綠 Chlorum.　錯綠粉 Calx Chlorinata.

蒜 Allium.	海葱 Scilla.	湽 Pix Liquida.
阿摩饜 Ammoniacum.	辛伊加 Senega.	替利笨 Terebenum.
檀香油 Oleum Santali.		

調經藥 EMMENAGOGUES,

	鉌錳上礬 Potassii Permanganas.	洋班蝥 Cantharides.
怪阿克 Guaiacum.	沙芬 Sabina.	芸香 Ruta.
炭阿西呑 Tanacetum.	芫荽油 Apiol.	

縮宮藥 OXYTOCICS,

	麥奴 Ergota.	金印草 Hydrastis.
棉根 Gossypii Radicis Cortex.		玉蜀黍菌 Ustilago.

外惹內效藥 COUNTERIRRITANTS,

		洋班蝥 Cantharides.
芥 Sinapis.	辣椒 Capsicum.	松節油 Oleum Terebinthinæ.
錏沘 Ammonia.	把根地柄 Pix Burgundica.	

潰藥 CAUSTICS,

	鉌沘 Potassa.	砒酸 Arseni Trioxidum, U. S. Acidum Arseniosum, B. P.
鋅綠鹽 Zinci Chloridum.	錼綠强鹽 Hydrargyri Chloridum Corrosivum. U. S. Hydrargyri Perchloridum, B. P.	硫强酸 Acidum Sulphuricum.
低錼氰强礬消水 Liquor Hydrargyri Nitratis.		
氰强酸 Acidum Nitricum.	鏻强酸 Acidum Chromicum.	溴 Bromum.

潤藥 DEMULCENTS,

	非酒 Acacia.	卡喇桿 Tragacantha.

重瀉藥類 PURGES,	渣笠 Jalapa.	哥羅新 Colocynthis.
士金無年 Scammonium.	獨脚蓮 Podophyllum.	洋苦瓜汁 Elaterium.
籐黃 Cambogia.	巴豆油 Oleum Tiglii, U. S. Oleum Crotonis. B. P.	
利小便藥 DIURETICS,	海葱 Scilla.	金雀花 Scoparius.
⿰金汞綠弱盐 Hydrargyri Chloridum Mite, U. S. Hydrargyri Subchloridum, B. P.		⿰火益氰弱酒 Spiritus Ætheris Nitrosi.
毛地黃 Digitalis.	鋏 Potassium.	派怕拉辛 Piperazine.
烏羅透品 Urotropin.	⿰金赤 Strontium.	布球 Buchu.
沛利拉 Pareira.	唹花 Uva Ursi.	愛冬葉 Chimaphila.
杜松 Juniperus.	以利準油 Oleum Erigerontis.	檀香油 Oleum Santali.
玉蜀黍 Zea.	松節油 Oleum Terebinthinæ.	哥拜把 Copaiba.
畢澄茄 Cubeba.	瑪替蔻 Matica.	卡伐卡伐 Kava-Kava.
洋班蝥 Cantharides.		
發表藥 DIAPHORETICS,	披路加便 Pilocarpina.	⿰火益氰弱酒 Spiritus Ætheris Nitrosi.
祛痰藥 EXPECTORANTS,	路卑利 Lobelia.	銨鋏菓礬 Antimonii et Potassii Tartras, U.S. Antimonium Tartaratum, B.P.
衣必格 Ipecacuanha.	鋏檸礬 Potassii Citras.	阿甫莫非印 Apomorphina.
錏綠盐 Ammonii Chloridum.		膠草 Grindelia.
皮路脂桺 Balsamum Pruvianum.		透路脂桺 Balsamum Tolutanum.

喇瑣辛 Resorcinum.	柳酸 Acidum Salicylicum.	撒婁 Salol.
安息香 Benzoinum.	安替派林 Antipyrina, U. S. Phenazonum, B. P.	阿司炭尼利 Acetanilidum.
芬阿錫吞 Phenacetin.		
激胃藥 STOMACHICS,	瓜沙 Quassia.	龍膽草 Gentiana.
加林啤根 Calumba.	印度龍膽草 Chirata.	洋郁李 Prunus Virginiana.
洋桂 Cinnamomum.	丁香 Caryopyllum.	豆蔻 Cardamomum.
薑 Zingiber.	胡椒 Piper.	辣椒 Capsicum.
白柴油 Oleum Cajuputi.	沙沙油 Oleum Sassafras.	洋苦菊 Anthemis.
馬兜鈴 Serpentaria.	加思架 Cascarilla.	
吐藥 EMETICS,	衣必格 Ipecacuanha.	芥 Sinapis.
阿甫莫非印綠塩 Apomorphinae Hydrochloridum.		
鋅硫強礬 Zinci Sulphas.		
輕瀉藥類 APERIENTS,	甘露 Manna.	槐花青 Cassia Fistula.
洋杜仲 Euonymus.	鎂養 Magnesia.	硫 Sulphur.
蓖麻油 Oleum Ricini.	汞 Hydrargyrum.	大黃 Rheum.
阿羅 Aloe.	辛那 Senna.	鎂硫強礬 Magnesii Sulphas.
鈉硫強礬 Sodii Sulphas.	鈉磷強礬 Sodii Phosphas.	鉀鈉菓礬 Potassii et Sodii Tartras.

架美喇 Krameria.　白礬 Alumen.　鉛弱養 Plumbi Oxidum.

鉛醋礬 Plumbi Acetas.　鉍碳強礬 Bismuthi Carbonas.　鉍氣下礬 Bismuthi Subnitras.

鈰草礬 Cerii Oxalas.　鉦硫強礬 Zinci Sulphas.　銅硫強礬 Cupri Sulphas.

銀氰強礬 Argenti Nitras.

補藥 TONICS,　鐵藥類 Ferrum.　高錳弱養 Mangani Oxidum Nigrum.

硫強酸 Acidum Sulphuricum.　氯綠強酸 Acidum Hydrochloricum.

氰強酸 Acidum Nitricum.　皇強酸 Acidum Nitro-Hydrochloricum.

改症藥 ALTERATIVES,　燐 Phosphorus.　砒強酸 Arseni Trioxidum, U.S. Acidum Arseniosum, B.P

汞藥類 Hydrargyrum.　鏽鈉綠強鹽 Auri et Sodii Chloridum.

碘 Iodum.　鉀碘鹽 Potassii Iodidum.　黃碘 Iodoformum.

魚肝油 Oleum Morrhuæ.　燐強酸 Acidum Phosphoricum.　哥枝禁 Colchicum.

洋茯苓 Sarsaparilla, U. S. Sarsa, B. P.　怪阿克 Guaiacum.　魚石溜 Ichthyol.

脾䏶 Thyroid Gland.　腎上腺 Suprarenal Gland.　療症盟 Antitoxins.

解瘧藥 ANTIPERIODICS,　貴林 Quinina.　郁加列脊 Eucalyptus.

匹克酸 Acidum Picricum.

退熱藥 ANTIPYRETICS,　炦醇 Acidum Carbolicum, B. P. Phenol, U. S.　幾阿蘇 Creosotum.

幾阿蘇碳礬 Creasotum Carbonas.　怪阿冠 Guaiacol.　洋蘇冰 Thymol.

佛茄兒 Stramonium.	閙羊花 Hyoscyamus.	寇卡 Coca.
猶肯 Eucaine.		

激動系藥 EXCITO-MOTORS,

馬前子 Nux Vomica.	鉀氰塩 Potassii Bromidum.	

阻動系藥 DEPRESSO-MOTORS,

加拉巴豆 Physostigma.		
炆氰弱礬 Amylis Nitris, U.S. Amyl Nitris, B.P.	路卑利 Lobelia.	黃素莉 Gelsemium.
哥念 Conium.		

激呼吸藥 RESPIRATORY STIMULANTS,

魁拔寇 Aspidosperma.		

激心藥 CARDIAC STIMULANTS,

錏沘 Ammonia.	醕酒 Alcohol.	
毛地黃 Digitalis	康畀箭毒 Strophanthus.	加非印 Caffeina.
洋鈴蘭 Convallaria.	金雀印 Sparteina.	

阻心藥 CARDIAC DEPRESSANTS,

錑鉀菓礬 Antimonii et Potassii Tartras, U.S. Antimonium Tartaratum, B.P.		
綠藜蘆 Veratrum Viride.	辣茱根 Arnica Radix.	草烏頭 Aconitum.
氰藍酸 Acidum Hydrocyanicum.	菓酸 Acidum Tartaricum.	
檸酸 Acidum Citricum.	醋酸 Acetum.	

斂藥 ASTRINGENTS,

炭匿酸 Acidum Tannicum.	加沕酸 Acidum Gallicum.	
兒茶 Gambir, U.S. Catechu, B.P.	佳奴 Kino.	赤蘇木 Hæmatoxylon.

廿三 胃化脭酶、與胰酶不可合用、因胃化脭酶能於酸內成功、胰酶乃於鹼內成功。

病者之飲食 多有醫者、於病人之飲食、不甚留意、以致飲食不當、難獲痊癒、可知但以藥醫病、不足爲妙、必須留意於病者之飲食、否則不但少有功效、恐病者亦不以其爲名醫、而信賴之矣。

藥之分類 CLASSIFICATION OF DRUGS,

打胎藥類、非醫家所宜用、故不細論、然遇有胎之婦人、因有故必須打落者、用器具取下可也、但須約同他醫、協和辦理。

解抽藥 ANTISPASMODICS,
- 麝香 Moschus,
- 甘松 Valeriana,
- 阿魏 Asafœtida, U. S. Asafetida, B. P.
- 樟腦 Camphora,
- 燈氣弱酒 Spiritus Ætheris Nitrosi,
- 酵母花 Humulus, U. S. Lupulus, B. P.
- 洋升麻 Cimicifuga,

迷蒙藥 ANÆSTHETICS,
- 氧氮下洽 Nitrous Oxide,
- 伊打 Æther,
- 哥羅芳 Chloroform,

睡藥 HYPNOTICS,
- 鴉片 Opium.
- 哥拉 Chloralum Hydratum, U.S. Chloral Hydras B.P.
- 哥拉阿米 Chloralamidum.
- 索弗拿 Sulphonal.
- 台歐那 Trional.
- 怕拉第亥 Paraldehidum.

激腦藥 CEREBRAL EXCITANTS,
- 印度麻 Cannabis Indica.
- 顛茄 Belladonna.

十　流膏類、與水不可合用、因水必令膏力沉澱。

十一　鹼礬類與酸類不符、若合用之、必改二藥之體質。

十二　酸礬類與鹼類不符、若合用之、必改二藥之體質。

十三　植酸類、與硷酸類、不能合用。

十四　鉀及氯盐類、與䃃類不可合用。

十五　鋉氯强盐、鉛類、鋏氯盐、銀氰强礬、俱屬單用之藥、惟鋉氯强盐與鋏氯盐可合用、銀氰强礬、與鴉片膏或鬧羊花、亦可合用。

十六　海葱糖漿、與鐵碳强礬不可合用、因海葱糖漿、內含醋酸之故。

十七　郁李桂水、Cherry Laurel Water 與莫非不可合用、若二藥相合、必變成甚毒之藥。

十八　哥拉與鋏藍洽不可合用、因二藥互爲改變、致成氰藍酸。

十九　寇卡叩與硼砂相合、即成不消化之礬、惟與硼强酸合用、則不改其體質。

二十　鋉氯弱盐與安替派林、不可合用。

廿一　安替派林、與燐氰弱酒、不可合用。

廿二　水藥類因消化之力已盡、而猶用之製他類濃消水、則無消化之力、故不可用。

三　凡鹼類置於蚳類之礬鹽中、則易成他類之藥、不符之方如左。

℞

士的年硫強礬 Strychninæ Sulphatis　一英厘 (0.06)

鋏碘鹽 Potassii Iodidi　二英錢 (8.0)

洋茯令雜糖漿 Syrupi Sarsaparillæ Compositi　三量兩 (90.0)

此方之鋏碘鹽能令士的年沉澱、病者服至瓶底之時、必皆爲士的年、因有中毒之患。

四　鋏氯強礬、與炭匿酸不符、若合用之、必成崩藥、鋏錳上礬亦然。

五　鋏氯強礬、與錏綠鹽不符、若合用之、則易燃著。

六　鐵藥類與炭匿酸不符、若合用之必成鐵炭礬、植物斂藥類、常含炭匿酸、故亦不可與鐵藥合用、惟此類之中、瓜沙與加林啤可與鐵藥合用。

七　蚳類若化成消水、不可與炭匿酸合用。

八　鐵類鉛類硷酸類與非菡不能合用。

九　樟腦酒、與水不可合用。

不能令其流涎、皆因有癖忌之故、醫者於初見之病人、宜用藥之小分劑、蓋試其有癖忌否也。

宜用之狀 INDICATIONS. 見病狀而用所宜用之藥、且所用之藥、不宜令其他處受害。

禁用之狀 CONTRAINDICATIONS. 見病狀而禁用所不宜用之藥、如腦衣炎症、熱度過多、貴林雖能退熱、則不可用、因其能令腦衣絡、多有積血也。

不符之藥 INCOMPATIBILITY. 醫者所以必學化學者、爲免其將不符之藥合爲一方、至變成毒類、或崩類之藥也、按藥類之不符者、不可勝數、惟將人易犯者畧言之。

一　酸鹼二類不可合用。

二　酸類與酒類不可合用、　不符之方如左。

℞

鋏碘塩	Potassii Iodidi	二英錢	(8.0)
皇强酸	Acidi Nitro-Hydrochlorici	一量錢	(4.0)
辛寇拏雜酒	Tincturæ Cinchonæ Comp.	三英兩	(90.0)

此方之酸與碘不符、亦與酒不符。

藥册加倍、若用此藥之足分劑、甚屬危險、他舖酒中所含者、少十分之九、其不同之故、皆在所用之生藥不同耳、若用經試之藥、則免此等之虞、如無經試者、宜將蔴藥類成丸用之、或以淡酒化服、惟毛地黃與綠藜蘆之蔴、不可如此用、因此二藥之蔴、其效與本生藥不同也、毛地黃之蔴甚多、綠藜蘆之蔴有二、然迄今未識此二藥之蔴如何用之方合生藥之效也、嘗有幼童用鴉片表散一服、即至殞命、因配藥者、未將此藥研勻、其中所含之鴉片甚多也、按幼童原不宜服鴉片散類、如必須用、只服鴉片酒類、可免此虞、醫家用藥不知其力、正如匠人用器具不當、難免無誤矣。

服藥之癖忌 IDIOSYNCRASY, 癖忌無定理、有服某藥之微分劑、即見危險之形狀者、有服過分劑、毫無功效者、惟常患癥症之婦女、癖忌易顯、有人服錴綠弱鹽之微分劑、即中錴毒者、嘗有一三十歲之婦、患頭痛甚重、二日之內、服印度麻膏十五厘、(1.0) 竟不見效、此分劑乃男子所應服之七倍也、且因其每日午後作燒、三日之內、服貫林百五十厘、(10.0) 亦無功效、並不令其耳鳴、後又於十六句鐘內、服安替派林六十厘、(4.0) 仍如未服、此分劑係常人所應服之六倍也、又每二十分鐘、射披路加便鹼鹽一厘之八分之一、(0.008) 共射一厘之四分之三、(0.045) 亦無功效、此等過分劑、不能令其發汗、亦

則呼吸司所不致被癱矣、醫者必查明藥祛之遲速、方知每日宜服幾次、譬如錏鋘强礬被祛甚速、每二句鐘宜服一次、毛地黃被㖮甚遲、即一日服一至三次、亦不爲少、被祛甚遲之藥、若不謹愼用之、或有積效之虞。

用藥得輔效 COMBINATION OF DRUGS FOR JOINT EFFECT, 近代醫者、多研究藥之體功效、故醫病之法、亦漸次加增、如哥拉有阻心之力、莫非有阻呼吸之力、若擇此二藥之一而專用之、能治不寐之症、但不如以此二藥之小分劑、兼而用之爲妙、且無阻心與呼吸之損、若配瀉藥、加顛茄與馬前子、爲補腸內肌之藥、相輔用之、大爲有益、醫者選藥配方、不但宜取同效之藥、且留意於難服之藥、若其症必須用難服之藥、固不能不用、然遇有可變通者、宜盡心變通之、令病者易服也。

藥力無定 STRENGTH AND RELIABILITY OF DRUGS, 昔日輪車輪船未興、生藥從遠方而來、受風雨摧淋、藥力故常減少、近因轉運較速、少失其藥力、然多有生藥產於原野、或深山之處、採藥之人、取非其時、藥力亦必不足、近之製藥者、能將所備之藥、試其力與揀藥册同否、但用已試之藥、價値必昂、然價雖昂、較未試之藥、功效甚妥、曾有人遞購五藥舖之馬前子酒、以化學之法、挨次取其酒中之士的年、最著名之藥舖、酒中所含者、較揀

記之、否則不知用藥之時、夫藥被㖨之遲速、大半由於血運之遲速、如救溺水者、血運不過、形狀似死、必當防用藥過多之險、若頻灌有力之藥、存積胃中、及其蘇醒時、血一運動、藥即被㖨、恐生命司所大受其害、酒狂症、宜用莫非、或服或射、蓋欲令其安睡也、如用足分劑無效、不宜再用、恐有中毒之患、曾有忽略此理者、用之過多、以致殞命、患水腫者、㖨藥甚遲、必致藥力存於身內、俟其瀉腹、或放水後、此藥方能被㖨、如用之過多、則中毒矣、若於此病用空針射藥、不但無益、反致有損、因射藥之處、易於生膿也、論㖨藥之常理、飽腹時㖨藥必遲、空腹必速、如人飯前飲酒、雖未及量而醉、飯後飲酒、即及量亦不至醉、其理一也、藥在胃或腸內、惹力若不甚大、則無感身之能、因其未嘗被㖨之故、近有人查明酒藥類、較水藥甘油等類、易於被㖨、如胃經受阻、㖨藥之力、必致減少、果有此患、當於所用之藥內、加辣椒類之激發藥、則被㖨甚速矣。

藥效存時 DURATION OF ACTION OF DRUGS,


藥效存時之久暫、一在被㖨之遲速、一在身內之改變、或祛之遲速耳、如酒、伊打、哥羅芳、𤏲氰弱礬等氣易散之藥、效於身內、存時不久、緣其被祛甚速也、若鋏氰鹽與毛地黃、效於身內、可存十數句鐘之久、因其改變或被祛甚遲也、若以固拉拉射於皮內、必致呼吸司所被癱、如服中分劑、隨㖨隨由腎而祛、

抹膏類 Unguenti, 將藥置於脂內、調勻而成者。

葡酒類 Vini, 此製法與製他藥酒相同、但此必用葡酒而成之。

藥之分劑 DOSAGE, 分劑所以無定者、緣人有男女老幼强弱與病勢之不同、且因人有服藥之癖忌與否、最妙之法、乃視人身體之輕重而定、如體重百斤者、宜服十厘 (0.6)、五十斤者、宜服五厘 (0.3)、由此可以遞推、若身體過胖、與得水腫者、仍當按本體定之、


第一圖



第二圖



第三圖



量盃

若醫孩童之症、有一常用之法、如孩童四正歲、加十二、得十六、用孩童本歲除十六、得四、此孩童可服成人分劑之四分之一、無論孩童之年歲幾何、皆宜加十二、後用本歲除之、此爲常理、用流質藥類之分劑、宜按量滴量之、不可論滴、緣其滴之大小不同也、用藥射入皮膚、當按所服分劑之半、用有力之藥、如恐人有癖忌、初宜用最小之分劑、後漸加之、射入肛內、宜用服分劑之兩倍、如係被喉甚速之藥、宜少用之。

藥喉之遲速 ABSORPTION OF DRUGS, 藥喉之遲速、醫者宜切

勻藥類 Emulsiones, 乃以油藥類、置於非滷內、漸次加水、研勻而成者。
膏藥類 Extracta, 乃以生藥置於酒或水內、煎之而成乾膏者。
流膏藥類 Fluidextracta, U. S. Extracta Liquida, B.P. 此類之製法、與製膏類同、但煉之成漿而止。
甘油藥類 Glycerites, 乃以藥置於甘油內而成者。
冲藥類 Infusa, 以滾水冲之、候至冷時、隔渣而成、亦有以冷水冲之者。
擦藥類 Linimenta, 此類之製法、與抹膏類同、惟其油乃爲流質耳。
丸藥類 Pilulæ, 此丸之大小、約不可過三厘、(0.2) 過則不易下咽、如藥體沉重、至五厘 (0.3) 亦可、有裹皮者、亦有無皮者、裹皮之益有二、一 免藥力散失、二 免藥味觸鼻、惟以筋膠爲皮最妙、裹糖皮者、日久不宜用之。
肛彈類 Suppositoria, 將藥置於寇寇脂內、製成彈形。
輪藥類 Tablets, 乃用機器壓之而成輪。
藥酒類 Tincturæ, 將生藥散置於濾筒內、以酒澆之、淋出而成。
乳糖散類 Triturates, 將藥一分、乳糖九分、研勻而成者。
藥餅類 Trochisci, 以藥與糖及非滷相合而成者。

病人、至能用食物之時、但所射之食物、亦不宜過二至四兩。(60.0-120.0) 肛彈類之用有二、一令藥達於病處、二令藥被嗽、感於全身。

藥製 PREPARATIONS,

藥製繁多、所常用者如左。

强散藥類 Abstracta, 乃以某藥之膏、研成細末、置於乳糖內而成者、使其力倍於本藥。

醋藥類 Aceti, 乃以某藥浸於醋內而成者。

瓛藥類 Alkaloids, 乃以化學之法、由生藥取出、與酸類相合而成礬、其力較本藥甚大。

水藥類 Aquæ, 多係氣易散之藥、置於水內、消化而成者。

糊藥類 Cataplasmæ, 多係胡麻子、或饅首、用滾水浸之而成者。

蠟抹膏類 Cerata, 乃流膏內加以蠟者、使其不易融化耳。

紙藥類 Chartæ, 以吸水紙浸於藥內而成者。

糖菓藥類 Confectiones, 乃以糖菓和藥搗爛而成者。

煮水藥類 Decocta, 乃以藥置於水內煮之熱時隔渣。

甘香酒藥類 Elixir, 乃以淡酒加糖與香類而成、爲使病者易服。

貼膏類 Emplastra, 乃以藥置於粘性物內、勻攤於紙或布或皮革上。

可化之藥、忌用惹力過大者、恐有生瘇之患也、可射藥處、一在外肘、一在腓、(俗名腿肚)一在背、總之不宜射於血脂多處與皮膚硬處、其法以左手之拇食二指、提起皮膚、用右手執針、射入其內、但用此法之險有二、一如針射入衇內、藥必隨血立至生命司所、或至殞命、二如所用之針與藥、有一不淨、必致生瘇、預備射藥、宜用滾水化之、且針內不可少存空氣。

射肛內法　此法有二、一射肛類、一肛彈類、射肛類之用有三、一能令藥被嗽、二能令藥達於肛、或胴內(俗名大腸)之病處、三肛胴被塞、易於冲下、若用此法、令藥被嗽、切不可用之過多、從二至四兩(60.0-120.0)為止、如過四兩、肛肌受惹、即將所用之藥逼出矣。如欲冲下肛胴內之塞物、即至一二斤亦無妨、有時肛受激而其肌發板、不能存所射之藥、故宜緩緩射之、若加油與鴉片酒數滴尤妙、有時人雖日見大便、胴內仍有餘糞存積、日久必成重患、此等症多射溫水、可洗出之、如遇腸塞症、無論因何而致、宜用溫水數斤、以弔水袋緩緩射之、此水當熱至百度、弔水袋當高於病者二三尺、切不可射之過猛、須滴滴而入、可免腸外統膜崩裂之虞、如多用此水、當加鈉氯鹽少許、令與血中所含之鹽同、(即此水之百分之一之十分之七)方可、若病者不進飲食、可以合宜之食物、射入肛內、亦能養育

與用藥同視爲緊要、否則必少見功效也。

用藥之法 MODES OF ADMINISTERING DRUGS.

此法甚多、所常用者有五、一服、一熏、一敷、一射皮內、一射肛內、最常用者惟服法。

服法　服藥之常理、多在飯後、若胃經生瘍、宜在飯前、必如此藥力方能達於患處、小腸生瘍、宜在飯後數句鐘、必如此藥力與食物同入小腸、患處方得藥之功效。

熏法　此法多用於氣脘炎症、用法有以藥置於滾水內、令病人吸其氣者、有置藥於噴霧具內以熏之者、亦有專治痔症、用顛茄佛茄兒等葉、裝入烟袋內、令病人吸之者、人患楊梅症、有時不能服藥、以錸䌷弱𥂝置於火上、令病人吸其氣者、亦有數類之症、令病人吸氳者、惟哥羅芳伊打喜氣等、只用爲迷蒙之藥、此皆熏法之類也。

敷法　此法可用之藥大約係魚肝油、錸抹膏、氳抹膏等油藥類、宜敷於皮薄而遙脘多處、即腋與內股等處、此外有氳酒與各類擦藥、更有貼膏與糊藥、亦歸敷藥類、貼膏乃貼於皮膚上、令藥力由皮膚達於患處、糊藥因其濕熱之力、令患處速於生膿、並有止痛之功。

射皮內法　此理乃因皮內之連胭、㖧藥甚速故也、但用時藥與針務必潔淨、且必用

療學

第一章　總論

療學者、乃講明各病之醫法、並各藥之功效也、夫醫之所當學者甚繁、惟此學爲醫家之根本、若不研究此學、雖通達化學體學與體功內科外科等學、於行醫一途、尚未必能有把握。近二十餘年、外科之療法、較昔年大有進步、非僅在器具之新巧、與割法之習熟、乃因療學日求日精耳、倘於此學中免腐之藥、未能考究而通曉之、則所見之功效、恐亦無殊於昔日也。蓋醫者之醫病、其盡心設法、無非欲其痊癒、如遇不治之症、不可置而不顧、亦必設法俾病者減少其苦難、夫療學者、乃在考查各藥之妙能、以顯示於來學、醫者果能通達此學、所用之藥、必有神效、如輕視此學、雖素善割症、其所見之效、尚不如精熟療學之拙手。醫者每遇病人、最宜細詢其病源、既得其病源、又宜診明其病體、然後投之以藥、此論雖係常理、亦有時不可拘泥、如初見病人、病勢已至危急、宜先治其表、因無暇治其裏也、即如膽石胱石等症、痛極難忍、宜用空針射莫非、先止其痛、後再追其病源、蓋考查病源、有時須遲至數日、方能通曉、且於未用藥之先、當有定章在心、按定章投藥、較無定章者、其效必大、遵此理而行、所用之藥味、必不甚多、自能醫病、至於定分劑之大小、當

病之法中國醫書歷來所未闡發者此書無不備載於我國醫道豈小補之哉是書原爲諸葛高管三君分執筆政及已酉翻印增新訂舊余亦忝列末席因中西之醫理文法迥不相同難免有遷就之處且以此爲壽人壽世之書洵不敢舞筆弄墨修成演義文章致貽以詞害意之誚也

宣統三年歲次辛亥暮春北通州陳貫卿筆於公理會盈樓書室

重序

醫之一道所宜學者雖屬甚繁莫不以用藥爲根本中國之醫書自軒岐以來不啻汗牛充棟其於各藥之性質功用非不詳載非不闡明但現今全球大闢中西之土產各殊寒溫之氣候亦異故泰西醫家所研究之異藥奇方多爲中國所未有詎可徒執一方之見遂謂中國醫道燦然大備哉美國醫士亨利盈君本愛人之心行濟世之道以素所心得於西醫賀氏療學一書譯成漢文傳佈中土直將西國至善之大本草合盤托與中國也書中於各藥之出產性質以及功用之大小分劑之多寡無不言之盡致每用一藥或製而去其滓或化而取其精投藥不必甚夥而見效罔不甚神也況用藥之外更有講求飲食選擇居處以及冷熱各等療

以故世有其人則方藥有效世無其人則服食無功豈非我國醫學中一大缺點哉茲有美國醫學博士盈亨利者本其愛人之心欲廣行濟世之術將美國賀德所著療學一書精心考究譯成漢語口授於記者而筆削之凡男婦老幼各科以及藥之性質功用皆括其中雖述筆不能鈎深攟微使中西語氣適合然苟能以中語道出者必細心抽譯不憚煩言以期易於明了其有爲原文所限並無正當之中語可代者明知詞句生澀亦不敢稍加遷就致失原意操斯術者倘能案置一編合諸說曲證而旁通之則析疑補缺未始非濟世活人之一大助也

光緒三十三年　歲次丁未　北通州管國全序於公理教會書舍

原序

攷自神農嘗百艸以立方藥內經一書實爲我國醫道之祖厥後名家代出各本其心得著爲論說以成一家之學雖所論不無少異然總以不離乎內經者近是迨我 朝醫宗金鑑一書出合諸說而折衷之凡施診之秘訣主治之方法莫不燦然大備可謂洋洋巨觀斯道之極點矣雖有名醫再世亦不能出此範圍然而宇宙極大、氣候互遷燥濕之性質不同斯人物之感受各異怪症奇方其爲中國所未嘗經歷而他國早已發明者亦必不尠例如臟腑經絡之、屬以中國舊日圖說證之於新近剖解家而多誤蓋得之理想終不若徵諸實驗爲確鑿也且講求診治者畧於製藥之方研究內科者不解針砭之術欲求一完全善本戞戞乎其難之

PREFACE TO FIRST EDITION

The work of translating Dr. Hare's Therapeutics into the Chinese language was begun over five years ago. The unsettled condition of medical nomenclature has been a serious hindrance and even at the present time, a further revision is in process, consequently there are not a few terms used in this work which will not agree with the revised list of nomenclature when it appears.

The Latin names of drugs and preparations, as they occur in the United States and British pharmacopœias, follow the Chinese name; when identical in both, they are ascribed to neither; the name of a drug or preparation which is only found in one of the above pharmacopœias is followed by the letters "U.S." or "B.P." as the case may be; if a drug or preparation is found in neither, but is of sufficient importance to deserve mention, the Latin name is printed in parenthesis.

Two systems of weights and measures are used, viz; the Apothecaries' and the Metric. It is unfortunate that the weights and measures in common use, by the medical profession, in the United States and England, are not the same; in the United States the Apothecaries' system is still in use, in which 480 grains make an ounce and there are 12 ounces to the pound. In liquid measure, according to the Apothecaries' system, there are 480 minims to the ounce, the same as in the "Imperial" system, but there are only 16 ounces to the pint. The size of the grain is the same in both systems, thus in the doses of the stronger drugs and preparations there is no discrepancy, and that which occurs in the less potent drugs and preparations, is seldom sufficient to require adjustment. In the Metric system the approximate equivalents are [illegible]r. In the prescriptions, the prescription symbol is omitted, but the names of the ingredients are put in the genitive case.

That part of the science of toxicology which treats of the recognition of poisons in the dead body, or in food and drink, belongs to the domain of the chemist, and is not included in this work.

The translator wishes to acknowledge the kind assistance of the author, Dr. Hare, and of the publishers of the original work, Lea Brothers & Co., of Philadelphia, who furnished the illustrations at cost thus materially improving the book, both as regards usefulness and appearance.

Valuable assistance was rendered by Chu Ke Chü Ch'uan, Kuan Fu Ch'en and Kao Shang Chih, Chinese scholars, in putting the translation into acceptable form.

J. H. I.

TUNGCHOU, NEAR PEKING,
DECEMBER, 1907

PREFACE TO SECOND EDITION

This work has been entirely rewritten and over one hundred new drugs have been added. The indexes are rearranged and in the prescriptions the sign and the English directions have been incorporated.

Thanks are due to Dr. Hare for contributing additional cuts. In addition to the former staff of native scholars, the name of Mr. Ch'en Kuei Ch'ing should appear.

J. H. I.

TUNGCHOU, NEAR PEKING,
MAY, 1911.

A Text-book

of

PRACTICAL THERAPEUTICS

WITH ESPECIAL REFERENCE TO THE

APPLICATION OF REMEDIAL MEASURES TO DISEASE

AND THEIR

EMPLOYMENT UPON A RATIONAL BASIS

BY

HOBART AMORY HARE, M. D., B. Sc.,

PROFESSOR OF THERAPEUTICS AND MATERIA MEDICA IN THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA; PHYSICIAN TO THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE HOSPITAL; ONE-TIME CLINICAL PROFESSOR OF DISEASES OF CHILDREN IN THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA; LAUREATE OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN BELGIUM, OF THE MEDICAL SOCIETY OF LONDON; MEMBER OF THE COMMITTEE OF REVISION OF THE UNITED STATES PHARMACOPŒIA OF 1905

THIRTEENTH EDITION

WITH OVER A HUNDRED ILLUSTRATIONS

TRANSLATED BY JAMES H. INGRAM, M. D.

SECOND CHINESE EDITION

會 醫 博

PUBLICATION COMMITTEE

CHINA MEDICAL MISSIONARY ASSOCIATION

UNDER THE

HENRY S. WELLCOME CHINA PUBLICATION FUND.

SHANGHAI

1911

美國醫士賀德著
盈亨利譯

北通州陳貴卿佐廷
管國全黼臣述稿

武清諸葛汝楫巨川校訂

北京高志尚之參校

西歷一千九百十一年

博醫會印發

療學

宣統三年 歲次辛亥

第二次出板

北通州書院印字館鐫